

**METHODUS  
MEDICAMENTA  
COMPONENDI, EX  
SIMPLICIBUS  
IUDICIO SUMMO...**

---


Jacques Dubois



14







12-13-A-13  
METHODVS

# MEDICAMENTA

COMPONENDI,

EX SIMPLICIBVS

*indicio summo delectis, & arte  
certa paratis, quatuor li-  
bris distributa:*

AVTORE D. IACOBO SYL-  
VIO MEDICO.

*Indicé adiecto copiosissimo.*

IN VIRTUTE,



ET FORTUNA.

LVGDVNI,

Apud Gulielmum Rouillium,  
sub Scuto Veneto.

1558.

*Coll. Rom. Soc. Sci. Nat. Hist. Imper.*  
B S



12-13-A-43

MEDICAL

CONTOUR

BY 21

in the form of a

with a

the

AVAIL OF

AND

the

THE



THE

AND

the

the

the



PETRO CA-  
STELLANO, TVTE-  
LENSIVM EPISCOPO,

IACOBVS SYLVIVS  
MEDICVS  
S. P. D.



*VINA M* ac  
memorabilem illam in  
nos benignitatem cum  
studiosissimus quisque  
hominem iuvando pro-  
xime imitari contendat: nulla tamen  
ratione alia plenius exprimit, quam  
morbis tuto profligatis sanitatem pristi-  
nam restituendo: idque per usum causa-  
rum, quas ob id salubres, appellamus.  
Inter quas licet magni sint momenti,  
aer, motus, cibus, potus, primas tamen

medicamenta tenere optimo iure videntur, ut quæ maxima vi sua morbos etiam grauissimos plerunque tam celementer propulsent, ut horum opus miraculi loco habeatur. Quapropter ea Deorum manus rectè vocauit Herophilus & Apollo, Aesculapius, Hippocrates, aliique non pauci celebres medici pro Diis sunt habiti. Et cum cunctis propè mortalibus insita sit per medicamenta curandi cupiditas, actu præcipuo eorum cognitionis studio incendaris, hæc me ratio una commouit, ut amplitudinem tuam aliquo meorum laborum fructu recrearem: nec ea tamen sola, sed honestam cogitationem hanc nostram vehementer auxit tum singularis tua, & cum omnium rerum bonarum cognitione coniuncta eloquentia, tum incredibilis in omnes literarum studiosos benignitas: quibus raris & maximis virtutibus nil mirum, si tam repètè clarissi



clarissimus euaseris, dum docti omnes  
certatim ore uno summa de te omnia,  
vti res habebat, prædicarent, teque non  
modo studiorum præstantissimorum, sed  
etiam peregrinationum & longinqua-  
rum & multarum laboribus maximis  
tam feliciter perfunctū, honoribus am-  
plissimis iam perfungi dignissimum,  
honorificentissimè apud omnes inclania-  
rent. Rex verò noster Franciscus, mu-  
serum omnium pater ac illustrator ma-  
gnificentissimus, hac adductus fama,  
vltro te in suorum primorum cliente-  
lam accersuit, summamque tuam in  
dicendo fecunditatem, perspicuitatem,  
felicitatem admiratus, summis vitæ or-  
namentis honestandum te & beandum  
nulla mora censuit: sicque tua dicta am-  
plexatur, sic fouet, sic presentibus omni-  
bus exosculatur, sic ex te recipit omnia,  
tanquam ex tripode pronuntiata: vt si  
quando vel te aliis, vel alio tibi (vt serè

in sermone sit) contradicendi cupiditas  
ceperit, quæ tibi libertas & modestia in  
refellendis, quæ facilitas in transmitten-  
dis aliorum sententiis parum probabili-  
bus, quæ denique dignitas in veritate  
asseranda? quem Lysiam, quem Plato-  
nem, quem Periclen, quem Demosthe-  
nem, te ceteris velut ægide quadam eru-  
ditionis tuæ stupefactis audiendū exhi-  
bes? Quibus omnibus in quavis encyclo-  
pædia parte sic apud Regem flores, ut  
cum Rege summa sis in gratia. Quòd si  
principibus viris placuisse laus sit præ-  
cipua, ut ille dicebat, quis pro dignitate  
felicitatem omni humana laude maiora-  
rem satis commodè laudauerit? qui non  
principibus viris tantum places, verum  
etiam Regi Francisco per places, omnium  
qui iam sunt Regum gloriam, atque  
etiam ipsius antiquitatis memoriã vir-  
tute sua facile superanti, siue rei milita-  
ris scientiam, siue literarum omnium  
bona-



bonarum amorem, & honorem & cognitionem, siue autoritatē, siue felicitatem in eo summam spectare libet. Quae rara & maxima Regis Francisci ornamenta quoniam plenius attigi, tum poëmatio de memorabili ipsius & Henrici Anglorum Regis ad Ardeā conuentu, tū libello alio à me superioribus proximis mensibus conscripto de salubri ipsius viuendi ratione: plura nunc dicere supersedebo, cū hoc tātum dixerō, à Francisco Rege nostro vita longissima dignissimo Ptolemæum Philadelphum Aegypti regē, Attalumque Pergami, & si quos alios publica hominum utilitati natos Reges idem studium tenuit, in bibliothecis omni genere librorū celebrium instruendis longè exuperari. Nam illi pecunia mediocri singulas singuli bibliothecas collocupletarunt: at noster Franciscus innumerabiles bibliothecas sumptu maximo ea ratione exor-

nauit, & exornādas collocauit, ut nullo  
unquā auo desitura videantur. Nōne  
gloriosius est longè, ac multo magnificen-  
tius, libros omni genere disciplinarum  
bonarum refertissimos expenitissima  
Gracia, et regionibus aliis pecunia gran-  
dissima coemptos, in Galliāque conue-  
ctos non in bibliothecas tantum regias  
coniecisse, sed manu fideli descriptos, ty-  
pographia planè admirabili excusos, in  
omnium bibliothecas contulisse: quā ma-  
gnificentia quid diuinius, quid Rege  
maximo potentissimòque dignius dici  
aut fieri potest? Ad hæc tamen omnia,  
adiecit amplissima virorum Latine,  
Græcè, Hebraicè doctissimorū salariā:  
pérque omnes literarum bonarum ordi-  
nes statum Parrhisii florentissimū sic  
tenent, ut nec melius, si Apollo ipse cum  
Musis adesset, tenerent. O te tēque  
quatēque fortunatam Galliā, quæ Re-  
gem sortita es sapiētem, & omni sapien-  
tia

*tia studio fauentem, quantum aliorum  
 mortalium fauit unquam nemo. Cum  
 verò ad praeclara haec facinora propen-  
 sum maximè magnū & sanctum Re-  
 gem, & ad optima quaeque natum regis  
 animum consilio, opera, studio incitare  
 non desinas, Castellane undecunque ab-  
 solutissimè, docti omnes habent, cui plus  
 quàm tibi debeant, neminem, tuisque  
 successibus prosperis gratulantur,  
 ampliorèsq; exoptant, &  
 obsecrant. Vale, & in  
 bonam partem  
 accipe hoc  
 nostrum  
 magnarum in medi-  
 cina rerum ru-  
 dimentum.*







DE MEDICA-  
MENTORVM SIMPLI-  
CIVM NATVRA, EX DIO-  
SCORIDE ET GALE-  
NO, ET ALIIS,

*LIBER PRIMVS.*



**S**IMPLEX composito prius  
natura & doctrina esse, tum  
rerum omnium cōditio, tum  
Galenī scripta ubiq; demon-  
strant. Propterea nobis com-  
posita medicorum pharmaca in melius ad  
veterum methodos reformaturis, de Sim-  
plicium notis & viribus, quæ Dioscoridi  
præcipue & Galeno scripta sunt, paucis  
agendum est: idq; totum in quosdam com-  
munes locos reducendum, quod etiam Dio-  
scoridi placuisse magis video, licet ubique  
id tam sollicitè non obseruarit. In singulis  
verò ipsis communibus locis ordinem al-  
phabeti (quod & Galenus fecit) sequemur.  
Quoniam verò multæ plantarum quarun-  
dam partes medicamentosæ sunt, ob idque  
in

in locos plures incidere debent, eas tamen omnes vno in loco perstrinximus, quem in dex palam commostrabit, ne res eadem aliquoties nobis repeteretur. Porro locos ipsos sumemus à plantis, animalibus, metallicis & terreis corporibus, à quibus non medicamentorum modò, sed etiam alimentorum materiæ accipi consueuerunt. Sed ne locorum multitudo lectori memoriam turbet magis, quàm promoueat, & inuentionem quæsitæ rei etiam remoretur, quæ ad metalla & terrea corpora pertinent, loco vnico concludemus omnia: quæ item ad animalia tota, & ipsorum quorundam partes, tam similes quàm organicas, in vnum coniiciemus locum. Ipsas verò plantarum partes, quia numerosæ sunt, & in cuiusque genere ampla est ceu familia, in plures locos digeremus, ordinem quendam naturæ sequuturi: primùm radices, & folia molientis: deinde flores, fructus, semina, & alia permulta, quæ omnia sequens diuisio planiora fecerit. Neque hîc expectes omnium simplicium naturam omnem audire. Id enim Dioscoridem, Galenum & aliorum de re simplici commentaria describere fuerit. Mihi verò propositum est, ea tantùm simplicia leuiter attingere, quibus ad cõponenda libro quarto medicamenta est



est opus : eorūq; simplicium eas præcipuè facultates explicare, quibus potissimum ad vires illorum compositorum pernosendas egetur. Nec mireris Arabum quædam simplicia hîc à me adscripta: hæc enim inuentas ab his compositiones aliquot non negligendas magna parte complent : ob id ex illorum libris vtcunque mihi perstringenda fuerunt. In hoc autē labore si meum studium doctis viris probari agnouero, ad alia his maiora, de simplicium medicamentorum materia inuitabor. Quòd si in hoc libro quædam desideret pharmacopœus, discat non sibi scripta hæc, sed medicinæ studiosis potius : expectetque librum sibi peculiarem de singulorum medicamentorum simplicium exacto delectu, illi maxime ad probas medicamentorum compositiones necessario : post hunc alium de his quæ ad conficiendam rectè quauis compositionem sunt vel vtilia, vel etiam necessaria : ac tertium præter hos composita propè omnia complectentem, & in singulis componendi modum planissimè explicantem.



Plantis, &  
harum par-  
tibus simila-  
ribus & dis-  
similaribus

Radice.  
Floribus.  
Stipite.  
Ramis.  
Surculis.  
Foliis.  
Fructibus.

Seminibus  
Corticibus.  
Succis.  
Liquoribus  
Resinis.  
Gummis.

Animali-  
bus totis

Vulpe.  
Hirundine.  
Motacilla.  
Galerita.  
Limacibus.  
Cicadis.  
Cantharidibus.

Canceris.  
Ostreis.  
Buccinis.  
Purpuris.  
Lumbricis.  
Tinea.

Medica-  
menta  
sumun-  
tur à

Partibus  
animalium.

Organicis

Capite manidum.  
Hepate lupi.  
Testibus fibri.  
Renibus scincorum.  
Corpore toto viperae ex-  
cepta cauda, & capi-  
te, pelle, interaneis.

Similaribus.

Tinguedine.  
Adipe.  
Cerebro leporis  
Medulla.  
Osse.  
Dente.  
Coagulo.  
Lacte & eius partibus.  
Sanguine.  
Tunica interna ventri-  
culi.  
Vnguibus caprarum, a-  
finorum.  
Cornu cerui, unicornis  
Glutino tauri.  
Senectate serpente.

Medi-  
camen-  
ta item  
sumun-  
tur ab

Anima-  
liū excre-  
mentū.

Ceu excre-  
mentū.

terreis  
corpo-  
ribus

Stercore canum, luporum,  
puerorum, bubulo, caprino,  
columbino.

Felle. Sudore.  
Urina. Saliva.  
Sorde. Lana succida.  
Pilk.

Ovis.  
Melle.  
Cera.  
Lacte.

Marinis,  
ut

Salibus, & eius paro-  
ribus.  
Adarce.  
Spongia. Alcyonis.  
Niter.  
Asphalto.

Terra  
multipli-  
ci.  
Lapidi-  
bus, ut

Pumice Pyrite.  
Iaspide. Sapphyro.  
Iudaico. Gagate.  
Smarag. Hamatite.

Metal-  
licū, ut

Salibus, nitri fossitū,  
auripigmento, sanda-  
racha, sulfure, cad-  
mia lithargyro, chal-  
citi, auro, argento, etc.  
& horum partibus.



**R**ADICIBVS plantæ omnes alimentum sibi familiare, dulces dulce, amarum amaræ, & reliquæ ad portionem ex terra ipsa trahunt. Vnaquæque suo tempore potissimum in solo & sub cœlo cuiusque naturæ magis propitio. Neque enim omnis fert omnia tellus: neque cœlum quoduis est plantis omnibus amicum, sed trahit sua quamque tanquàm voluptas quædam, qua incitantur plantæ stata anni parte ad alimentum copiosius è terra trahendum: quo habitiores redditæ edunt furculos, folia, flores, fructum, aut semen. Hæc posteriora veluti scopum quendam naturæ plantis cum animalibus communem: ambo enim sibi simile modis omnibus moliuntur excitare, vt si immortalia omnino non sint, saltem quadantenus sint immortalibus proxima, specie per tot supposititia singularia perennante. Hinc animalibus foetuum cura est præcipua, & quod mireris, plantis ipsis semina & fructus (in quibus spes sua est successionis) sic vestientibus, ornantibus, muniuntibus, armantibus. Quam rem cum sequentibus & aliorum de simplici materia libris, tum vel maximè admirabili & adorando naturæ in plantarum partibus artificio apertè deprehendas. Sed de radicibus  
prim

primum sermo nobis est, quas tum præcipue euellat medicus, cum medicamentosæ sunt maximè. Quæ dos omnibus eodem non inest tempore, sed aliæ alio vegetæ magis sunt, quod suis locis audies: quanquam sunt qui putent omnes radices legendas autumno, vbi folia deciderunt: alij veris initio, priusquam in folia aut caulem erumpant. Omnes tamen integræ sunt, si fieri potest, vellendæ, & vnaquæque in solo & cælo naturæ ipsius maximè familiari, bene nutritæ, bene habitæ, non præ alimenti copia enormes, neque ob inopiam strigosæ: tenues, rugosæ: mox aqua lauandæ, & radiculis portionem quandam alimenti repetentibus & stolonibus etiamdum trahentibus purgandæ: post (nisi vtendi recentibus aliqua inceslerit vel commoditas vel necessitas) ficcandæ: quædam vmbra & vento, vt apij, fœniculi, iridis, & quæ aliæ sunt vel minores, vel sicciore, vel rariores. quarum vires sol ceu ignis promptè dissipet: quædam contrariæ dictis sole & vento, vel igni ficcantur, si cælum est nubilum, aut hyems: & sæpe versandæ, ne mucidæ aut putridæ fiant, vt bryoniæ: gentianæ, mandragoræ, rhei pontici. Si verò ficcatis citò est opus, patellæ ignitæ impositas sæpe versandas ficcabis. Quædam item

integræ siccantur: vt gentianæ: aliæ in taleolas dissectæ, vt iris: aliæ lignosa matrice (sic enim cor plantarum Gaza ex Theophrasto vocat) adempta, vt fœniculi, petroselini, apij. Deinde reponuntur loco non insolato, non infumato, non humido, non puluerulento: sed sublimi, puro, sicco, aut septentrionem, aut potius meridiem spectante, præsertim quando hunc plantarum quædam adhuc humidiores requirunt, modo non fient austri. Eadem quandiu vegetæ adhuc sunt seruandæ, parvæ scilicet ac tenues & raræ, vt asari, asparagi anno tantum: quâvis elleborus vterque etiam triennio seruari possit, vt magnæ & crassæ essentia præditæ, bryonia, rheon ponticum, aristolochia, gentiana. Hæc autem tria, colligendi tempus legitimum, repositio comoda, & duratio, nō in radicibus solis obseruanda sunt sed etiam in aliis plantarum partibus, atque adeo quibusdam animalium aliquorum partibus, vt sanguine hircino, hepate lupi, pulmone vulpis, vesica apri. Propterea chamæpitryn, chamædryn, thlaspi. cætaurium, polium hipericum, aliâque, florentia capiebat Galenus, theriacem, vel aliud medicamentum compositurus, non sole æstiuo siccata, neque dum fructus eorum adhuc crudi & imperfecti sunt. Iubet idem

**Li. I. ant.**

idem continua speculatione cognoscendum, quando fructus sunt futuri, quando aduntur, quando augentur, quando denique vigent. Quo tempore potissimum eos commodè decerpas, & in ficcis domunculis repositas custodias, ne à solis radiis vrantur, neque humiditate à tecto, vel muris madesiant. Ob id domo non vult subterranea eos reponi nec aliis vicina, neque sub regulis, sed horum media, quæ ostia meridiem spectantia habeat: propè quæ tamen medicamenta ne reponas. Omnia igitur legenda, quando summarum sunt virium, & accusandi tum mercatores, tum herbarij, qui radices, liquores, succos, flores, germina, fructus extra anni tempus carpunt, & in vrbes conferunt. In quibusdam & astrorum obseruatio valere putatur. Pæoniæ enim radix ad epilepsiam legenda decrescente luna quibusdam videtur, & alysson sub æstu caniculæ vult legi Galenus: vt Aescchriun caneros fluuiatiles capi contra rabiem, vnde est herbarum nomen: tanquam vis quædam illis contra rabiem à sidere accedat, rabiem canibus afferente. Plantas item calidas ex calidis regionibus, & ex harum editis & siccis locis, vt Cretæ montibus, præfert Gale. vt abundè in methodo medicamentorum componendi audies. Neque velim

*Lib. 3. cõ.  
ph. p. gen.*

*Li. 2. ant.*

*Galenus  
in horum  
simpl. vti-  
ribus.*



lectorem latere, multas efferri plātas per v<sup>s</sup>  
vel os masculinè, interdum etiam fœmini-  
nè vel per vñ vel on genere neutro : vt a-  
corus, elleborus, hyssopus, fœniculus, cro-  
cus, lupinus, peucedanus, cœsypus, vel aco-

*Libr. 10.* rum, eleborum, vt ὁ βούτυρος καὶ τὸ βούτυρον:  
*sim. 4.* ὁ δὲ ἡ χάλικανθος, ἡ τὸ χάλικανθος: ἡ ἔμπλα-  
*c. ph. pat.* τρῶς, ἡ ἀντίδοτος, καὶ τὸ ἔμπλαττον, τὸ ἀντί-  
*et 1. ph. g.* δότον, ἡ ππῶς præterea, id est equus in com-  
positione cum nominibus plantarū signifi-  
cat magnum vt βεῦς, id est, bos : quod do-  
cent hipposelinum: hippomarathrum: hip-  
polapatum: vnde opinor nostratibus iu-  
glandes caballinae vulgò vocātur omnium  
maximæ.



**A**CORVS gustu acri, & modicè  
amaro, odore iucundo, tenui  
consistentia, calidus siccus ordi-  
ne tertio Gale. libro 6. simplic. Is  
nunc esse videtur quibusdam Calamus  
aromaticus, aliis potiùs Galanga. Quibus  
repugnat Actuarius in antidoto aurea A-  
lexandri, in qua γάλαγγαν (sic enim cum  
Arabibus vocat) & multis interiectis aco-  
rum, eodem pondere: ad finem verò cala-  
mum aromaticum pondere diuerso misce-  
ri scribit. Acorus omnino verus magnitu-  
dine ireos, galanga maior hodie vulgò di-  
ctus.



ſtus, mihi Tornaco miſſus à Nicolao Godino eius vrbs præſtantiſſimo medico. Ignotus tamen quibus adhuc eſt, eius loco galangam magno ſucceſſu miſcuerint: interdū calamū odoratū. Qui verò nobis frequens oſtenditur, paluſtris acorus eſt, inſipidus, inodorus, ſubſtantia craſſa, frigidus ſiccus: à xyri planta acri nobis notiſſima diuerſiſſimus: quadripertito tamen ſectus & ſole ſiccatus, triennio ſeruatur: non vten- dus hic, niſi Medicus imperauerit.

Veri autem prouentus nunc vberrimus Lugdunū & in alias Galliaë vrbes celebrior- es conuehitur ex India: Luſitanorum ( vt audio) nauigationibus.

**A** Garicus tanquàm fungus eſt enatus atrūcis arborū præcipuè glādiferarum, vt illicū: toto cōtextu eſt rariore & fungo- ſo, ſed facie ſumma & mucrone eſt ſolu- tior: ſede verò & radice ſemilignoſa & ſemiputri, ob id abiicienda. In eo ſcæmina re- ctis venarū diſcurſibus fracta cōſtat, qui dē- tiū murinorū veſtigia in caſeo duro repræ- ſentent. Eadē leuior, rarior, mollior, albior, breuior, friabilior, ſplendidior, proinde præ- ſtantior. Mas verò in fracturis filoſus ner- uorū modo, grauis, denſus, durus, niger, li- gnoſus, longus, interdū rotundus, ſed ubi- que compactior: neuter adulterationē re-

*Dioſc. &  
Gal. li. i.  
antid. &  
li. 6. ſimp.*



cipit. Vtique sapor est initio dulcis, mox amarus, tandem etiam subacer, & subastringens: vnde incidit, tenuat, terget, digerit, obstructa liberat. Vis autem phlegmagoga, hoc est, pituitæ purgatrix, stomacho aduersa: vitiiis tamen omnibus internis ab ea nati saluber est in omni ætate,

*Gal.li.6.  
simp.*

ob quæ medicamentum familiæ veteribus est dictus. Datur drachmæ pondere seu à scrupulis duobus ad drachmas vnā pro ægri natura, ætate, viribus, consuetudine, & morbi natura & tempore cum vino, vinō diluto, vino mulso, sapa, aceto, aqua, hydromelite, oxymelite. Quinetiam stomacho solutis, vt cibi tenax non sit, & acida

*Dioscor.*

rustantibus mādatur, & sine humore deuoratur Diosc. Nobis omnibus nauseabundus est, fortasse quia deterior nunc ex Alpibus Gall. & nostro Delphinatu affertur, quā quem maiorib<sup>9</sup> mittebat Agaria Sarmatiæ regio (à qua illi nomen) & Galatia & Cilicia. Ponticus Andromacho iuniori in The-

*Lib.I. an  
ti. Gal.*

riaca probatur. Mendum igitur videri iure queat in sine libr. noni composit. phar. part. vbi suffocatis ab vtero datur 50. ℞. hoc est, vncia vna cū vino pro drachma vna. Corrigitur vino, zingibere, caryophyllis, nuce moschata, vel aliis stomachicis. Seruatur annis quinque integer, præcipuè cū dauco,

lib

libyſtico, polypodio. Non ſolum autem ſumitur, ſed etiã ſoris adinouetur, vt Galenus docet lib. 6. ſimpl. & in fine lib. 10. comp. ph. part. in iſchiadicis remediis. De agarico autem inter radices agimus, quod is dicitur radix Dioſcoridi, & Galeno li. 6. ſimpl.

Althæa ſiue Ebīſcus eſt malua agreſtis, foliis vt cyclaminus rotundis, lanugine caneſcentibus, flore roſaceo, caule bicubitali, radice lenta, intus alba, ſubſtringente. Partibus ſuis omnibus digerit, laxat, phlegmone leuat, mitigat, coquit abſceſſus coctu difficiles adipibus incocta & ſubacta. Radice autem & ſemine tenuiorum eſt partium, magiſque tum ſecat, tum terget. Althæa autem dicitur, quod inter primas ſit vtilis, & pluribus polleat remediis, Dioſco. Apium ſatiuum eſt, cui gratia vulgò eſt, cuiuſque rami largis portionibus per iura innatant, & in condimentis peculiaris gratiam habent. Quæ Plinij verba noſtrum vulgare petroſelinũ magis indicant; atq; idem *σίλιον ἰνोधον*, id eſt, odoratum, Theocritus 1. *εἰδύλλιον* vocat. Sed apiũ vulgare eſt Dioſco. & Gale. Eleoſelinũ, hoc eſt cum Gaza, Paludapium, quia in paludibus & ſecundum aquæ ductus naſcitur. Petroſelinum autem verũ ex Macedoniaſperis & præruptis petendum, vt Gale. docet libr. 1. de

*Lib. 2. alim. & li. 6. ſimpl. ἀλθαίνα & ἀλθεῖν κυρο, μεδεορ.*

*Pli. c. 11. lib. 10.*

antido.de quo in litera P. Quod verò Macedonicum petroselinum vulgo dicitur, est hipposelinum, quod olus atrum seu pullum à Latinis appellari Hermol. Ruel. Marcellus in Dioscoride inscripserunt, quod meus codex Græcus non habet. Galenus autem verum Smyrnum (id est, vulgare Leuisticum) ὀλίσσαρον Romæ vocari iam consuevit scribit lib.2.aliment. Omnia hæc selinorum, id est, apiorum genera idem pollent tota, sed semine sunt potentiora, & in his præcipuè Macedonicum calidum siccum ordine tertio.

Ari radix vt dracunculi, ex fimo bubulo podagris illinitur, eiusdem cortex splenicos iuuat & hydropicos, Galeno lib.9.composi. phar.part.calida sicca primo ordine:incidit, tenuat, terget mediocriter.

*Gal.li.6. simpl. & lib.1.ant.* Aristolochia, quia sit ἀρίστη λοχίσαις, id est parturientibus optima & salubris, Dioscoridi & Galeno triplex, radice figura præcipuè distincta. Quæ primo generi est tubærum modo rotunda, ob id & malum terræ dicitur: secundo digiti crassitudine, dodracte longa: vnde (opinor) dactylitis dicitur li. 1.comp.phar.gene. & libr.7.composi.phar. part. in arteriace Andromachi 16. Tertio longissima, quasi vitium nouellarum, ob quam clematitis, id est, sarmentosa dicitur.

Huius

Huius fructus putatur quibusdam *lōnn.* orientis, vulgo Gallorum dictus, stupefaciendis piscibus efficax, quam vim Plinius rotundę tribuit. Quartum genus addit Plinius Pistolochiam seu Polyrhizon omniū *pli. libr. 25. c. 8.* tenuissimam, densis radicis capillamentis iunci plenioris crassitudine. Omnes valent tantum radice amara & subacri, sed rotunda omnium est substantia tenuissima: longa verò terget moderatiùs: clematitis, quia odore est gratiore, & cortice carnosio ad vnguenta (nardina Plin.) est quàm ad medicationes aptior. Præfertur Pontica. & huic Cretenfis libr. 10. composit. phar. part. Effodienda est mēsisibus, & desquammato terreno seruanda.

Afarum Galli olim Bacchar vocabant, nunc syllabarum metatthesi Cabaret. Valet foliis, flore, semine, sed efficacissimum est radice, ellebori albi modo purgatoria. Dioscorid. Galenus tamen in hiera picra etiam asarum recipiente solam aloē purgatoriam vim habere scribit: asarum verò humores malos ad vrinas deducere. libro 8. comp. phar. part. & libr. 6. simpl. vires habere radicis acori sed valentiores. Fodienda est cū folia mittere incipit, & in sole siccanda (nisi recens vtenda sit) quia in umbra situm celeriter trahit & senescit, præ-



cipue ex locis riguis, ex macris autem & siccantibus ( quæ imprimis amat ) minus est putredini obnoxia.

Asphodelus Latinis Hastula regia dictus, à caule insigni ex multis radicibus bulbosis emicante, quibus agnatis abundat, interdum ad 80. Radice utilis est tergente: eadem vsta magis calfacit, siccant, tenuat, digerit. Nunc porcorum tibus est, olim etiam hominum, muribus venenum. Autumno legitur, cum valet plurimum.

*Lib. 2. aliment.  
di. 6. sim.*

Asparagus, vel Atheniensium more perph; Aspharagus, vel etiam aphæresi, Sparagus: generatim quidem est coliculus tenerior herbæ, fruticis, arboris, ad fructum & semen increscens: speciatim verò herba vulgo nota, eaque duplex, radice utilis & semine ad detergendas renum & hepatis obstructions. Regij, qui in hortis nascitur, & Helij, id est, palustris, meminit Galen. libr. 2. alimentorum: & huius etiam initio libr. 9. comp. phar. part. ad icterum: & illius libr. 5. simp. Petræi autem libr. 6. simpl. qui post inuentos altilis asparagos Corruda proprie dicitur: Polluci autem syluestris asparagus. Hic multò est satiuo efficacior. In asparago mas à fcemina semine separatur.

*Gal. li. 8.  
simpl.*

**B**Ryonia, seu vitis albæ radix terget, siccant, & moderatè calfacit: ob hoc indu-  
ratos

ratos henes liquat sumpta : & cum ficis ad-  
mota : & pforam & lepram sanat, fructus ve-  
rò eius maturitate ruber, racemosus, est Psi-  
lothrum vt planta ipsa. Nam ἄμπειλον καὶ  
καὶ βρυονίαν καὶ ψιλωθρον λαλεῖσι. Gal.lib.6.  
simp. tamen ἄμπειλον καὶ βρυονίαν sepa-  
rat lib.1.compo.phar.part.in pilos corrump-  
pentibus medicamentis.

Behen serapioni duplex, alba & rubra,  
magnitudine radicis pastinacę paræ, calida,  
humida, odora, semen augens. ex Armenia  
defertur. Earum loco, si id solum possunt,  
Eryngij radicem substituere potius, quàm  
radices nescio quas nobis ab institutoribus  
venditari solitas: sed Ben eidem vt Mesue  
est Galeni Balanus myrsifica, de qua in  
Fructibus audies

**C**Alamus aromaticus κάλαμος ἄρωματι- Gal.li.7.  
còs Dioscorid. Galen. μυρσικὸς, id est, simpl.  
vnguentarius Hippocrati, Arabicus Plu-  
tarcho, Alexandrinus Celsò: calidus siccus  
ordine secundo, leuiter astringit, minimũ  
acer est, partium nonnihil tenuium reme-  
diis ventriculi & hepatis calidis misceri  
potest, ac menses mouentibus. Melior est  
fuluus, intus albicans, odore fragrantissi-  
mo, densè geniculatus arundinis modo,  
cetera mollis tactu, lentus in frangendo: Dioscor.  
contractus autem in assulas dissilit, non



totus, raphani in morem rumpitur: fistula  
 intus plena araneorum, casia gustu, astrin-  
 gens, & cum quadam acrimonia amarus, in  
 mandendo glutinosus: In India nascitur,  
 triennio feruatur. Capparis radice cor-  
 tex amarus, acer, acerbus, terget, purgat,  
 tenuat, incidit, digerit, constringit: lienes  
 induratos & ischiadas ob hæc magnificè  
 iuuat, sumptus vel cum idoneis remediis  
 admotus. Eadem radix etiam hepatica est,  
 libr. 8. composit. phar. part. & splenica, lib. 9.  
 eiusdem. Flos eius & fructus aceto & sale  
 conditus primis mensis ad excitandam ap-  
 petentiam sumitur, licet stomacho noxius,  
 siticulosus, aluum turbare Dioscoridi dica-  
 tur. Folia capparis trita cum mero pota sple-  
 nica. lib. 9. composit. phar. part. admota cum  
 virium vehementiam obrudentibus chœ-  
 radas sanant. Centaurij magni radix a-  
 cris, astringens, subdulcis, & subamara: vl-  
 cera glutinat, sanguinem reiiciētibus pro-  
 dest: à Chirone Centauro Herculis sagit-  
 ta vulnerato inuentum & nominatum Cē-  
 taurium: annis decem feruatur Theophra-  
 sto. Centaurium autem minus radice in-  
 efficax est, foliis & flore utilis, subastrin-  
 gens: ob amaritudinem Fel terræ dicitur  
 Plinio. Cyperis seu radix cyperi calfacit,  
 siccat sine morfu, subastringit, incidit, vlce-

ra præhumida cicatrice claudit, calculos frangit, vrinam & menses mouet, oris halitum commendat, vt lignum aloës verum. Cyperus Indicus inter zingiberis radices inuētus Curcuma Venetiis dicitur. Ad odoris gratiam Cyperus additur tenuantibus capillos, libr. i. compo. phar. part. à figura caulis iuncus triangularis Plinio dicitur: quadratus Celso, licet rarò fit quadrangulus: angulosus Dioscoridi non definito angulorum numero. Cyperus Babylonicus Galanga (de qua mox) quibusdam dicitur, vulgaris scilicet ac minor: nam maior Acorus esse dicta prius est.

Cyclamini radix tota vehementer medicamentosa, magis eiusdem succus: incidit, terget, ora venarum aperit, trahit, digerit, illitus abdomini ventrem purgat, per nares trahit, cum melle illitus suffusos iuuat, scirrhus mirè emendat, menses & sudores mouet. Costus subamarus, modice astringit, acer adeò & calidus, vt vlceret, Gal. lib. 7. simpl. & libr. 8. compo. phar. part. mihi Lugduno missus à Carolo Paludano eius vrbs medico iure primario, si Hieronymum Montuum nulli eruditione secundum exceperis. Costus præcellit Arabicus, candidus, leuis, eximia odoris gratia, recens, abundè plenus, densus, siccus, à teredinibus

*Paniūpor  
cin<sup>9</sup>, quia  
porci gra  
tus.*

*Dioscor.*

non

non erosus. Secundus est Indicus, vber, le-  
uis, niger. Tertius Syriacus, grauis, colore  
buxeus, odore feriens. Costus Arabum dul-  
cis, & amarus, Græcis indictus: sed *λίγυλον* Arabas passim imitanti Actu-  
ario di-  
citur in secundo Dialachan, & paulò post  
in diaromato. Costus autem hortēsis, herba  
quanquàm amara est, fuerit magis Piperitis  
aut Siliquastrum Plinij.

Cucumeris agrestis radix terget, digerit,  
emollit: potētius eius succus, Elaterium di-  
ctus, summè amarus ordine secundo cali-  
dus: menses mouet, cynanchis cum melle  
illinitur, ictericis cum lacte in nares trahi-  
tur & cephalalgicis.

**D**Aucus semine vehementer calet præ-  
cipuè agrestis, triplex Dioscoridi. Se-  
minis folius in aliis generibus vsus inua-  
luit, in cretico etiam radicis. Ob id Dauci  
Cretici radices scribit Gal. libr. 9. comp. ph.  
part. in malagmate diaspermaton.

*Dioscōr.*

Dictamni radix gustu calfacit, partus ac-  
celerat. Folia eius pulegio similia, maiora,  
densa lanugine obfita, in vsu sunt præcipuo  
ad ictus & morsus venenatos, ac cætera, quæ  
præstat pulegium: quo tamen ob essentia  
partium tenuitatem est efficacius. Horum  
foliorum vim largam Venetiis ad me at-  
tulerunt Simon Thomas, Stephanus Tul-

lerius, Martinus Gregorius, discipuli olim mei longe doctissimi, nunc medici æqualium celeberrimi. Quæ autem vulgò circumfertur dictamni radix, est potius pseudodictamni. Creticus laudatur potus & appositus. Metitur æstate & autumnò.

Doronicum Serapioni est radix parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis: calida sicca ordine tertio: flatus præcipuè vteri dissipat, cordis palpitationi confert, ipsumque roborat, venenosis moribus & ictibus auxiliatur, sumptum & admotum. In officinis habetur: *λαργαβάδιον* dicitur Actuário, vires illi easdem tribuent: tamen is in *διὰ μὲν* doronicum omittit, quod habet mesues in diambra compositione propè eadem.

Dracunculi radix aro acrior, amarior, ob id calidior, tenuior, viscera omnia purgat humoribus crassis & lentis à se tenuatis, viscera cacoëthe sanat, vitilignes terget cum aceto illita.

**E** Lenij radix odorata, subacris, amara, *Enula cæ*  
 calfacit non primo statim occurſu, sic *pana.*  
 eaque non exactè ob humorem in se re-  
 crementitium, tandem verò etiã rubrificar,  
*ischia*

ischiadas & affectus alios diuturnos ac frigidos: eclegmate cum melle, crassa & lenta expulmone & thorace expectorat, serpentium moribus prodest. Ex montibus & sicco solo præstantior, legitur æstate, particulatimque dissecta siccatur, vel melle aut saccharo cōdita seruatur: *ἐλίνιον λευκὸν καὶ ἑρυθρὸν* Actuarius appellat.

Ellebori vtriusque tum albi tum nigri radix multiplex, tenuis, ab oblongo & exiguo capite procedens, calida sicca, ordine tertio: sed nigra gustu calidior, alba amarior: pituitam ac bilem vtranque vacuat, alba magis vomitu, nigra deiectione: alphas, lichenas, psoras, lepras deterget. Alba melior Cyrenæica, nigra ex Anticyra: ambæ in montibus & asperis locis messibus effodiendæ, in vmbra siccandæ.

Eryngij radix longissima, intus alba, foris nigra, odorata: calida, ad primum ordinem sicca ad secundum: tenuium partium, ciet menses & vrinas, moribus venenatis resistit, flatus dissipat. Esula Serapionis est Pityusa Dioscoridis & Galeni, radice, semine, foliis, succo, tithymallorum more purgans: ob id etiam tithymalli species à quibusdam putatur. Mesuæ & Aui-cennæ esula parua, est tithymallus paralius, id est maritimus: magna verò est tithymal



mallus platyphyllos, viribus tamen sunt  
iisdem valentibus, scilicet in purgando.

**F**Oeniculus calidus ordine tertio, ficcus  
primo, semine magis quàm radice, mi-  
nùs foliis quibus lac gignit, vt illis vrinas  
& menses magis ciet. Cortex radice in vsu  
est frequenti, lib. 8. comp. ph. part. *μαλα- Mara-*  
*δραπέριον* per λ vbiq̃ue scribit Actuarius, *thrum*  
id est, marathri semen. *cū Gra-*

Filicis radix maximè utilis amara, sub-  
astringens, lumbricos latos necat, partum *Gal. lib. 8.*  
mortuū eiicit, vlcera valenter sed sine mor- *simp.*  
su siccat imposita, hepatis meatus probè ter-  
get sine manifesta calfactione aut refrige-  
ratione. Gal. lib. 8. comp. ph. part.

**G**Alanga Actuaria Barbaros in multis  
imitato, est radix subrubra, genicula-  
ta, intorta, grauis, sapore acerrimo linguā  
admodū vellicante, calida, sicca tertio gra-  
du, odore & figura quadā cyperi: vnde qui-  
busdam Cyperus Babylonicus dicitur, vt  
prius in Acoro & Cypero docuimus. Adul-  
teratur cyperi radice aceto piperato mace-  
rata, sed adulteratio intrò non penetrat.  
Coctionem iuuat, flatus dissipat, oris hali- *Serapio.*  
tum commendat, venerem excitat etiam  
ore retenta, cerebrum roborat naribus in-



data, cordis palpitationi prodest.

Gentiana radice est ob multam amaritudinem efficaci, ad tergendum, tenuandū, purgādum, obstruēta liberandum: propter quam aloë Gallica dicitur: à Gentio Illyricorum rege inuenta & dicta.

*Dioscor.* Glycyrrhiza, Aētuario sæpe Glycyrrhizon, γλυκῆα ῥίζα, & absolutè γλυκῆα, lib. 7. comp. ph. part. dicitur Romanis dulcis radix, nobis partium metathesi Riglyce: radice sola & succo ex hac recenti expresso, dulci, & leuiter astringente valet, tepida, temperato proxima, modicè humida, vnde quia sitim sedat, ἀδίψα quoque dicitur. Asperitates lenit arteriæ & vesicæ scabræ. Melior nigricans & lenta, quàm buxea & fragilis. Puluis radicum eius pterygia seu vngues oculorum leuat. Dioscorides.

Gramen, seu gramen pecori esculentum radice est modicè frigida & sicca, parum mordaci, substantiæ tenuitatem exiguam fortita, qua calculos potu interdum frāgit.

**H**Ermodactyli duo fastigia facit Mesues, vnum radice digitali longitudine, quod Ephemerum esse videtur Dioscoridis, Gale. & Pauli: radice oblonga, digitali crassitudine, odoratum, iris agrestis appellatum, repellendi & digerendi facultate præ

præditum. Alterum radice rotunda, & ea foris vel nigra (quod Colchicum est ephemerum & deleterium, prædictis autoribus passim frequens, flore croci per autumnum erumpente) vel rubente, vel alba, ut intus, quam eligit solam, si crassa sit, ac modicè dura, & ex loco edito lecta: calida sicca initio secundi gradus, stomacho aduersissima est. Pituitam crassam à iuncturis præsertim extrahit, ob id podagræ, & ipsi arthritidi prodest, per se, vel decocto sumpta, aut etiã admota cum farina hordei, vitellis ouorum, mica panis.

Hæc omnino est, quam Paulus Hermodactylum vocat, & ab utroque ephemero separat, veteribus indicta radix, uti & quæ rubens Mesuæ dicitur. An verò quæ in officinis ostenditur, horum sit Hermodactylus, vel Colchicum, discernere non est difficile his qui legunt, aut integras habent radices, nam delibratæ ad nos conuehuntur. Canis tamen largam eius vim per me depastus innoxie, & multorum turò hac radice purgatorum experientia quotidiana facit, ut credam vel Hermodactylum huc esse Mesuæ, & neotericorum, veteribus indictum, vel saltem non esse Colchicum. Actuarium miror inter purgantia simplicia hunc non descripsisse, cum toties eius meminerit in

compositis medicamentis, ἡρμόδακτον λευ-  
κὸν καὶ ἄλινον alicubi appellans. Serapio  
hermodactyli nomine principio Dioscori-  
dis Colchicum repræsentat, deinde etiam  
ephemeron. De omni hoc genere Musa in  
examine simplicium, & Tagaultius suis in  
Mesue simplicia annotationibus doctis pa-  
riter ac luculentis accuratius scribunt.

*Li. 1. an-  
tidotorū.*

**I**Ridis radix laudatior parua, densa, fran-  
gi contumax, subruffa, amara, sternuta-  
menta dum tunditur ciens, odorata, qualis  
ex Illyride mediterranea Dioscoridi, Ga-  
leno, cæteris omnibus prædicatur: ob id  
eam Illyridem vocare consuevit Andro-  
machus. Elige autem in Illyricæ genere o-  
doratiorem: nam vnumquodque est præ-  
stantissimum, quod generis sui odorem  
habet valentissimum. Iris autem quæ ex  
Libya magna Romam affertur, tantum ab  
Illyrica deficit, quantum corpus mortuum  
à viuo. Quæ autem in aliis regionibus cre-  
scit, non ita multum deficit: vnde Iris Gal-  
lica alba purgata vsurpatur, lib. 8. comp. ph.  
part. & hodie passim Florentina pro Illy-  
rica nobis obtruditur. Iris coquit, tenuat,  
calfacit, pituitam crassam & bilem purgat,  
humorem ex pulmonibus crassum expe-  
ctorat. Ireos sylvestris radix lib. 10. comp.  
ph. par. ephemeris radix videtur accipienda,

*Lib. 6. &  
9. c. ph. p.  
Li. 1. an-  
tid.*

*Libr. 9. c.  
ph. p.  
Diosc.*

de

de qua nunc in Hermodactylo egimus: vel potius spathulæ foetidæ vulgò dictæ, flore & reliquo habitu Iridem omnino referentis.

Isatidis radix in diachamæmelo Actuario ea est amara, astringit valenter, siccat sine morfu, ob hæc vulnera magna etiam in capitibus muscutorū duræ carnis glutinat.

*Li. 6. sim.*

**L**ilij radix terget primo ordine, digerit moderatè, emollit, menses ciet, vulnera glutinat, etiam in capitibus muscutorū cum melle mista. Eadem præstat folium, sed imbecillius. Flos verò substantia constat mista ex tenui & terrea, & aquea: coctus ex oleo mollit, & citra morsum digerit. Lilij radix mollit, coquit, terget, discutit: ob hæc vitiligines, lepras, ploras, achoras, furfures emendat, Diosco. addito melle, vel alio, vimeius tergendī imbecillam augente, Gal. lib. 7. simpl.

*Gal. li. 7. simpl.*

*Gal. in fine c. ph. p.*

**M**Andragoræ maris ceu præstantioris delibratæ radicis cortex crassus, lino traiectus ad vsum suspenditur, refrigerandi valentissimæ, vt ordine tertio, & siccandi primo. Eiusdem & pomi succus prælo expressus, insolatúsque donec concreuerit, fictili reponitur ad vsus eosdem: sed in po-

*Gal. li. 7. simpli. & Dioscori.*

mo cum calore quodam est aliquid humiditatis, à qua est soporiferum.

*Li. 1. antidot.*

*Li. 9. c.*

*ph. p.*

*li. 7. sim.*

Meum nobis frequens, Dioscoridis picturam explet, tamen præstantius Macedonicum, aut Hispanicum: sed Athamanticum laudat Andromachus minor in sua theriacle. Calidum est ordine tertio, siccum secundo, vrinas & menses mouet, vt asarum, sed largo vsu, cephalalgicum est.

*Li. 8. sim.*

**N**ardi spica & radix, calida excessu primo, sicca secundo: astringit, subacris, & leuiter amara, iecur & stomachum roborat, sumpta & admota, vrinam ciet, fluxiones intestinorum, capitis, thoracis siccat. Nardus igitur mistæ est substantiæ & facultatis tum digerentis, tum repellentis, & roborantis. Nardus prætereà vim habet non exiguam coquendi omnes frigidas dispositiones. Ea est multiplex, præstantissima est Indica, secundo loco Gallica, post Cretica, & quæ apud nos montana ex Cilicia, & nardina herba potius quàm nardus vocatur. Radix nardi Indicæ, & apud nos montanæ modicè astringit. Nardus Indica quanquàm radix est, tamen etià *ναρδος ῥαχὺς*, seu cum Actuatio & Hera. li. 6. comp. ph. part. in diabesasa *ναρδος ῥαχὺς*, id est, spicanardi, à similitudine formæ cum spica.

Tamen

*Lib. 6. c.*

*3. c. ph. p.*

*Lib. 9. c.*

*ph. p.*

*Lib. 6. c.*

*ph. p.*

*Lib. 1. antidot.*



Tamē Philo in sua antidoto Creticam nardum, vel, vt alij eius ænigma interpretantur, Indicam radicis falso nomine dici autumat, quoniā spica nardi nūcupatur. Nardi Gallicę cum radicibus & terra circumdata fasciculum vnum cum aliis ad columellas laxatas adhibet Archigenes: astringit enim & digerit nardus Gallica, ambo mediocriter. Nardi Celticę flores vsurpantur lib.8.eiusdem in tertio Andromachi medicamento. Nardus autem Gallica, seu Celtica dicitur: nam gentem eandem Gallos, Galatas, & familiarit̃s Celtas appellant. In Ligurię alpibus ea nascitur Dioscoridi. Radice igitur vtilior apparet ex initio li.8.simp. & locis prædictis, spica tamen non inutilis. Laudatur enim recens, levis, larga coma, spica breui, flaua, odoratissima, cyperum redolente, diūque in sua odoris gratia permanens, amara, linguam mordens. Nardus etiā Syriaca vsurpatur in arteriace 12. Andromachi, sed imbecillior est quā Indica. Fugienda nardus quę *ἐκπληγ*, id est elota dicitur, & eligenda quę *ὑμφας* lingua Barbarorum dicitur. Spica vulgaris, odoris & saporis gratiam illam non habet, imò inter coquendum odoris est grauissimi, & ægros lædit: estque verius pseudonardus, quā vera nardus.

*Lib.9.c.  
ph.p.*

*Lib.6.c.  
ph.p.  
Ibidem.*

*Lib.1.an-  
tidot.*

*Lib.7.c.  
ph.p.*

*Lib.1.an-  
tidot.*



*Diosco.**Vitiflora.*

**O**Enāthes radix in multa capitella ceu oliuæ fructus extuberās, ex vino strāguriæ subuenit. Oenanthe autem vitis agrestis ac erraticæ flos cū germine astringens in vsu est frequentiori Medicorum. Gal. initio li. 8. comp. ph. part. & li. 7. meth.

*Gale. li. 1.**antid.*

**P**etroselinum, id est, apium petrosum omnibus notum, in regione Macedoniæ præcipiti nec magna laudatissimum nascitur, hoc est, acerrimum & amarissimum, maximè si recens fuerit, sed paucum, à qua Estreaticum dicitur & Macedonicum. Plurimum verò in Epiro gignitur, ex qua in Macedoniam comportatum, & propè totum in Theffalonicen: inde tanquam Macedonicum à mercatoribus diuehitur: alioqui vniuersis gentibus non sufficiat. Quomodo mel Atticum melle ex Cycladibus locupletant, próque Attico vendunt: & vinum Falernum in parua quadam Italiæ regione paucum genitum, sic ab indigenis adulteratur, vt in omnem Romanorum imperio subditam regionem feratur. Si autem Estreaticum Macedonicumque petroselinum desideras, nihil peior, sed minùs amara erit theriace, & alia antidorus, si alterum iniicias. Non enim deleteriis pharmacis, aut virulentarum bestiarum moribus

adeò

adeò aduersatur, quod principalissimum est theriacis promissum: sed id hydropicis, imbecilibus, & aliis quibusdam similibus affectibus succurrit. Hæc Gal. lib. 8. simpl. Calidum siccum ordine tertio, acre, & amarum, incidit, vrinas & menses affatim ciet, flatus dissipat: semine tamen quàm radice & foliis est valentius: quapropter id maxime in vsu est.

Pyrethrum ab ignea & caustica vrentēque vi dictum, quā mansu saliuam potentius, quàm pro caloris modo elicit: vnde & Saliuaris quoque Latinis dicitur. In Apœnino frequens, annis quinque seruatur: affectibus omnibus frigidis efficax.

*Gal. li. 8.  
simpl.  
Diosc.*

Pæoniæ maris radix longa, althææ æmula rotundatur contra epilepsiam & melancholiam recens collo appendenda potius quàm fœminæ radix. Luna autem decrescēte hanc legi volunt: leuiter astringit, subamara est cum quadam dulcedine & acrimonia, si diutius mandas, menses ciet, obstructa hepatis & renum expurgat.

*Manardus in epi-  
stolis.  
Li. 6. sim.*

Peucedani radix calida ordine secundo, sicca tertio, incidit, tenuat, digerit, affectibus neruorum frigidis, lieni indurato, pulmonis facto pituita crassa, lenta, vlceribus contumacibus auxilio est. Succus ex hac expressus valentior est.

*Li. 8. sim.*

Phu Dioscoridis, & cæterorum Græcorum, nostræ Valerianæ plurimum expriment, nisi florum, qui in muscario pusilli sunt, magnitudo desideretur. Phu Ponticū aliquid habet simile nardo, & petroselino, & cæteris seminibus vrinam mouentibus li. 8. & 9. comp. ph. part. antidotis inseritur.

*Li. 8. sim.*

Polypodij radix dulcis, & austera, multum siccans, sed sine morfu, purgandi vim tacet Gal. bilem, pituitamque trahit, Dios. In quo non bilem sed melancholiam legit Serapio: sic & Mesues, & alij post eos plerique, melancholiæ purgatricē vim tribuūt. Sit crassum, solidū, cirrosum, ex rubro nigrescēs, colore intus herbaceo, vt pistaciū recēs, quercubus innatū potius quā saxis & muris: aliis cōtrā videtur, nisi astrigēdū sit.

*Mesues.*

Pentaphylli radix siccat ordine tertio, sine morfu, tenuiū est partium, minimum acris, & calida: Tormētilla putatur Leoniceno, Manardo, Ruellio, quæ nunc quinquefolia, nunc septemfolia his & mihi sæpe visa est: vti & vulgare quinquefoliū etiā septēfoliū frequenter est: vti & Eupatoriū, quod etiā dicitur Pentaphyllum Gal. lib. 5. ph. part. Hæc radix in theriacen recipitur, & nostra tormentilla venenis & pesti resistere experientia multa est certissimum, vt si non sit eadem, eius loco vsurpari possit.

Rha,

**R**Ha, Rhaou, Rheon, Rhion, radix nigra, costo nigro foris, centaurio magno intus similis, sed minor & rufior, fungosa & laxa, aliquātulum levis, sine odore, teredinibus non exesa, quæ mansa colorem reddit pallidum, ad crocū inclinantē, facile fragilis, amara: præter hæc legit in Dioscoride Serapio, astringens, si plusculum mandatur, subacris: sanguinem expuentibus, cœliacis, dysentericis cōfert. Ex riguis ad Rha fluviū supra Pontū (vnde Rha Pōticū Græcis & Latinis, & radix Pontica Celso dicitur) & Bosporū septentrionali tractu affertur: parū purgatoriū experiētia posteriorū, licet inuenta sit rarissimū, & hodie propè ignotum: obscuratum opinor à Rha barbaro seu Indico, quod ex India meridionali in totam propè Europā quæstu maximo cōuehitur, odoratum, gravitate insigni cōmendabile, astringens, amarū, cholagogū magis, colore dum mādatur planè croceo. Quod siue idem sit genere cū Pontico, viribus tamen, colore, odore, pondere non nihil dissimile soli & cœli ratione, siue omnino diuersum, aliis disquirendum relinquo, quibus plus est orij, & facultatis: cū præsertim etiam celebres hodie medici in ea controuersia sibi non consent, & nunc idem, nunc diuersum affirmant. **Marnardus**

*Rha ponticum.*

*Diosc.*

*Gal.li.3. simpl.*

nardus nanq; in epistolis nunc idem, nunc diuersum cenſet: Meſues & Serapio ſuo Rhabarbaro tribunt omnia, quæ Dioſc. & Gal. Rheo. Mihi ſatis fuerit admonere, in locum Pontici iam propè deſiti Indicum viribus proximum, & vbique copioſum, potius eſſe ſufficiendum: tanto tamē parcius quanto efficacius, in Græcorum compoſitionibus, quàm centaurij magni radicem minimo virium commercio cum Pontico conuenientem. Præſertim autem ſufficiendum eſt, quod in Indico eſt astringēs magis, minūſque purgatorium, quale multum inuenitur: aut ſaltem eius macerati vel aſſi magna, prout Medicus iudicauerit. In Arabum autem compoſitionibus vtrunque diſtinguitur, illud Rheu Ponticum, hoc Raued Seni appellatum. Rhion vel ῥιον Ponticum, vel Rhiu Pontici radix ferè Galeno dicitur in compoſitis medic. part. 7. & 8. & in anti. ῥιον ποντικόν, & ῥιον βαρβαρικόν, Actuatio: & Rheu Pontici radix idem Pontica radix in Eſdræ antidoto: ῥιον ἰνδικόν Actuatio. in διαλλάχα pro Raued

*Meſues.* Seni Meſuæ. Seruatur annis 3. 4. pſillio, milio, cera oblitum ſola, vel cum terebinthina. Quod autem vulgus Europæ pro Rha Barbaro in hortis paſſim ferit, Lappathi genus omnino videtur, licet radicis colore



lore Rha Barbaro nonnihil sit affine, viribus autem plurimum abest. At cum reliqua Rhei vtriusque historia nemini scribatur, sed radicis solius, conuincere nequeas, congenerem plantam vel degenerare & diuersam, nisi ex partis vnius natura.

Rubia satiuia radice acerba, & amara, lienem & iecur expurgat, vrinas crassas, multas, sæpe etiam cruentas, & menses mouet, albos albos cum aceto terget. Cortex Rubiæ recipitur in antidotum ad lienem Aetuario.

**Σ** *Αρχιφάγον* Græcorum à nostra vulgari Saxifraga diuersum, tamen, vtrunque calculos renum cōfringere certum est: hoc multa neotericorum experientia, illud Galeno in theriace ad Pisonem, & lib. 5. san-  
*κίστρον ἢ ψυχρότερον* (quod locis aliosis gaudet Dioscor. *ῥομαῖσι* ἢ *βετονικῇ* amariuscula est, ac subacris, incidit, calculos renum rumpit, &c. lib. 7. simpl. & apud Dioscoridem capite cestri, seu betonica. *ἐπὶ ἢ τῶν λιθιῶντων, καὶ βετονικῆς τι πόας μίγνυται, καὶ κίστρο το παρὰ τοῖς κελύοις γενομένη, καλῶς ἢ πλεον βοτάνη τάντλω σαρχιφάγον.* lib. 5. san-  
 tuendæ in sene calculoso: nisi quod hic betonicam à cestro videtur separare, si pura est lectio, aut καὶ pro siue, vel id est capiendum.

Hac

Hac opinor causa Ruellius ætatis nostræ doctissimus medicus ex Dioscoride caput de Sarxiphago diuersum à capite de Betonica expunxit. Radix sarxiphagi Actuar. passim vsurpatur.

*Gal. li. 8.  
simpl.*

Scilla calida ordine secundo, admodum incidit: assam aut elixam sumi præstat, vt virium eius vehementia exoluatur. Legenda ex terra quando folia eius & caules omnino aruerunt, lib. i. antid. Scillæ albæ segmenta seu taleolæ cultello ligneo separata, lino traiectæ modicis interuallis ne se contingant, in vmbra siccantur diebus

*Dioscor.*

*Plinius c.*

*9. lib. 20.*

60. vt ex his fiat acetum scillites. Alba est masculus, eaque vtilior quàm fœmina nigra. De ea leges plura in compositis medicamentis de Pastillis scillinis.

*Tamari-  
scus lib. 7.  
simpl.*

**T** Amarix, seu Myrica, fructu, radice, foliis, extremis ramulis terget, incidit sine manifesta siccatione, parum astringit, tenuium partiū, lieni indurato cū aceto aut vino coctis prodest: fructus & cortex valentiùs astringunt. Fructum tamen & succum & non radicem adhibet splenicis remediis, lib. 9. comp. ph. part. Quintetiā trunco in vascula vel potoria vel escaria cauato, lienē arcano quodam odio suis & hominibus longo vsu absomit.

Thymelæa Dioscoridis, est Mezereon

Mesuræ

Mesua, vt patet conferenti fructum, myrti baccæ æmulum vtriq; , quod granum gni- dium dicitur Dioscoridi. Folia quæ oleæ similia faciūt ambo, sed angustiora Diosc. maiora Mesues: ramos Mesuæ bicubita- les, Dioscoridi tripedaneos. Cū hi cha- melææ (quam nonnulli mezereon putant) sint dodrantes & palmo tantū alti: vni- cam autem thymelæam facit Dioscorides multas mezerei species facit Mesues.

Turbith Serapionis, est Tripolium Dio- scoridis ad verbū. Turbith vel Turpetum Actuarij duplex est Dioscoridis, Alypon & Pityusa, quam etiam Turpet à Barbaris vo- cari scribit: nec fortè vox ea cum Leoni- ceno & aliis quibusdam expungenda ex Dioscoride fuerit, quum alias plerasque appellationes barbaras interponat. Tur- bith autem Mesuæ quibusdam videtur se- cunda tithymalli species. In hac opinio- num varietate de radice hodie parum comperta, & quæ viribus maleficis est præ- dita (quamuis enim crudam, & crassam, & lentam pituitam purgare dicatur, ma- gno id stomachi, cordis, & aliarum par- tium incommodo præstat) satius est, eius loco vel agaricum, vel aliam phlegmago- gam substituere. Laudant Arabes eius cor- ticem album, gummosum, vacuum arun- dina

dinaceum, recentem friabilem : corrigunt zingibere, & formatis ex eo trochiscis.

**Z**ingiber Galeno & aliis cum indigenis ferè dicitur : quibusdam Zinzi-ber : aliis Gingiber : radix est herbæ graminis modo serpentis : candicans, odorata, piperis sapore & viribus, nisi quod tardius calfacit, sed diutius, vti longum piper, ob humiditatem excrementosam : cuius occasione vtrunque teredinibus facile tentatur. Condiendum recens omnino est, nunquam vetus impostorum more. Mittitur ex Arabia & Troglodytica.

Zurumbeth Serapioni Auicennæ aliisque, & Zedoaria, *ῥοῦδαρ* Actuario in aurea antidoto dicitur, *ῥάδονα* eidem in *διανομή*, & in diantho, alibi *ῥάδονα* & *ῥάδονα*. res est ac nomen barbarum, Græcis prioribus incognitum.

Est autem radix aristolochiæ rotundæ æmula, sapore & colore zingiberis calidum siccum gradu secundo : flatus dissipat, odorem allij, capæ, vini tegit, morsui venenato resistit, vomitum cohibet.

\*

DE

## DE HERBIS.



Quæ prius in radicibus dicta sunt de collectione, repositione, duratione illarum: ad herbas transferri possunt, nisi quod his ferè recentibus utimur, quibusdam omnino, ut portulaca, lactuca, buglossò, atriplice, beta, brassica, acantho, nasturcio, helxine, mercuriali, viola nigra, intybo, fumaria, hioscyamo, mandragora, & aliis permultis. Quibusdam verò recentibus utimur, quando his mirioribus opus est, ut ruta, méthà, absinthiũ, abrotanũ: recētes minùs calent ob mistam humiditatem excrementosam: siccatae verò calidiores sentiuntur: & fumaria recēs minùs aluũ subducit magis sicca.

*Gal.li.7.  
simpl.*

Colliguntur ferè cum floribus herbæ aut seminibus, sic benedictus carduus acanthium putatus, cētarium paruum, calaminthe, chamædrys, chamæpitys, daucus, fumaria, maiorana, polium, pulegium origanum, serpillum, thymus: aut saltem cùm videntur folia magnitudine, odore, colore præsertim quæ cacumini sunt propiora.

Siccantur in vmbra magis, nisi si quæ scapo sunt crassiore, aut folio humidiorè, & ob id apto putrere. Vbi probè sunt siccatae, reponuntur uti radices, sed minùs diu seruari possunt: ob id quotannis mutandæ.





Absinthium triplex forma, sapore facultate planè diuersum, vt interim natales omittam. Primum generis nomine dicitur, quale præstantissimum est Ponticum. Id folio & flore est multò minore, quàm cætera

*Lib. 11. metho.* absinthia, & odore non insuauis, sed aromaticum quid præferente, qui reliquis omnibus planè fœdus: quapropter hæc fugienda. Utendum autem semper Pontico ad ventriculi & hepatis phlegmonas, ad tergendum, purgandum, subducendum prauos humores stomacho hærentes, & roborandum dictas partes contrahendo & con-

*Lib. 8. cõ. ph. par. in hiera picra. Gal. li. 6. simp. initio & fine.* stringendo. Cùm enim omni absinthio duplex sit facultas & qualitas, in Pontico astrigens quidem plurima est, amara verò exigua: ob id calidum est excessu primo, siccum tertio. In cæteris absinthiis, vt abrotano, amara est vehementissima, astrictio autem obscura, aut prorsus nulla gustu sentitur: ob id stomacho sunt hæc inimicissima. Ponticum prætereà terget sordes tunicarum ventriculi, non tamen si quid altius in eo imbibitum est, foras extrahit, aut expellit, aut saltem parum id præstare valet ob iunctam insignem astringendi facultatem. Hieria autem picra propter id ex-

*Lib. 6. fami. tuen.* cogitata salubriter, illud ipsum potest. Ponticum

ticum autem videtur esse, quod Romanum Mesues vocat, quodque passim hodie visitur. Diuersus enim Mesues Gale. tantum est, quod siccum tertio gradu hic, ille secundo scribit. Quæ controuersia in aliis simplicibus multis est inter medicos etiam doctissimos: quorum vnus in fine, verbi gratia, primæ vel secundæ, alter in principio secundæ vel tertiæ intelligit: quæ ambiguitas etiam Gale. ipsi est in anetho, prasio, ruta agresti, & aliis permultis. Nam quod succum eius dicit Mesues ob nitrosam qualitatem nocere stomacho, ipsi Galid non aduersatur scribenti, succum longe ipsa herba esse calidiorem. Noster autem vulgare absinthium sarmetosum, folio & flore multo maiore, quam cætera tria absinthia: veteribus inter absinthia comprehensum non videtur, nisi esse velis absinthium primum Diosc. quod vulgo notum dicit, & βαθύνικον, vel potius βαρύπικον vocari à multa amaritudine, qualis in aloë, cui subscribitur Dioscoridi, à qua vulgus aloinā & forte appellat. Id autem, si primum in Dioscoride recipias, quænam alia in eo statues? Tamē id ad lūbricos, vri & fantonicū, est efficacissimum sumptum & admotum.

Abrotanum fœmina foliis seriphio & cypresso proximis albioribus: vnde cypressus & chamæcypressus vulgo dicitur. Mas

Lib. 6.  
simpl.

verò abrotanum generis nomen tenet, calidum ficcum tertio recessu à mediis, admodum amarum, coma cum floribus utile, ut absinthium & cineribus suorum sarmen-  
torum ad pilos reddendos.

*Libr. 6. simpl.* Acantha, vel Acanthus brancha vrsina vulgò: foliis modicè digerit, radice siccat, leuiter incidit, est tenuium partium, emolliendæ aluo iniectionibus hodie destinata.

*Li. 1. cōp. ph. p. & li. 6. simpl.* Adiantum, seu Polytrichon calido, frigido temperatum, gustu acerbo siccat, tenuat, digerit, ob id strumis confert, lapides frangit in nobis, crassa & lenta ex pulmone educit, capillos reddit, præsertim vstum. Triplex Dioscoridi esse videtur, primum speciatim Polytrichon vocat, Adiatum album Theophrastus. Gaza cum vulgo Capillum Veneris. Alterum Trichomanes nigrum Theophrastus, vulgus Polytrichon. Tertium foliis filicis, vulgò Adiantum: ut Dioscoridis textus hoc loco mancus videri possit. Nam foliorum filicis & lenticulæ tam dissimilium bis in eodem adianto non meminisset. Quartum addi potest Sal-

*Gal. li. 2. cōp. ph. p. in caluitio intempe- stiuo.* uia vita vulgò dicta: quartanis curandis efficax est. Galenus adiantum nō diuisit, fortè quòd omnium eadem sit facultas Calitrichon à nonnullis Trichomanes dicitur: tamen qui de herbis scripserūt, adiantum vo-  
cant

cant callitrichon potiùs quàm trichomanes: Polytrichon autem & callitrichon diuersa facit, lib. 1. comp. ph. part. Recens melius, nisi cū siccādū & astringēdū valētiùs.

*Αγν* ☉, id est, castus, quòd ad castitatem conferat, foliis & floribus sumptis & substratis, & semine frixo, vel non frixo: id enim sumptum, vt semen rutæ, nocturnas veneris imaginationes cohibet, lib. 6. sim. & lib. 6. sanit. tuendæ. Calfacit, siccāt ordine tertio, acris est ac astringens, & substantiæ multū tenuis, flatus omnium maximè discutit. Ob id lege lib. 1. alimētorum calfacit, non cum Græcis exemplaribus & veteri interprete refrigerat, quod effecta illic adscripta indicant. Item lib. 2. comp. ph. part. de cephalalgia ab æstu, vbi Agnū inter refrigerantia cōmemorat: & paulò pòst vbi Archigenis dicta distinguit, folia lauri calidissima. Agni verò mediocriter refrigerant, legerem non *ἀγνόν* sed *ἀνίνον*, quæ planta Dioscoridi refrigerat, & astringit, etiam si Gale. fortè alibi nusquàm ea herba sit vsus. Neq; enim placet elusio, quòd per accidens refrigerat: id enim etiam foliis lauri & calidis omnibus commune est.

Alyssos herba marrubio similis asperior tantum, & spinosioribus pilulis, flore cœruleo, aduersus rabiem efficacissima,

*Agnus  
castus, iū  
elis am-  
bobus vul  
gò.*

*Gal. li. 2.  
antido. c.  
Act.*

unde illi nomen. Legenda autem sub fer-  
nenti æstu caniculæ: siccata trita creta re-  
conditur, ne quid virium eius expiret.

*Li. 6. sim.* Anethum calidum secundo ordine, siccum  
primo, tenuium partium, digerit, ex oleo  
decoctum dolores sedat, somnum conciliat,  
crudos humores coquit, præsertim viride,  
quia minus calidum & humidius est. Vstū  
autem calidū siccum gradu tertio fit, vlce-  
ra præhumida præcipuè pudendorū & præ-  
putij cicatrice tegit.

Coma florum odoratissima, & semine  
nobis consuetissimum est.

**B**etonica amariuscula, subacris, incidit,  
calculos renum frangit, pulmonem,  
thoracem, hepar purgat & terget, menses  
mouet, epilepticis, acidum ructantibus,  
ischiadiciis, pota prodest: admota autē vlce-

*Li. 8. sim.* *cap.* *lib. 1.* *cop. ph. p.* *βίφαγος*. Beta viridis, alba, & nigra, nitrosæ  
est facultatis, qua digerit sine calore mani-  
festo, terget, per nares purgat, alba adhæc  
valentior: nigra substringit præsertim ra-  
dice: coquendo has vires exuit.

Blitum imbecilliter refrigerat & hume-  
stat: lib. 2. comp. ph. part. in secundo reces-  
su à temperatis, lib. 6. sim. iam vulgare est.

*Caulis.* Brassica esculenta sapore nitroso: parum  
acri, siccatur, terget sumpta & admota, indu-

ratur



ratas phlegmonas digerit, lepras terget,  
 vlcera etiam maligna glutinat. Cinis vltor- *Gal.li.7.*  
 rum eius cauliũ ficcitate est caustica, cum *simpl.*  
 adipe veteri mistus veteratos laterum do-  
 lores discutit. Brassicæ sylvestris semen  
 maximè tenuat, efficaciter ficcatur, & dige-  
 rit, lib. 9. comp. ph. part. Brassica marina *Soldanel-*  
 subsalsa, & subamara, ventrem deiicit, & *la.*  
 cætera præstat, quæ has qualitates sequi  
 consueuerunt. Buglossus bubula lingua *Gale.li.6.*  
 Catoni dicta, calida humida, ob id vinis *simpl.*  
 iniecta lætitiæ ac hilaritatis causa esse cre-  
 ditur, vnde Euphrosynon Græcis vocatur,  
 & nobis Corago, corruptè Borago, Her-  
 tussi ob faucium asperitatem natæ cocta in  
 melicrato confert. Iulio mense colligitur  
 Dioscori. Buglossum magnum, Cirsium  
 Dioscoridi dictum, Buglossus vulgaris vi-  
 detur, caule dum veterauit triangulo, vel  
 in triangulum inclinâte, runcque tam spi-  
 noso, vt citra noxam non tangatur. Notæ  
 tamen quædam Dio. In vtroq; desiderantur.  
**C**Arduus à nostris Benedictus, ob sin-  
 gularem plantæ totius amarissimæ  
 facultatem aduersus pestilentes, putresque  
 alios affectus: an verò sit acanthiũ vel cha-  
 mazleontis quædam species, dictu facile nõ  
 est ob imperfectam horum historiam.

Cichorium, Romana lingua Intybum *Li.8. sim.*

olus dicitur, Gal. lib. 2. comp. ph. part. Id verò & reliquæ sereos species, foliorum magnitudine & cultu distincte, facultatibus parum discrepant, nisi quòd agrestia satius sint sicciora & amariora. Omnia enim hæc subamara sunt, subfrigida, modicè astringentia: sed agrestia frigida sicca secundo ordine: domestica verò magis refrigerant, & in his multa humiditas mista siccitatem extinguit. Ob hæc hepatis intemperiem calidā tum solā, tum cū corruptis humoribus & ichoribus maximè iuvant refrigerando, roborando simam eius partem & gibbam obstructione liberādo: præsertim si cum vino albo bibantur, & cū melle, sic enim illos humores per vrinas pellunt: nec frigida multum lædunt, vt alia permulta, quæ sunt frigida, humida sine amaritudine & astrictione: sumuntur succo, decocto pulvere, lib. 8. compo. phar. part.

Condrilla omnis, & Sonchus, & Hieracium vtrunque sereos species etiam Dioscoridi & Galeno putata, & sereos ac ichorij nomine etiam ab his & aliis dignata (licet Chondrillam lactuæ non seri iungat, lib. 2. alimentorum) vt forma & temperatura sunt affines, sic viribus minimū discrepant. Ob id ea tanquàm congeneria iungit Dioscorides. Pro intybo autē vul-

gus Endiuuiam re & nomine corrupit, vt pro feri scariolam quasi feriolam dicere tentauit.

Calaminthe, vel cum Nicandro Calaminthum, Galeno duplex est: domestica, & eo efficacior montana, quam ab Andromacho minore miratur Nepitham voce Romana potius quam Calaminthen Græca vocari in sua theriace, cū cætera Græcè appellarit. Dioscoridi triplex est, primò montana, vulgare calamentū: secunda pulgiū syluestre, tertia herba cataria Ruelio videtur. Musæ contrā, tertia vulgare calamentum, secunda cataria putatur. Ob imperfectam omniū historiam in hac sententiarum varietate iudicium difficile, *λαμίνδην πωλάμιν* addit Aët. Galeosis autem quæ vulgò herba cataria putatur, esse vrtica fœtida purpurascensibus floribus videtur. Calaminthe calida sicca gradu tertio, acris, parum amara, tenui substantia, cum calfacit, mordet, sugit, postremò vlcerat: tamen eius succum vulneri etiam cerebri meningas diuidenti infusum, milij farina *fæci* superiecta glutinare affirmat Archigenes apud Gal. lib. 2. compo. phar. part. Chamædrys, id est, quercula, amara, subacris, calida sicca tertio gradu, sed calidior paulò quam siccior. Ex Creta Cæsari affe-

*Libr. 6. c.  
ph. par. et  
li. 7. simp.*

*Li. 1. an-  
tidotor.*

*Li. 7. sim.*

*Li. 8. sim-  
pli.*

*Li. 1. an-  
tido. Ga.*

rebat̃ur ad theriac̃es compositionem: tamē  
vbiq; nascitur, etiam in Romæ suburbis,  
odore & gustu quā Cretica vehemētor,  
præsertim si multo imbre non fuerit irro-  
rata, quamuis hac campestris sit melior.

Prægnans semine cum Diosc. aut succo cum  
Plinio, aut etiam flore cum Gale. carpitur.

*Li. 8. sim.* Chamæpitys, id est, pinus pumila, quod o-  
dore & foliis eam imitatur, Aiuga Idea  
Scribonio dicitur, aliis Abiga, vulgo Iua:  
calida secundo gradu, sicca tertio: amarior  
quā acrior, terget, purgat, obstructū ie-  
cur liberat, ictericis ischiadicis tum meli-  
crato pota succurrit, menses, vrinas ciet, vi-  
ridis vulnera magna glutinat, vlcera pu-  
trefcentia sanat, mammarum durities dis-  
cutit. Huius radicem vsurpat Asclepia-  
des, succo tamen decocto, semine, puluere  
idem pollet, Gale. lib. 8. comp. ph. part.

*Li. 7. sim.* Cicutā refrigerat extremē, id est, quarto  
gradu, ob id lethalis est: eius vna species no-  
bis est pumila odorata, quæ frixa & admo-  
ta dolorum causas leues dissipat. Cicutæ  
semē extortitur, li. 10. cōp. ph. par. in fin.

**E**upatorium, vel Hepatorium, vel He-  
patitis, omnino agrimonia vulgaris  
videtur, Diosco. Eupatorium cum Serapio-  
nis agrimonia, & Mesuæ eupatorio confe-  
renti. Corruptū verò nomen ex argemone

appa

apparet, quàm falsò Eupatorium quidam  
 (vt Dioscor. ait) putarunt: incidit, terget, *Li. 6. sim.*  
 tenuium est partium sine manifesto calore,  
 subastringit, iecoris ob id obstructions  
 aperit, ipsúmque roborat, vnde & nomen  
 inuenit: vel cum Cicerone, ab Eupatore  
 rege. Hanc etiā Pentaphyllū vocari, quòd  
 folio sit quinquepartito, scribit Gale. lib. 5.  
 comp. ph. part. vt dixi in Pentaphylli radi-  
 ce. Eupatorij nunc folia, nunc radicem  
 Actuarius miscet. Eufragia veteribus in- *Herm.*  
 comperta herba, Pampinulæ similis, folio *laus in*  
 minore, & magis serrato, flore luteo, præ- *sarxi-*  
 cipuæ claritatis ad omnia oculorum vitia: *phago.*  
 vnde ophthalmica dici potest: ab euphro-  
 syno detortum nomen apparet. Montana  
 melior, quæ ferè est polyclonos, alibi mo-  
 noclonos magis.

**F** Vmaria acris, amara, subacerba, vri- *Li. 7. sim.*  
 nam biliosam & multam commandu- *Dioscor.*  
 cata aut pota prouocat, hepar obstructum *Mefues.*  
 purgat & roborat, scabiem & pruritum in-  
 de sanat: siccata ventriculum cum vino  
 roborat, cum melicrato aluum subducit,  
 succo suo oculorum claritatem, & dela-  
 crymationem fumi modo molitur, vnde  
 illi nomen.

**G** Allitrichum pro Gallicentrū Ruellio  
 videtur esse Horminū Græcorū, aliis  
 Ver



Verbenaca recta, ob picturæ Hormini & verbenacæ rectæ obscuram breuitatem, iudicium difficile. Callitrichon autem prius in Adianto diximus.

*Li. 8. simpl.*

**H**YOSCYAMUS, id est, Suis faba, quòd eius pastu apri conuellantur, & resoluantur, nisi mox caneros fluuiales ederint, Helianus: his enim fabis apros Erymanthios in Arcadia ab Hercule occisos scribit Philo in sua antidoto, lib. 9. compo. ph. part. Galeni. Triplex Dioscoridi & Galeno: primus flore purpurascente, semine nigro, venenosissimus: alter flore & semine luteo, mitior, sed etiam deleterius: tertius flore & semine candido, ad sanationes aptissimus, frigidus ordine tertio, siccus primo, Gal. lib. 3. methodi.

*Gal. li. 8. simpl.*

**H**YSSOPUM calidum siccum ordine tertio, tenuium partium: crassa & lenta ex pulmonibus extrahit, humorem crassum per aluum etiam purgat, obstructions terget: montanum est efficacius hortensi: Ciliacium præfert Dioscorides: Creticum verò commendatur Archigeni, libr. 8. comp. ph. part. Gal. in Chrysocome & origano Heracleotico. Quædam à Dioscoride Hyssopo tribuuntur, quæ in nostro desiderari videntur. Cum florum spica legendum est aut cum semine turget.

*Dioscor.*

**L**auri folia & fructus calfaciunt, & sic- *Li. 6. sim.*  
cant vehementer, sed hi magis quàm *et lib. 2.*  
illa: leuiter astringere addit Dioscorides, *c. ph. part.*  
quam vim & amaritudinem soli radici cor-  
tici tribuit Galen. qua calculos confringit.

Lapathū digerit modicè, oxylapathum *Gal. li. 7.*  
digerit & repellit, vtriusque semen leuiter *simp.*  
astringit, vnde dysenterias & diarrhœas  
sanat præcipuè oxylapathi. Hippolapa-  
thum, quod in aquis omnino nascitur, ea-  
dem præstat, sed imbecillius: idem verò va-  
lentius fuerit in hortos hodie translatum.

**M**arrubium, seu Prasium album, sapo- *Li. 8. sim.*  
re amaro, calidum ordine secundo,  
siccum tertio: lienis & hepatis obstructio-  
nes soluit, pulmonem & thoracem purgat,  
menses ciet, admotum terget, digerit, &  
cum melle oculorum aciem claram reddit.

Malabathrum sui generis foliū, Indicæ *Libr. x. c.*  
nardo, vt odore & sapore, sic viribus simil- *ph. par. et*  
limum, sed nardo efficacius. Laudatur re- *lib. 7. sim.*  
cens ex candido nigricans, contumax fran- *Dioscor.*  
gi, integrum, odore vegeto nares feriente,  
& qui folio semoto persistat. Id nunc de-  
fiit, à quo tamen vnguentum foliatum di-  
uitibus Romanis mulieribus frequens est  
dictum. Defiit & folium Syriacæ arboris  
Plinio celebratum. In horum locum Mau-  
ri inuexerunt folium laurino proximum,  
sed

sed maius, & nervis tribus folium inter-  
cursantibus distinctum, odore iucundo. Pri-  
mum illud folium Indum dicitur Serapio-  
ni: tamē Actuarius in hedychroo magma-  
te, φύλλον ἰνδίου, & φύλλον μαλακάθρον ceu  
diuersa miscet: φύλλον ab his diuersissimū  
Dioscoridi describitur, vulgò Italis folium  
syluestre dictum, Hermol.

Lib. I. an-  
do.

Maron herba furculosa vulgò cognita;  
flore origani, sed odoratiore, foliis multò  
candidioribus, subastringit, modicè cal-  
facit, sisymbrio similiter, Dioscor. Ma-  
ron planta est vehementer odorata & ama-  
ra, amaraco proxima, quò tamen est multò  
odoratior & amarior, minùs tamen eò est  
acris, vnguento amaracino fortè dicto,  
quòd amaraci plurimum olim reciperet,  
nunc solum marum immittunt, satius ta-  
men est: æqualem amaraci & mari portio-  
nem imponere, vt hedychroi compositio-  
ni: qua mistione minùs quidem odorum,  
non tamen minùs efficax erit, hæc Gal. Su-  
spicio est nobis vehemens Marum esse her-  
bam Mastic vulgò dictam, maioranæ si-  
millimam, flore tamen muscoso in pappos  
abente.

Maiorana, amaracus, Sampsychus, Dio-  
scoridi, Theophrasto, Plinio eadem sunt  
herba: vnguentum tamen amaracinum à  
sam

*sampsycho* cur diuersum sit Diosco. do-  
ctè mihi *Musa* coniectare videtur ex plan-  
tæ huius appellatione consueta vtriq; re-  
gioni, in qua vtrunque id vnguentum fie-  
bat laudatissimum: Calida est herba & sic-  
ca ordine tertio, & tenuium partium Sam-  
psycho, Gal. lib. 8. simpl. Amaracum verò  
calidum ordine tertio, siccum secundo, idem  
lib. 6. simpl. Ex qua temperamēti varietate,  
& quòd seorsum de his agit, Amaracum  
Galeno, & post eum Paulo esse dictā, vulgò  
*Matricariā* suspicantur Hermolaus, Ma-  
nardus, quæ iisdem autoribus Dioscor. est  
*Parthenium*: sed amaracum Galeni nō esse  
*Matricariam* vulgarem odore aspernabili,  
sapore amarissimo, conuincit quæ de Ma-  
ro & Amaraco nuper ex Gale. antido. pro-  
tulimus. Adhæc Amaracum se vidisse in  
Italia crescere scribit Gale. lib. 1. antidoto-  
tanquàm planta esset Italiæ rara, cū tamen  
Romæ familiarem esse *Matricariā* *Musa*  
Ferrariensis affirmat. Nec satis ad confir-  
mandam ipsorum sententiā est, Galenum  
bis de re eadem non scripsisse, cū bis de  
*absinthio*, de *astere* seu *bubonio*, de *chalci-  
ti* scripserit. Parui prætereà est momenti  
varietas ordinum siccitatis, quòd scilicet  
amaracus sit siccus ordine secundo, sam-  
sycho autem tertio: ille enim cōpleto, hic  
inci

incipiente esse possit, vt in absinthio dixi. Quo fit, vt ex his plantas esse varias nemo possit colligere.

*Melissa.* Melissophyllon, id est, apum foliū, quod herba hæc præsertim florente, apes plurimum gaudeant; vnde Apiastrum Latinis dicitur: & à citri odore Citrago. Viribus est marrubio simile sed imbecillius, ob id etiam vsu rarius.

*Li.7.sim.*

*Ibidem.* Myriophyllum, Romanis Millefoliū, ficcitate multa glutinat vlcera.

*Li.8.sim.* **O**Rigani genus omne calidum ficcum tertio ordine, incidit ac tenuat. Tragoriganum etiam subastringit, præfertur montanum, vel Creticum, vel Heracleoticum.

*Gal.li.6. simpl. & li.3.c.ph. part.* **P**Lantago refrigerat ficit, ordine secundo, astringit, repellit, digerit: ob hæc vlcera recentia & vetera etiam rebellia glutinat, hæmorrhagiam sistit, fluxiones & putredines, & ab his dysenterias coercet, hepatis & renum obstructions tollit. Semen & radix eadem præstant, sed ficiant magis, refrigerant minùs. Adhæc semini adest essentia tenuitas. Duo eius genera facit Dioscorides paruam, & hac efficaciorẽ magnam. Præter hæc est tertium nobis Arnoglossum, vel Arnoglossa nomine generis appellatum, folio rotund



rundiore, sessili, hirsuto, in vsu medicorum frequentissimum.

Portulaca frigida ordine tertio, humida *Lib. 2. cō.*  
 secundo, subaustera: fluxiones biliosas, & *ph. p. & li*  
 æstus febriles maximè cohibet sumpta, & *br. 6. sim.*  
 admota. Hæmodiam, id est, dentium stupo- *Gal. li. 6.*  
 rem non omnem, sed eam solùm, quæ ab a- *simpli. &*  
 cerbis, austeris, acidis est nata, sanat: quia ab *de optima*  
 his asperè exiccata lenit: & replet humidi- *secta.*  
 tate lêta, Galenus: vel quia suo lentore aci-  
 dulo hærens, ac subiens, acorem illum sibi  
 affinem sapore ex dente extrahit, Aristote-  
 les sectione prima, problemate 38. Huius  
 autem effecti omnibus cogniri causam in-  
 explicabilem, & soli Deo notam, scribit A-  
 phrodiseus initio problematum suorum.

Populus duplex, λεύκη, id est, alba, & αἰ- *Lib. 6. sim.*  
 γυρ Gal. αἰγυρ Diosc. id est, nigra. egypti- *pli.*  
 ri αἰγυρ, id est, flores, seu σφαίρις, id est, pilulæ,  
 primo foliorum partu exilientia (vt in leu-  
 ce vocat Dioscor.) calida primo à tempera-  
 tis recessu: nam ἐν τῷ πρώτῳ ἀποστάσει, Pau- *Oculi po-*  
 lus, Manardus, Fuchsius in Galeno legunt: *puli.*  
 licet ἐν τῷ τρίτῳ, id est, in tertio, habeat co- *neutra po-*  
 dex Aldinus, & ita legerit in Arabibus, vn- *pulus flo-*  
 de vertit verus interpret: & Oribasius Græ- *rete vide-*  
 cus medicus lib. 2. ad Eunapium, & lib. 15. *tur Her-*  
 ad Iulianum Cæsarem, paulò sicciora, quàm *mol.*  
 quod humido & sicco est temperatum: te-

nuium partium potius quàm crassarum. Folia floribus sunt similia, sed imbecilliora: & resina eius exigua floribus similem habet facultatem, sed calidiorem: semen floribus & resina siccius, non multò calidius, sed partium est tenuium. De hac vtriusque populi lacryma in succino seu electro leges postea. Folia λευκας, id est, populi albæ, media sunt inter folia lauri calidissima, & folia ἀκύνæ

*Gal. Lib. 2. c. phar. 2. comp. ph. legendum censuerim potius part.* quàm ἄγυς, qui lib. 6. simp. dictus est calidus

ordine tertio, etiam si vetus ex Arabibus eo loco habeat agni casti. λευκας λευκός, id est, populi albæ fructus digerentis est facultatis, ibidem paulò antè. Gustanti Manardo Populum nigram & communem, visa est modicè astringere, postea minimùm amara, odore non insuavi, sed languido. Ex eius igitur floribus myracopum populeum refrigerat, cùm præter adipem & populi oculos modicè calida, cætera habeat frigida, etiam magna parte ad supremos vsque ordines. Populus alba temperata ex aquea tepida substantia, & terrea tenuata terget: Populi nigræ seu nō bicoloris flores multùm acres nobis sunt, ex his; vulgò fit vnguentum populeū: quod acopum δὲ ἀγύς apud Galenū & Paulum legitur, non δὲ λευκας.

*Lib. 7. simplic.*

Ruta

**R**uta hortensis est imbecillior agresti: *Lib.8. simplic.*  
 hæc enim calida ordine quarto, (tan-  
 tùm tertio dicitur libro 6.comp.ph.part. in  
 stomachica diabefasa) illa tertio: vtraque  
 acris, amara, tenuium partium, valenter  
 siccans, incidit, digerit valenter crassos &  
 lentos humores, vrinas mouet: flatus, & ve-  
 neris appetitum cohibet. Syluestris Moly,  
 Besanum, Besasa dicitur: Syri indigenæ  
 Harinola vocant, libr. 6. & 9.comp.ph.part.

Rosmarinus coronaria nobis est fre-  
 quens, vtilis folio & flore, quem vulgus ab-  
 solutè *ἀνθός* male vocat. nec antidotus *Ἀνθός* *Li.7. simplic.*  
*ἀνθός* Actuarij solius Rorismarini florem  
 recipit, sed aliorum, vt pòst leges. Sterilis li-  
 banotis ad Montem Pessulanum plurima.  
 Tertia fœcunda duplex est Dioscoridi: om-  
 nes emolliunt, incidunt, tergent, digerunt,  
 ictericis decocto profunt, & oculorum aciẽ  
 ab humorum crassitie obtusam succus ra-  
 dicis cum melle emendat.

**S**aluia quòd ad multa, præcipuè ad fœ-  
 cunditatem sit salutaris, *ἰαλίστη*  
 Græcis, quasi syluestris lens dicitur, folio  
 est maiore, scaldiore, scabriore: Sphace-  
 celus verò breuiore & lauiore. Quæ Theo-  
 phraستي verba nostram Saluiam francam  
 Sphacelo videntur exprimere. Calfacit e- *Lib.6 simplic.*  
 uidenter, & substringit *ἰαλίστη*.

Scordium ab odore & acrimonia scoro-

*Lib. 8. sim pli.* di, id est, allij, dictum est: subamarum, acerbum: calfacit, purgâtque viscera, obstructions liberat, vrinas & menses mouet: viride magna vulnera glutinat: siccu[m] autem sordida purgat, contumacia cicatrice regit. Optimum ex Creta petitur, quale etiã Andromachus iunior suæ theriacæ miscet: nō malum tamen in aliis regionibus possis inuenire. Putriferis animalium venenis & phar-  
*Li. 1. Antid.* macis deleteriis succurrit. Quæ vis eius inde est coniectata, quod quæ in bello occisa fuerant corpora, diuque insepulta super scordium fortè iacuerant, minus putria sunt inuenta, quod à viris quibusdam fide dignis acceptum tradit Gal. lib. 1. Antid. Nobis in agro Parisiensi locis riguis est largissimum verum scordium.

*Lib. 5. sim pli.* Scolopendrium idem cum Aspleno contendunt Musa & Massarius in librum nonum Plinij: tamen Galenus ait maiores huiusmodi obstructions vehementiora postulare remedia, capparis corticem, tamaricis radices, scolopendrium, & scillam, & eam herbam quæ asplenos appellatur, effectum id nomine representans. Vbi apertè scolopendrium ab Aspleno separat, licet postea in censu simplicium aspleni vires describat, scolopendrij non meminerit. Libro tamen Methodi

13. scolopendrion quoq; lienì conuenire scribit, nulla mētione asplenì facta: quanquàm ibi alia quoque eius remedia attingat. Diuerfas etiam herbas facere videtur in splenìcis, lib. 9. comp. ph. part. *μυρίκνης λιαρπῆς, βότάνης ἀσπλάνης λεγομένης σκολοπένδριον, ἢ ἡμιονίτιδ* & *ἀνὰ*: tamen paulò antè in Andromachi splenicis scribebat, *ἡμιονίτιδ* & *βότάνης ἢ οἱ μὲν ἄσπλυνον, οἱ δὲ σκολοπένδριον λέγουσιν*. Ex quibus colligere possis, herbas esse affines non viribus modò, sed forma & habitu, vnde nominum hæc incertitudo nata sit. Quod & in Dioscoride passim obseruabis, & in Aspleno quoque, quem ab aliquibus *σκολοπένδριον*, ab aliis *ἡμιόνιον* vocari ait: non tamen *ἡμιονίτιδα* dixit, quòd hæc folio sit diuersissimò, quam tamen *σπλάνιον* quoque vocari scribit. Vnde Massarius & ex Theophrasto affirmat Hemionum vel Hemionion esse vulgatum nobis Ceterach: Asplenon verò, seu scolopendrion plantam esse aliam, ex foliorum & radicum pictura persuadere conatur. Quæ autem vulgò est scolopendria, Dioscoridis est *φυλλίτις*, à quibusdam Lingua ceruina multò iustius appellata, quàm à Gaza Scolopendrion Theophrasti, quam rectius Centipedariam vertisset. Siue autem Ceterach sit asplenon aut scolopendrion, sine hemio-



nus dicta, quòd mulæ hac herba plurimum delectentur, parui est momenti, quòd hæ omnes lienem diminuunt, & liquent, & substantia tenui sine calo. & lapides etiam in vesica frangant: lib. autem 8. simplic. & Dioscorid. phyllitis acerba cùm sit, diarrhœas & dysenterias pota iuuat.

**Li. I. ant.**

Stœbe herba quæ apud nos nascitur fruticosa est, calida, acris, odoratum quippiam resipiens, ad vini conseruationem ne accescat, aptissima, si calor huius doliis admotæ ignis calore excitatus, vina crudiora percoxerit. Stœbe, quæ & Phleos dicitur, spinam habet in folio & caule Plin. lib. 21. cap. 15. lib. autem 22. cap. 11. omnia ex Diosc. Stœbe mutuatur, quòd astringat foliis & semine, ob id hæmorrhagiæ, dysenterię, oculis cruentatis, auribus purulentis conueniat, quæ vires Galeni Stœbæ acri & calidæ non conueniunt: neutra tamen harum nostra est Scabiosa vulgò dicta, quod scabiei sanandæ sit idonea, folio erucæ cùm adoleuit hirsuto, aculeis tamen non horrente, flore cœruleo, quæ pulmone purgando & hepati confert, & carbunculum recens admota horis tribus perrumpit. Psora autem Aërij non esse nostra Scabiosa hinc apparet, quòd huius vstæ fumo arborum erucæ non moriantur, imò non moueri eas  
magis

magis quàm stipularū fumo expertus sum:  
quam tamen facultatem Aëtius Pſoræ tri-  
buit.

**T** Hymum commendatur maximè At- *Lib.4.ſa-*  
ticum, aut ex locis ſiccis & editis: ca- *ni. tuend.*  
lidum ſiccum ordine tertio, incidit, menſes *Lib.6.ſim*  
& vrinas mouet, craſſa & lenta ex pulmone *plic.*  
& thorace expectorat.

**V** Erbaſcum, Phlomis Græcis vulgò *Lib.8.ſim*  
Tapſus barbatus, & Bullio albus & *plic.*  
niger: foliis terget, ſiccatur, digerit: radice eſt  
acerba, ad fluxionis affectus, & dentium  
dolorem idonea.

Verbenaca recta, id eſt, *πικριγών & ὀφθός*,  
præſertim viridis & recens, ſed etiam ſicca,  
cum radicibus oleo incocta, perſuſaque ca-  
piti, dolorem eius omnem diuturnum à frī-  
gore, aut craſſis humoribus omnium maxi-  
mè digerit, & caput roborat. Galen. lib. 2.  
composition. Pharm. part.

#### DE FLORIBVS.

**F** LORES vt plantarum partes re-  
liquæ legantur, cū maximè vi-  
gent, vt capparidis in gemma, roſa  
expandi cœpta, reliqui ſerè aper-  
ti. Sed haud ita pridem & ex quibus vis nō-  
dum exhalauit, ſiccantur ſole magis minus,  
pro varia ipſorum natura: quidam ſiccādos  
volunt, donec ex ponderibus decem vni-

cum superſit. Reponuntur vt alia, quotannis mutantur, quanuis ſchœnu anthos etiã decennium efficax ſeruari poſſit: chamæmelum item diu vegetum eſt, ob fortem partium ſuarum miſtionem.

Flores, abſinthij comæ, bugloſſi vtriuſque, chamædryos, chamæpityos, capparis, roriſmarini & aliorum quorundam in herbis prius dicti ſunt: reliqui ſunt dicendi.

**B**Alauſtium ſylueſtris punicæ flos, cytinus ſatiuæ & domesticæ Dioſcoridi & Galeno *νεῖ δὲ πῦμας ὅτε λυτῖται αἱ πρῶτοι φύλλοι*, id eſt, primogenia punica. Nam quando arbor florere deſinit, fructus ipſius apparet in mali Punici ſpeciem figuratus.

*Lib. 6. cō. ph. p.* Hi in fine Veris gignuntur, & meliores ſunt ex granatis acidis & acerbis, quia magis aſtringunt. Ibidem. Ambo tamen inſigniter aſtringunt, refrigerant, ſiccant, craſſæ ſunt ſubſtantix: ambo etiam hodie à medicis cum Plinio Balauſtia vocantur.

*Li. 6. ſimplic.* Buphthalmi flos cardiacus Actuar. oculi bubuli effigie, vnde illi nomen, colore flor  
*Lib. 3. ca. 9. & libr. 6. ſimplic.* ris Anthemidis, ſed multò maior & acrior, ob id valentiùs digerit: putatur eſſe Corula non fœtida, vulgo dicta Chamæmelum ab odore mali dictum, ſeu Anthemis: calfacit, ſiccatur ordine primo, ſtipata rarefacit. tenſa laxat,

laxat, plena digerit, dura emollit, essentiae tenuis ut rosarum succus, lassitudines soluit, dolores capitis & aliarum partium frigidos, si homo plethoricus non sit, nec cruditate laboret, sedat, libro secundo compositionis pharmacorum particul. biliosas febres percoctas, & quæ ex cutis densitate nascuntur, potu per sanat: melancholicas aurem, & pituitosas, & quæ ex visceris alicuius phlegmone oriuntur, concoctas strenuissime iuuat: ob id à sapientissimis Aegyptiorum vnicum putatur febrium omnium remedium. Tria huius genera Dioscoridi sunt flore tantum diuersa, intus in omnibus aureo, foris candido in leucanthemo, melino in chrysanthemo, purpureo in eranthemo, quod Vere floreat. His nominibus Mater distinxit.

*Chama-  
melum cõ-  
mune est  
leucanthemum.*

**C**aryophyllum, quasi nucifolium, quæuis hanc non seruet naturam, quæ nomine prætenditur: fructus est arboris Aëtio & Simeoni: flos autem est Paulo cuiusdam arboris Indicæ, festucaceus, niger, longus, acer, subamarus, odoratus: calidus siccus secundo gradu Aëtio, tertio gradu Paulo: ad obsonia suffusus, & multa medicamenta utilis. Dioscoridi & Galeno indictus.

*Clauus à  
figura vul-  
go dicitur.*

Crocus calidus ordine secundo, siccus primo, parum ac mediocriter astringit, qua

facultate cor & partes alias roborat, vt suo calore moderato coquit, ac digerit, & siccando modicè dispositiones pectoris phthificas iuuat, putredines corrigit, lib. comp. ph. part. 4. 7. 8. Optimus medicamenti est Coryceus recens, oblongus, integer, plenus, non fragilis, flauissimus, & qui cum humore tritus manus suo calore saturet, nec fitum nec cariem redolens, subacer, Diosco.

*Lib. 1. antid.*

Crocus Coryceus à Coryceo antro, in quo nascitur, veteribus atque adeò Poëtis præter ceteros celebratus: aliis sanè procerior est, non tamen aliis robore odoris aut diurnitate est præstantior. Eligendus verò est non procerior, sed odoratissimus, & flauissimus, & longo tempore in vigore suo persistens. Præstantissimum igitur aliquem crocum apto quodam ædium loco repositum obserua sæpe, vt pernoscas: nam id colorem odoremque pristinum diu seruabit: adulterati verò odor & color celeriter vanescit. Crocus Cilicius etiam laudatur, lib. 7. cōp. phar. part.

*Libro 14. metho.*

*λεονστή, et  
λεονστή,  
ε λεονστή,  
δύπ, &*

**E** Pithymum Græcorum est flos thymiatureæ similis, calidus siccus gradu tertio, omnia potest quæ thymus, sed efficacius, ob id illius penuria hoc vti licet, mensura tamen maiore. Datur Epithymum drachmas quatuor cum sero lactis vel mulla, ad educen



educēdum humorem melancholicum. *Horum loco si Arabum epithymo, hoc est, cas-* *ναορυθῆρ*  
*leges in*  
*Act.*  
 futha thymo innata, vt satireæ seu thym-  
 bræ epithymbrum Actuatio dictum, & hyf-  
 fopo, & maioranæ, epyssopum: & orobo  
 orobanche: & lino linanche, vti libet, quia  
 vires cum thymi flore easdem illi Pli-  
 nius veterum solus tribuit, dabitur cum  
 Mesue ob imbecillitatem à drachmis qua-  
 tuordecim ad drachmas viginti. Epithy-  
 mus autem Arabum, vt thymus, est duplex,  
 hortensis, & hoc calidior ficior Mon-  
 tanus.

Ericæ digerentis plantæ flore potissi- *Libr. 6.*  
 mum ac foliis vtendum: semen etiam adhi- *simpl.*  
 betur lib. 6. comp. ph. part. Ericæ fructus sæ-  
 pe lib. 9 comp. ph. part. in splenicis.

**G**enistæ nostratis, & Sparti folia, flo-  
 res, semina, succus valenter trahunt,  
 ob id anginis, ischiadibus salubriter ad-  
 mouentur, & hy-tropicis sumuntur.

Flores eius antequàm dehiscant, aceto & *Libr. 8.*  
 sale conditi annos etiam tres integri ser- *simpl.*  
 uantur, idonei primis mensis, & delicati  
 capparum loco, quibus etiam valentius ob-  
 structa liberant.

**I**ov, id est, viola omnis, & præcipuè ni-  
 gra seu purpurea, quamvis in eodem ge-  
 nere est etiam alba, vulgò Martia dicitur,  
 & Quad

& Quadragesimalis, quòd Martio mēse, & quadragesima floreat. Est etiam multifoliū, ob id Dasypodium Græcis dictum, concolor primæ sed plenior: frigida est ac humida primo ordine. Syrupus ex multis florū violæ nigræ recentium, vt rosarū, florum perfici, infusionibus soluit aluum, vt in compositis ipsis dicemus. Quin & semen violæ nigræ album, rotundum, milij æmulum aperit cholagogum est. Est quoq; eius generis syluestrior toto habitu strigosiore, magis serpens, flore cæruleo, in album languescere, inodoro *Λιωνόριον* verò quauis violā albam significet, ad omnes tamen violas præsertim eas, quæ primo vere nascuntur, siue albæ, siue luteæ, seu purpureæ fuerint, seu nigræ cum Hippocrate, seu cæruleæ, vt quidā Dioscoridis codices habēt (quod expūgendum putāt pleriq; , præsertim Plin. lib. 20. & Paulus de oleo ioto, id est, violaceo, album, luteum, purpureum, leucoion tantum commemorant) extenditur. In his efficacissimæ sunt luteæ, Keiri Arabibus dictæ. Tamē cæteræ tres aut duæ caryophyllatæ, à floris figura caryophyllum imitante, nobis dictæ, nō sunt inefficaces: linguamenim valenter calfaciunt, & acrimonia sua mordent folio, sed magis florē, qui in his colore plurimum variat, arte opinor quæsito, vt in floribus aliis,

aliis. *Λευκόνιον* verò Theophrasti, quod florum primum se ostendit, etiam nondum exacta hyeme: radice bulbosa an sit quæ nobis circa natalem Christianum florem album pulcherrimum trifolium intus virentem ostentat, ab aliis malo diuinari, quàm à me rem non satis compertam pro vera pronuntiari. De quo multa Massarius in libr. 9. Plinij.

**M** Elilotum coquit, digerit, & parum *Gal.li.7.*  
 astringit, vt crocus: largior enim est *simpl. &*  
 in eo substantia calida quàm frigida. *libro 4.c.*

**N**ymphæa, quòd aquosa amat, dicta: *phar.par.*  
 vna est flore albo, radice nigra, & semine nigro: altera flore luteo, radice alba. Vtriusque radix & semen frigidum, siccans sine morfu, parum detergens, proinde alui, profluvia, & dysenterias cohibent: semen immodicè profluens siue per insomnia, siue aliter, retinent ex vino nigro austero pota: in id efficacior lutea, adeò vt medeatur muliebri profluvio, vt ad tergendum alba præpoller, quæ aqua macerata albos, pice liquida alopecias sanat: Autumno radices exciduntur: Hæc Dioscorides & Galenus, verum facultatis florum, quibus hodie solis, vtimur, non meminerunt.

**P**ericlymeni fructus & folia subamara, *Caprifoliū, & ma.*  
 tandè acria, adeò valenter calfaciunt, &  
 inci

*ter sylua.* incidunt, vt multo vsu cruentas vrinas edu-  
*Gal.li.8.* cant, lienosos, ægrè spirantes ex oleo ad-  
*simpl.* mota iuuat. Vides quàm fœdè labantur,  
 qui Lycium veterum ex hoc fructu re-  
 presentant. Nunc flore ferè vrimur, & ex  
 eo vel flore ligustri aqua capitello destil-  
 lata, ad oris & faucium aphthas & nomas  
 colluendas.

*Rosa pa-  
 rā astringunt, vt  
 lib.4.cōp.  
 ph. part.*

**R**osa omnis amara est atq; astringens,  
 præcipuè rubra, à qua substantia re-  
 frigerat, siccatur, flos autem eius astringit ma-  
 gis, proinde etiam siccatur valentiùs. Rosa-  
 rum flores potiùs quàm rosas, quia imbecil-  
 lam astrictionem habent, in Diabesasa po-  
 nit Heras libr.6.comp. ph. part. Gal. & An-  
 dromachus in stomachicis, lib.eodem. Flos  
 autem est pars interior, in qua semen est &  
 capillus. Id semen vulgus Antheram vocat,  
 cùm Anthera compositio sit Græcis rosas  
 ficas & alia recipiens: quin & sine rosarum  
 flore anthera medicamentum est, lib.6.cōp.  
 ph. part. Rosæ præstâtissimæ sunt, quæ lon-  
 gè omnium sunt suauissimæ, & aliis rubi-  
 cundiores. Siccandæ verò sunt loco subli-  
 mi meridiano, quo solis radij penetrent, ro-  
 sas tamen non tangant. Rosarum succus  
 essentiæ est tenuissimæ, nam celeriter ace-  
 scit, & lentore caret, & vnguentorum o-  
 mnium odores exoluit & obscurat. Ex rosis  
 calid

*Li.1.ant.  
 Lib.3.sim  
 plic.ca.9.*

calidissimæ videntur Moschatae, post has roseo colore insignes, incarnatae nobis dictæ, quæ & cerebrum valenter feriunt, paulò minùs albæ.

**Σχοίνον**, id est, iuncus absolutè scriptus, iuncus odoratus, Arabicus, Libycus, seu cum Celso rotundus, à triangulari cypero eum separante. Nescio autem qua causa vulgò **ἀνθ' οσχόινου** dicitur, cum rarò flos eius ad nos deferatur, sed herba srpe, eius parte superiore à camelis erosa. Eamenim in Arabiæ viis copiosissimè crescentem, ob id parui pretij, libentissimè cameli pascuntur. **οσχόινον ἀνθ'** Actuarius, vulgus Scœnanthum: modicè calfacit, & modicè astringit, est nonnihil tenuium partium, ob id mediocriter digerit, & mediocriter repellit: radix astringentior, flos calidior, vrinas ac menses ciet, sumptum & fotu adhibitum, iecoris, stomachi, ventriculi phlegmonas iuuat, hæmoptoicis, id est, sanguinem screantibus cum aliis prodest: solo odoratus vigore deligitur: nam odoris illius gratia celeriter vanescit. i. lib. antidotorum.

**Στοιχάριον** nascitur multa vbiq; terrarū, copiosissima in Creta insula, & dictis Stœchadibus insulis, in mari Iberico, à quibus appellata est: nascitur et in Arabia, vnde et Arabica vocatur

*Li. 1. ant.*

*Li. 8. sim.*

*et lib. 6.*

*cōp. ph. p.*

*νύκλασις  
Gal.*

*Li. 8. sim.*



*Libro 9. c.ph.p.* vocatur. Amara est, modicè astringit, proinde tenuat, terget, obstructa liberat, roborat viscera & corpus reliquum, putredinem arcet. Habitior & meliùs nutrita atque melior ex insula Creta petitur, libro 1. Antid Est in Gallia Narbonensi Stœchas citrina vulgò dicta, à comæ & corymbi floris colore luteo, Dioscoridis Heliochrysum, & Galeni Amaranthus videtur: altera autem flore purpureo.

Ex prædictis, & non paucis sequentibus plantarû partibus, & animalium, atq; adeo metallorum, aqua fit vi caloris vel ignei, in flamma, prunis, arena, cineribus, scoria ferri, calce irrigata, aqua feruente (quod diploma, id est, vas duplex dicitur) vel putredinosi in fimo equino, corticibus putrentibus, vel solaris. Tenuata enim humiditas à calore vapor fit, qui elatus capitelli vitrei, terrei, plumbei, argentei, vel alia materia frigida crassa constantis frigiditate concrefcit in aquam per nasum eius defluxuram in vas subiectum, quo modo pituita in capite humano ex totius vapore gignitur, & per nasum destillat. Cui si ignis valentior sub finem accesserit, rerum ipsarum humidum substantificum tollitur, & si quod rebus ipsis inerat oleaginum, vel delabitur pro vasorum situ & figura. De qua

re fufius in compofitis medicamētis agam,  
quod hæ aquæ quamuis fimplices fint, quia  
tamen aliquid opera noſtra acceperunt, & *Libro 1.*  
fortaſſe veræ ſunt compoſitæ, vt aqua cal- *fimpl.*  
facta Galeno.

## D E   S E M I N I B V S.



**S**E M E N à fructu differt, vt con- *Lib. 2. ali*  
tentum à continente, ſeu potius *mē. initio.*  
vt pars à ſuo toto. Fici enim fru-  
ctus ſunt ipſi ficus, κεχράμια  
verò in fructu granula ſunt ſemina, in mo-  
ro ſimiliter. Et γίρξα in acino fructu ſunt  
vitis ſemina: & tria aut quatuor grana in  
medio pomo, pyro, ſunt eorum fructuum  
ſemina: & in cucumere, cucurbita, pepone,  
melo pepone fructibus, ſemina in ſunt plu-  
rima & conſpicua. In ceraſo, pruno, meſpi-  
lo, utroque corno, dactylo, myxis, ſeriphis,  
granatis, oliuis fructibus, quod ligno in-  
cluditur ſemen eſt, vt fructus, ſeminum ſit  
munimentum quoddam & propugnacu-  
lum. Quoniam plantarum ſit permultarum  
finis ſemen procreare, in quo ſpes maxima  
eſt ſpeciei ſuæ propagandæ, & quoad eius  
fieri licet, perpetuandæ. Ob id magna id  
cura eſt à natura munirum, & loco penitio-  
re tanquàm tutiore repositum, ac non ſola

fructuum carne munitum, sed sæpe ligno, vel osse, sæpe cartilagine, sæpe callo quodam duriore aduersus cæli & animalium iniurias. vel potius sit fructus, quod ex semine & reliquo constat, vt in leguminibus siliqua inuolutis. siliqua cum semine est fructus, plurimæ eorum substantiæ pars est in seminibus. Est tamen vbi tenui discrimine distant semina à fructibus, vt segetes & legumina, Galeno scripta toto libr. i. alimentorum.

Præterea nuces regiæ, nuces Ponticæ seu auellanae, pistacia. Quin persæpe Dioscoridi & Galeno καρπὸς, id est, fructus, ἀντὶ τοῦ σπέρματος & scribitur. Semen althææ, api, agni, anethi, asparagi, dauci, fœniculi, genistæ, hyoscyami, lauri, plantaginis, portulacæ, nymphææ, rosarum, & aliorum non paucorum in radicibus, aut herbis, aut floribus cognominibus, dictum est: quam rem index apertissimè demonstrat. Legenda autem semina, cum sunt matura, & fructus quibus includuntur, sunt maturi. Semina verò quotannis mutare præstiterit, etiam si pleraque diutius seruari possint.

Diosc. &  
Gal. li. 6.  
sim. & li.  
7. comp.  
ph. part.

**A** Momum calfacit, validè ficit, astringit, coquit magis quàm acorum, ficit minus, cætera facultatem habet eandem.

Odor

Odoris conciliandi gratia medicamentis etiam principalibus miscetur, vt in componendi ratione audies. Delige candidum vel fuluum, simplici tamen colore non vario, laxius in vua parua seminis tamen plena diffusum, non astrictius coharens, odoratum, nares vulnerans, acre, mordax, recēs, non cariosum. Amomi vua saepe Galeno & Actuario ob id dicitur, quod racematim velut in vua cohareat. Laudatur amomum Scythicum, lib. 8. comp. ph. part. Non esse verò rosam Hiericuntis, aut Hierosolymitanam vulgò dictam aperte conuincit vtriusque historia. Hodie passim desideratur, nam quod ostendunt officinæ, inodorum est: habeo apud me fuluū, paruum, oblongum, angulosum, odoris dum fricatur iucundissimi.

Ameos semen calidum siccum in fine ordinis tertij, tenuium partium, album, subamarum, acre, digerit, vrinam mouet. Ami commendatur Illyricum, lib. 9. comp. ph. part. alij Aegyptium laudant.

Anisi semen calidum siccum ordine tertio, vrentibus proximum, acre, subamarum, vrinam ciet, flatus ventris dissipat, digerit: addit Dioscorides venenis resistere. Inter prima laudatur Creticum: melius recens & plenum. Eius loco & pe-

*Li. 6. sim.*

*Li. 6. sim.*

Li. 6. sim.

nuria Anisum dulce vsurpamus, quod γλυνάριον Actuarius sepe appellat. Ita sentire malo, quàm cum nonnullis Anisum vulgare Græcorum Anethum initio tertij gradus calidum, siccum primo affirmare. Anethum verò vulgare calidius siccus, Anisum Græcorum calidum siccum tertio gradu. Nam vero veterum Aniso (vt dixi) caremus. quod semen paruum apij semini simile, sed maius Dioscorides scribit: Anetho autem semen latum & foliatum Ruelius tribuit: ex quo scriptore nescio, nisi fortè Anethum nostrum pinxit non descriptum veteribus.

Acantha leuce Dioscoridis & Galeni, est Bedegar Serapionis, vt descriptiones & vires conferenti Sole clarius euadet: astringit enim, & siccatur minùs quàm spina Aegyptia seu Arabica amborum, quæ Succha est Serapionis, fructu & radice utilis: cum nostra Acantha leuce eadem, nisi quòd ob Soli & cæli naturam est inefficacior.

**B**ombacis semen simplex cerasi nucleo simile, recentiores ad vitia pectoris purganda adhibent. Melita insula mittit multiplex, sibi implexum, nigrum.

Βασιλικον καρπός, id est, Basilici semen, cardiacum Actuario est: in vsu etiam interdum apud Gal. in comp. ph. part. inuenitur.

Cuc



Gal. li. 3.  
simp.

**C**ucumberis esculenti semen magis incidit, terget, tenuis est substantiæ (præsertim arefactum, cōtritum, cribratum) quàm ipsa eius caro frigida humida ordine secundo, cū semen ipsum siccet ordine primo, aut etiam secundo incipiente. Ob hæc vrinas mouēt, & corpus *ῥύμματα* & vice tergēt, & splendidum reddunt. Addit Dioscorides vesicæ exulcerationibus subuenire. Vrinæ magis mouent Pepones quàm Melopepones & Cucumeres, & Cucurbitæ, quòd substantia sunt magis humida, aquosa, & tenui, & quæ in ventriculo facilius corrumpatur, & quæ vim quandam abstergerendi habeat, ob quam expeditius quoq; deorsum quàm prædicta ferantur. Sordidam cutim, *ἰφιλίρ*, lētes in facie, *ἀλφὶς* extimos & superficialios detergent, semine potentius quàm carne, vt etiam renum calculis conueniat. Nulla verò seminis cucurbitæ Dioscoridi & Galeno in simplicibus est mentio, quum tamē hodie solenni quodam more vulgus medicorum in componendis suis medicamentis omnia hæc maritent, scribētes passim quatuor semina frigida maiora, vt distinguant à frigidis quatuor minoribus, lactucæ, portulacæ, intybi, sereos, id est, endiuix, scarioria. Inter illa verò citreoli semen non melopeponis numerant.

Lib. 2 al.

*Gall. li. 7.  
simpl.*

Cari semen calidum siccum ordine tertio, mediocriter acre, vrinas mouet, flatum discutit: planta etiam reliqua ad hoc utilis à Caria regione laudatissimum afferebatur: vnde illi nomen multiplex, Carum, Carion, Careon, Caroon.

Coriandrum essentia amaræ habet plurimum, parum humiditatis aqueæ tepētis, paucillum astringentis, à qua refrigerat, vt ab amarore calfacit, terget, digerit, tenuiū est partium, lumbricos necat: sed largius sumptum mentem mouet non sine periculo, ob id aceto maceramus, post siccamus.

*Cresson  
alenoy  
vulgo.  
Libr. 7.  
simpl.*

Cardamum, id est, nasturtium, semine & folio siccum est caustico & adurente, vt sinapi, phænigum, hoc est, rubrificationē, in coxēdicis aut capitis dolore excitat, eclegmatis mistū astmaticos crassis & lētis pulmonū excrementis valenter purgat vt sinapi.

Cardamomum Serapionis vtrunq; tam maius, quod Granum paradisi vocatum putant pleriq; quàm minus, nihil habet commune cum vero, id est, Dioscoridis & Galeni Cardamomo, etiam hodie desiderato. Cardamomum absolutè & Cardamomum nigrum, lib. 9. comp. ph. part. & 1. antid. & in theriaca ad Pisonem.

*Libr. 1.  
antid.*

*Carthamus.*

Cnici semen calidum, ordine tertio, purgat pituitam, vt cap. 5. lib. 2. simp. docet Galenus

lenus, & lib. 5. sanita tuenda: quod in diacni- *Gaze cū*  
 co compositione postea plenius leges. Ni- *vulgo.*  
 hil tamen aut minimum harum virium in  
 consueto nobis semine Cnici expertus, for-  
 te quod à regionibus calidioribus non sit  
 allatum, sed in agro Parisiensi natum.

Cumini semen vtile magis, calfacit ordi *Gal. li. 7.*  
 ne tertio, siccatur, astringere addit Dioscori- *simpli.*  
 des, urinam mouet, flatum exstinguit: satium  
 est ac syluestre, idque duplex Dioscoridi: lau-  
 datur Aethiopicum, deinde Aegyptium.

Coccus baphica, vel coccum baphicum, *Kermes*  
 id est granum tinctorum, baccula est aspara *& Al-*  
 gi emula, foliis innata fruticis aquifolij ili- *kermes*  
 cis, Theo. Plin. astringens, amara, siccatur sine *vulgo cū*  
 morfu, ob id ad vulnera magna etiam ner- *Mauris.*  
 uorum congruit, roborat partes siue his qua- *Li. 7. sim*  
 litatibus manifestis, siue etiam (vt quibus- *pli.*  
 dam placet) totius substantia familiaritate,  
 quam dicunt habere cum corde præcipuam:  
 de hoc in antid. *Διὰ λόκκων βαφινῶν.*

**E**RUCA foliis & semine calida, flatuosa,  
 ob hæc venerem largiore vsu excitat,  
 in condimenta venit, urinas mouet. Sylue-  
 stris satiuæ est acrior. hac synapis vice vititur  
 Iberia occidentalis, Dioscor. Eruum cali-  
 dum primo ordine, siccum secundo, amarum pro- *Orobis*  
 inde, incidit, terget, obstructions liberat. *cū Graci*

lib. 8. simpli.

largo usu sanguinem per vrinas euocat, praesertim rufum. Nam Eruum non candidum sed rufum vehementer amarum est, candidum dulcius, lib. 1. antid.

Erysimi semen saporis nasturtij, calore igneo, vel aqua maceratum, vel linteolo & crusta pistoria inuolutum & tostū, ac elegnatis mistum, crassa & lenta ex pulmone valenter promouet: id enim sic torrefactum terget, lib. 7. comp. Phar. part.

**F**Oenum graecum siccum primo gradu, calidum secundo, lib. 8. simpl. calidum autem mediocriter, & ob id digerere dicitur, lib. 1. comp. Phar. part. Nam is gradus est medius inter summum & omnino temperatum, quod nec calidum absolute, nec frigidum iure dixeris: phlegmonas arden-tes irritat & exacerbat, minus calidas & duras digerendo sanat.

**L**igusticum à Ligusticis alpibus, in quibus frequēs nascitur, Galeno & Actuario vnus literæ mutatione Libypticum: hodie rarum semine solo visum Manardo, radix imperatoria vocatur Leoniceno & Musæ. Hoc autem accipiendum in compositionibus Arabum pro Keissim seu leuistico, aperte docet diatrion pipereon & diacalamintes, à Nicolao & Mesue ex Galeno paucis admodum mutatis descripta. In quibus

bus & aliis non paucis Arabum descriptionibus, vt diacymino, diamoscho, Libypticum reposuit. Actuarius: vulgatum autem Leuisticum aut Smyrnum est cum Ruelio, aut apij vel dauci genus: cum Manardo Smyrnum, putante petroselinum Alexandrinum vel Macedonicum,

*Λινισπέρμον*, id est, lini semen, humido *Libr. 7.*  
& sicco quodammodo temperatum, calidum autem quodammodo ordine primo: *simp.*  
statuosum est etiam si frigatur, adeo plenum est humiditate recrementitia. Quia igitur calidum humidum statuosum, semē homini generat. Lini semen torrefactum terget, vt prifana & farina fabarum, *libr. 7.*  
*comp. phar. part.*

Lini semen vires habet scenigræci, discutit, & emollit omnem inflammationē, dioscor. Erui semen admodum digerit, & lini *Libr. 6. c.*  
semen moderatius. Lini semen repidē calidum, vt chamæmelum. Lini semen in aqua *phar. par.*  
coctum refrigerantem succum gignit. *Libr. 11.*  
Linospermō & succus rosarū frigidioris media temperie sunt naturæ, sed non ita multo, quin potius caloris sunt tepidi. Lini semen refrigerat, siccatur. *method.*  
Linospermon tanquam frigidissimum vitandum asthmaticis censet Galenus, vt meconium, mandragoram, hyosciamum, cicutam, psyllium. *Lib. 6. sc.*  
*nitat. tuē.*  
*Li. 3. sim.*  
*c. 9.*  
*Li. 4. rat.*  
*viēt. in*  
*morbis acutis.*



Linospermon urinas exigue mouet: frigidum autem vetricum magis fit, & aluum magis sistit esu.

Lithospermon, quia semen duritie est lapidea, vel quia cum vino potum calculos frangit. Dioscor.

Lupinus est satiuus, idemq; vel dulcis, vel amarus: agrestis verò minor sed amarior, & ad omnia valentior domestico, terget, tenuat, incidit, digerit, siccat sine morfu: vitilignes, psoras, achoras, vlcera cacoethæ sanat, lumbricos necat sumptus & admotus, iecur & lienem purgat, phymata, chæceradas liuida ex aceto, vel posca, vel oxymelite pro ægri natura & affectus varietate coctus digerit.

*Li. 8. simplic. & li. 1. alimēt. Nigella Gaze Nigella Romana vulgò.*

Lens calido frigido temperata, sicca secundo gradu, valenter astringit, ob id ventrem sistit, abiecta priore aqua aluum mouente.

**M**Elanthium est Gith, quanuis flore sit ex cæruleo albicante, semine nunc nigro nunc rufo, calidum siccum tertio gradu, tenuium partium, amarum: assiduo olfactu catarrhos sanat, orthopncean iuuat, lumbricos necat, lepras terget, menses ob crassitatem & lentorem retentos mouet. Quæ verò in segetibus altius adolescit, Nigella vulgò dicta, inodora, pseudomelanthium, & Githago vocari possit, Hermolaus.

Ocy

**O**cimum calidum secundo ordine, excrementitia humiditate, ob quam nūsumendum, sed foris illitum coquit & digerit. Ocimum calfacit, tenuat, non tamen valenter, lib. 2. comp. ph. par. Ocymi semen Actuar. vsurpat.

Li. 8. simpli.

**P**syllium dictum quòd semen habeat effigie pulicis, humido sicco temperatum, frigidum ordine secundo: ne putes cum Arabibus corticem frigidum gradu quarto, medullam gradu quarto calidam.

Dioscor. Gal.

Papaveris genera sex Dioscoridi & Galeno. Satiuum calyce grandi, flore & semine albo, minus frigidum, ob id esculentum, & mediocriter somniferum. Sylvestre, flore ad medium nigricante, calyce minore, semine nigro, admodum frigido. Tertium etiam sylvestre procerius, squalidius, calyce longiore, omniū frigidissimū, proinde stupefacit: amborum scapo sub capite conuulnato succus defluit lacteus, opium dictus: Meconium verò succus ex his expressus crudis. Horum frigiditate aliorum vehementem calorem obtundunt Medici in suis compositionibus. Quartum papauer Rhœas. Quintum Corniculatum. Sextum Herculeum, *λεωνοειδὲς μικρόν* & vsurpantur Actuario.

Sesi

*Siler vul-  
gò cum  
Virgilio.*

**S**esili radice & fructu, id est semine, valde calet, ac tenuium est partium, quare vrinam mouet, epilepsiae & orthopnoeae confert: laudatur Mafsiliense. Est alterum etiam Aethiopicum, & tertium Creticum Dioscoridi.

Staphis agria semine velut in vuam coacto (vnde illi nomen) vehementer acri & vrente, quod mansum pituitam in os ex capite plurimam detrahit, & illitum ex oleo capiti puerorum pediculos enecat: vnde Pituitaria & pedicularis quoque herba dicitur.

*Lib. 8.  
simpl.* Sinapi calfacit, siccatur ordine quarto. Sinapi Alexandrinum laudatur, lib. 9. comp. pharm. part.

*Lib. 1. an-  
tid.* **T**hlaspi duplex, Cappadocicum, nigrius, non exactè rotundum, sed quadam sui parte velut ἑνθλασμα habet, id est, infractum, exiguum, vnde illi nomen, multò maius & præstantius quàm secundum. quod etiam in Cappadocia & Creta, & vbiq; nascitur ὠχροφάνθον, id est, ex pallido flauum, rotundum, admodum exiguum. Creticum tamen plerique immiscent theriacæ.

**V**rticæ fructus, id est semen & folia præcipuè vtilia sunt, non vehementer calfaciunt, tenuium sunt partium, digerunt, phym

phymata & parotidas, crassiss & lentis humoribus pulmones purgant.

## D E F R U C T I B V S.

**F**RUCTVS est ea plantæ pars, quæ carne constat & semine: sæpe etiam pro semine ipso sumitur, vt libro sexto simplicium fructus vrticæ: lib. & simpl. fructus seseleos, fructus hyperici, fructus scille, periclymeni fructus & eiusdem semen, li. 9. cōp. ph. part. & alibi sæpe. καρπὸς τῆς τρύχης, Solani bacca Actuatio.

**A** Mygdala amara incidunt, renuant, tergent, digerunt sine morfu: ob id expulsiōe excreationē crassorum & lentorum promouent, obstructum hepar, lienem, renem, colum à crassiss & lentis humoribus expediunt. Amygdala dulcia sunt moderatè calida, leuiculam tamen amaritudinem habent, sed à dulcedine occultatam, quæ tamen temporis spatio fit manifesta.

Anacardus, vel cum Actuatio Anacardion, à cordis figura & colore dictum videtur, calidum siccum quarto gradu Meusæ, veteribus Græcis indictum, affectus cerebri & neruorum frigidos humidos mirè iuuat, ad motum cutim vlcera, verrucas tollit, In India, Sicilia, Apulia, frequens.

ΒΑΛΑΝ

Libr. 8. c.  
ph. p. &  
li. 6. sin p.

Li. 6. sim-  
pli.

**B**αλαν & μυριψιχά, id est, glans vnguentaria, Myrobalanus quoque Plinio dicta, ex Barbarica regione allata, Ben Arabibus dicta, hodie frequens, stomacho aduersatur, cū hydromelite pota carnis huius drachma vna est vomitoria: cum oxycrato autem iecur & lienem purgat, cū aceto item (quo maxime gaudet ad agendum) lepras, pforas, lētes, vitiligines, pruritus extergit, lieni & hepati indurato illinitur cum farina aliqua siccate, vt erui, lolij: lieni etiam prodesse scribit Galen. in theriaca ad Pisonem. Carnis huius succo facultate calido vtuntur aromatarij: id enim inodorum cū sit, omnibus suscipiēdis odoribus est aptissimū, vt insipidū saporibus, & coloris expers coloribus. Id oleum Balaninū Dioscoridi dicitur. Oleo expresso quod reliquum est magma terreum & amarum, incidit, terget, contrahit, stipat, ad prædicta etiā efficax, sed minus. Id autē videtur esse μυροβαλάνης κρίσμα, id est expressum, quod cataplasmatibus miscet Galenus, lib. 11. & lib. 13. meth. & bis. li. 9. comp. ph. par. splenicis remediis, & ad scirrhosos lienis affectus adhiberi scribit Gale. Quo in loco μυροβαλάνης tantum, aliquando μυροβαλάνης σαρκός, aliquando βαλάνης μυριψιχῆς leges, aliquando μυροβαλάνης ἄλλανρον, id est farina & pulvis, & μυροβαλάνης λιπὸν

χάνα,



*χάρα*, id est putamē & cortex, & *μυροβάλαν*  
*αίπυρα λινομένηα καὶ σεσησμένα*, id est, Myro-  
 balani testē & cortices incisi & tusti cribra-  
 tiq;. Omnia hæc ad splenicos scribuntur, vt  
 sit credibile maximē de fructu eodē, scilicet  
 Balano myrepica, & eius partibus, omnia  
 hæc intelligi. Quam verò myrobalanū Ara-  
 bicam intelligat Dioscorides, cui similē fa-  
 cit fructum palmæ Aegyptiæ, de qua nunc  
 dicam, planē ignoro. Nam Arabum recen-  
 tiorum Myrobalani quinq; generibus di-  
 stinctæ veteribus indictæ putantur, & pru-  
 norum generi potius, quàm Balanorum, id  
 est glandium, assignandæ sunt. Sunt verò  
 hæc: Lutea seu citrina refrigerans, cholago-  
 ga. Inda & nigra, melancholiam purgat, &  
 exhilarat. Cepula phlegmagoga, visum illu-  
 strat, coctionē iuuat, pectus purgat hydro-  
 picis confert. Empelitica (quæ actuariis *ἀμ-  
 πελιτῆς* & *ἐμπελί* quoque dici videtur) etiam  
 phlegmagoga, vētriculum purgat & robo-  
 rat, appetentiam reuocat, vomitū sistit. Be-  
 letzica empyos iuuat, hæmorrhoides & ca-  
 pilli defluuium. De his plura leges in Arabi-  
 bus. Ignorata quoque videtur hodie *χρυσά-  
 λαν* ♂, digerens & roborans, vt spica nar-  
 di, & ad colicos affectus, & stomachi ardo-  
 res & singultus adhiberi scripta Gal. li. 8. &  
 libr. 9. comp. phar. part. Epithema ex pin-  
 guib

Libr. 10.  
 method.  
 Dioscor.

guibus palmulis, quas παλῆτες vocant, salubriter viscera refrigerat, si harum caro omni membranoso exempto coquatur cum aceto solo claro, vel etiam aqua adiecta donec tenerescat, & tusa applicetur. φοῖνιξ in Aegypto nascitur, viridi colore, odore mali cotonei, medio maturitatis vigore per autumnū decerpi solet, Arabici Myrobalani similis, sine osse, quā Myrobalanum quoque vocari Hermolaus affirmat. πῶμα autem & ἄλυσθις etiam Dioscoridi vocatur, quod ex hoc fructu palmæ Aegyptiæ humidiores, acerbo, astringente expresso, potus fit sitim sedans, Solino autore, qualis nobis ex pomis pyris, sorbis. Hic autem fructus si usque ad maturitatem in arbore sinatur, foliis nigricat, & φοινικοβάλανος vocatur.

- Libr. 6. c.* φοῖνικις ἢ φοινικοβάλανος, vel quomodo aliter  
*phar. p.* vocare libet, moderatè stringunt, acerbo sapore:  
*Libr. 9. c.* φοινικοβάλανων τῆς σαρκός, & in codice  
*phar. p.* Scribonij ibidem. Caro φοῖνικος σερικῆς in  
*Libr. 7. c.* arteriace Andromachi 12. & caro φοινικοβάλανων in 15. φοινίκων βάλανος proprietatem  
*phar. p.* quandam habent capitis dolorem excitandi: easdem tamen dat ibidem in cephalalgia:  
*Libr. 2. c.* sed addit, si sint consuetæ & accipienti iucundæ. Adhæc bilem pellunt deorsum, ut  
*phar. p.* absinthium, & refrigerant, φοῖνικις θηβαϊκὴ  
*Libr. 8. c.* à Thebis Aegypti opinor, & paulò post,  
*Herm.* φοῖνικις

*Φοίνικες πάντες* celebrantur, *φοίνικες πάντες*  
*μίγιστοι* his lib. 9. comp. ph. part. & paulo  
ante, *φοίνικων λάγνον*: *πάντες* autem vo-  
cantur, quod id genus tertium palmla-  
rum cariotarum præhumidum in: parente  
rūpat se præ humore, calcato simile reddi-  
tum. *φοίνις* verò palmæ ipsius fructus, præ-  
sertim dulcis, nō paucam obtinet calidita-  
tem: tamen desiccatur, roboratur, contrahitur, sti-  
pat, desat, sumptus & admotus. Hic autem  
fructus à palmæ Aegyptiæ fructu ex osse dif-  
fert: nam hic os habet magnum & longum  
& durissimum, in quo semē id os vstum &  
tritum valenter digerit, lib. 6. c. ph. part. Da-  
ctylus à digitorum forma dicitur. *ἔφυφοίνις*  
verò dictus Act. & aliis quibusdam Græcis  
recētioribus ab acido sapore, palmæ sylue-  
stris fructus. Tamar Indus, id est, Dactylus  
Indus Barbaris vocatus: quamvis cholago-  
gus sit comprimendo, ut palma Aegyptiæ  
fructus. Phœnicobalanus, tamen os habet  
quod satum arborem nobis produxit, alijs  
multis conveniunt & differunt, ut mox au-  
dies: sed Oxyphœnix veteribus indictus,  
cum Phœnico balanus in his frequens sit.  
Oxyphœnix subniger, lucidus, tener, villis  
tanquā radicebus mistus, recens, pinguis,  
acido sapore. Quibus notis apparet, quan-  
tum conveniat cum Phœnicobalano, &

quātū discrepet: adhæc offe vt dixim⁹, & vīu  
hic recentiorū tantū, ille etiam veterū. Si fri  
gidus est ventriculus oxyphœnici, debet mi  
sceri mastiche vel macis vel spica nardi. Ra  
tō per se datur, picrocholis saluberrimū ad  
vncias quatuor dari potest: annis 10. serua-

*Nux mos  
chata vul  
gò, etiā si  
moschum  
non oleat.*

tur. *μοσχονάριον*, vel *μοσχοναρίδιον*, vel  
*λίαννον μυστικόν* Græcis recentioribus, vt  
Aët. dicitur. *λίαννον ἀρωματισκόν* Aëtio, veteri  
bus ignotum. Probatur hæc nux recēs, gra  
uis, præpinguis, & quæ acu vulnerata mor  
humorem reddat oleaginum. Reliqua hu  
ius historia tam graphice pingitur Ruellio  
medicorum huius ætatis doctissimo, vt po  
steritatem latere non possit, vti neque nux  
Indica oleo prægnans, semen augēte, & ve  
nerem stimulantē, vt ait Auicennas, veteri  
bus quoque incognita, suis coloribus ab  
eodem bellissimè absoluta: & nux vomica,  
quia vomitum citat, & stupefacit, canes ac  
ceruos elū mox necat: cæteras aues, & pisces  
stupefacit, vt manu capi possint sopiti.

*Nux pi  
nea lib. 7.  
c. ph. p.  
Li. 7. sim  
pli. et libr.  
1. alimēt.*

**C**œni Atticis vocati olim fructus, Cœ  
cali verò & Strobili à quibusdā nunc  
dicti, virides toti sunt subamari, & subacres  
emplastici sunt, & tergēt, purulentā & cras  
sam lentāque exuptionem promouent. Nu  
cleus autē eius esculētus, nutrimentū est coctus

dis

difficile, validū: aqua maceratus acrimoniā *Ga. lib. 7*  
 exuit, asperitatēq; lenit, & calido frigidoq; *simpli.*  
 tēperatuseuadit. In sua nuce pinea seruātur.

Cypressi pilulæ, quæ etiam Cœni quibus-  
 dam dicuntur, vnde Coniferæ cyparissi, Vir-  
 gil. siccant valenter sine insigni calore aut  
 acrimonia: ob id hæ molles & recentes vlce-  
 ra magna in duris corporibus glutinant, en-  
 terocelas iuuant.

Cydonia Græcis, Cotonea Catoni, ma-  
 lo omnibus nota. Quo in genere quædam  
 sunt rotundiora, minora, acerbiora, quæ ma-  
 scula vocam<sup>r</sup>: vt alia fœminea lōgiora, ma-  
 iora, dulciora minùs acerba: quæ Struthia cū  
 Asiaticis suis Galen. vocat, lib. 6. sanit. tuen-  
 dæ: & στροβιόμυλλα. lib. 2 alimentorū. ex his-  
 que vel aliis diacydonion cōponit. ibidem.

Citrū, vel malū citreū, seu citriū seu me-  
 dicum & aureum. succo acido (qui frigidus  
 ficcus ordine tertio. ex pane admotus phleg-  
 monas internas cohibet, semine amaro, cor-  
 tice odoro. medicis in vsu est aduersus inter-  
 nas & pestilētes putredines, venena & partiū  
 principū & stomachi imbecillitatē. Nam &  
 roborat, tamē ægrē is coquitur. Inter citrea  
 mala Aranciū numeratur Hermolao. corti-  
 ce, succo, semine illis proximū, vti & quod  
 Limonem vulgus Gallorum appellat. succo  
 frigidiorē quā citrū: & quod ex insitione



pomum citreum vulgò dicimus Pomcire.

*Diosc. & Gal. Lib. 7. simp.* Colocynthe, id est, Cucurbita satiua, frigida humida ordine secundo, vt cucumer satius, ad phlegmonas & sitim vterq; effi-

cax. Colocynthidis verò fructus in pilæ mediocris speciem conglomeratus vehementer amarus, validè purgatorius, præsertim sua medulla, cuius oboli 4. bilem & pituitam etiam crassam detrahūt: balanis etiam & clysteribus sedi immittitur, stomacho tamen admodum aduersa est: ob id sola non vtēda, quod docet hiera dia colocynthidos: legenda cū cœperit in pallidum colorem permutari. De hac Mesues multò plura scribit, quæ tāquam parū momētanea neglexi.

Cucumeris agrestis quàm satiui fructus multò est minor, oblongis glandibus similis, cuius succo elateriū qua ratione fiat, docet Discor. amarus est, bilem pituitamque purgat, præsertim hydropicis citra stomachi iniuriam, radice alba, magna, & præsertim eius cortice & foliis etiam utilis est, sed inefficacius vtrunque, ciet menses, emollit, terget, digerit, purgat, quàm elateriū: summè amarum, tenuium partium, leuiter, vt ad secundum ordinem, calidum.

*Dioscor.* Calpobalsamum, id est, fructus Balsami, flauum sit, plenum, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, modicè opobalsamum

mum redolens. Adulteratur semine hyperico simili, quod Petra Palæstinæ oppido affertur: sed id Carpobalsamo maius, inane, viribus ignauū, sapore piperis. Carpobalsamum tamē adulterari non potest, lib. 1. anti-  
 tid. Galen. Balsamo planta secundo excessu calida sicca, tenuium partium: & Carpobalsamo, & Xylobalsamo liquor est tenuior, minū tamen calidus quā quidam existimant, tenuitate partium decepti. Sepe enim expertus sum non iuuisse dispositionem calfactione egentem. Opobalsamo igitur (quod & βαλσαμίλαιον vocari dicit Simeon) recenti, validi odoris, subruffo, albo, vel viridi (nigrum autem pessimum est) syncero, dilui facili, læui, astringenti, non acido, linguam modicē mordenti, est præcipua inter has plantæ huius partes autoritas, & vis efficacissima. Laudatissimum autem est Syriacum, siue Iudaicum, siue ex Syria Palæstina, ac præcipuē Sigadinum, è loco Palæstinæ, in quo copiosissimum & optimum gignitur. Opobalsamum sit Syriacum, tenue, perspicuum, substantia non crassum, quale in fundum vasis subsidere solet, quale item sit vetustate. Opobalsamum variis adulteratur modis, vt egrē possit etiam ab exercitatissimis cognosci, vt in adulteris docemus: alias veri opobalsami notas ex

*Li. 6. simplic.*

*Gal. lib. 2  
c. ph. p.  
Dioscor.*

*Li. 1. anti  
Lib. 4. c. c.  
phar. p.*

*Diosc.* Dioscoride requiras : hodie propemodum desuit videri. Xylobalsamū autem surculus est recens, sarmēto tenui, fuluus, odoratus, Opobalsamum nonnihil spirans.

Cassia fistula Arabum veteribus Græcis indicta, recentioribus Cassia syringodes, id est, fistulacea, & nigra Actuario, scribēti passim *λασσία μελάωυς τὸ ὄσπρ*, à quo bellè describitur. Ex India, Syria, Aegypto afferuntur: optima est collucens, grauis, plenior, & quæ cōcussa clausis intus granis nō strepit, atramēto intus seu pulpa pingui, splendēte, succulēto, nō situlēto, nec putri: calida humida primo gradu: vacuat: omnes humores leniēdo pueris & prægñatibus à drach. sex ad vnciam vnā & dimidiam. Si verò alius fluit, mastiche aut myrabalanis assis corrigitur. Cassia autem Græcorum quæ sit, post leges in Cinnamomo inter cortices.

*Lib. 1. an  
tid. & in  
theriaca  
ad Piso-  
nem.*

Cubebē non sunt cum Serapione & aliis quibusdam neotericis, Galeni *λαγνήσια*, nec Dioscoridis oxymyrsmes seu myrti syluestris fructus (nam is Carpesiorū non meminit) vt Cubebas cum predictis conferēti patet. Hæ enim sunt fructus tenues piper æmulantes, sed minus acres & subamari. Galeni verò *λαγνήσια* sunt *λάγφρ*, id est, festucae tenues, *ἀνθήμοι*, id est, surculis cinnamomī, similes odore vocati *φρ*, sed valentiore, &

nonni

*Li. 7. sim-  
plic.*

nonihil aromatico, quē & gustatus deprehēdit, facultate etiam Phu similia: sed quia sunt tenuiora, viscerū obstructions potentiū detergent, & vrinā mouent, & renū calculos expurgant. Non adeo tamen sunt tenuium partium, vt cinnamomi loco vsurpari possint, cū Quinto: eū multo sint deteriora optima Cassia. In Side Pāphiliæ loco: quia luxuriat carpesium ibi est vilissimum. Actuarius tamē *κομπίβας* vel *κομπίβας*, etiā *καρπία* vel *καρπίδια* vocari scribit.

*Locu prædictu, & lib. 3. c. ph. part.*

**F**icus recens præhumida modicè calida, digerit, non potest coquere: Ficus verò arida seu passa, id est carica calida, in fine primi gradus, vel initio secundi partium tenuium, degerit, tenuat, coquit, pinguior magis coquit, acrior potentiū terget, & digerit: *σῦνα λινα* ficus candida, interdum pingues Actua.

*Libr. 3. c. ph. p. & libro 8. sim.*

**G**alla est fruc. roboris, & cæterarū glādi ferarū arborū. ea vel est omphacitis, id est, immatura, parua, nodosa, grauis, solida, non perforata, cæteris præstantior & maiore vi in medicina: ob id ea, sed magnitudine mediocri, deligitur. Hera. libro 6: comp. ph. p. Altera est magna, rotundissima, laevis, leuis, laxa, perforata, flaua. Vtraque refrigerat ordine secundo, siccatur tertio, crassa est essentia, astringit.

*Li. 6. simpli.*

**I**uniperi fructus calidus ordine tertio, sic-  
cus primo: sed folia calida sicca gradu ter-  
tio.

Iuiubæ, Zizipha Græcis Zinzipha etiam  
Actuario, fructus Myxariis affinis facultate:  
nā calidus humidus primo gradu, etiā pul-  
monarius: est duplex, sericum, id est, rufum,  
nobis frequens, & candidū, adhuc ignotū.  
Affluxiones calidas, acres, tenues, in pectus  
salubre: vt alimentum verò à Gale. damna-  
tur lib. 2. alimentorum. Quem locum Aui-  
cennas, Sauonarola citant in suis Iuiubis.

*Diosc. &  
Gal. li. 8.  
simpli.  
Libr. 6. c.  
ph. p.*

**M**alum granatum seu punicū triplex,  
dulce, acidū, acidodulce scilicet suc-  
co, saporis naturam viribus refert: omnium  
tamen flos, cortex nucleus astringit, sed aci-  
di & acerbi magis, dulcis multò minus: me-  
dijs horum mediocriter. malicorium, id est,  
cortex nondum aduultorum sed perfectioni  
propinquorum est melior ad astringēdum  
in ore affectus ex fluxione nascentes.

*Sebesten.*

Myxæ, & myxa, & Myxaria Actuario &  
Græcis quibusdam alijs recentioribus, ἀν-  
τὶς μύξης, id est, à mucco lento è naribus  
fluente: cū simili hi fructus abundant, bi-  
lem detrudere, & sitim sedare dicuntur, hu-  
mida primo gradu, calido frigido tēperata.

Myrti vtriusque germina, folia, baccæ,  
succus



succus constant substantia calida, tenui, & cōtraria illi frigida, terrea, astringēte, magis sylvestris quàm sativa. Bacca Catoni Myrta, Murta Varroni, Myrtili vulgò, Myrt<sup>o</sup> alba & nigra passim dicitur Gal. in cōp. ph. p.

Myricę fructus generosissimè astringit: libr. 6. comp. ph. part.

Morum album Græcis veteribus inditum videtur, & Latinis, præter quàm Ouidio, fortè quia per insitionem in populo alba gignitur: nigrum cantatissimum, & arbor cuius foliis bombices pasti sericum nēt pulchrius & splendidius. Mori tamen albæ folium ad hos alendos est mollius, eoq; hodie tota Italia vitur. Sycomorum seu ficū Aegyptiam non habet Italia, Musæ.

**K** *Ἰνκλὸν βασιλικόν*, idest Iuglans seu Nux regia, nucleo est tenuium partiū vbi inaruit, siccate etiam sine morfu, ex quo inueterato oleum valenter digerit. *Lib. 7. sim plic.*

*Λιπὸν κάρυον*, id est nux tenuis, Pontica, *Ibidem.* Prænestiua, Auellana, à locis vbi luxuriat Ponto, Præneste, Auellis dicitur. plus habet terreæ & frigida substantiæ, ob id austerior.

Nuces teneræ, rancida vsta, cinere digerunt & astringunt, libro sexto part.

Nux Indica Actuario in diasatyrio & diaromato.

**O**liuæ halmades, quæ in muria sua seru-  
uantur, & in ea vel oleo suo quasi vri-  
nabundæ innatant, Colymbades ob id di-  
ctæ, plurimum astringunt & digerunt: sunt  
tamen mitissimum ad aphthas remedium  
lib. 6. comp. ph. part.

Oxyacanthæ vel Oxyacanthi racemosæ  
bacculæ dū maturuerunt rubentes, astring-  
unt, vis eadē foliis, sed languidior. Radix  
infixa corpori spicula extrahit, trita & ad-  
mota Dioscor.

*Lib. 3. sim-  
plic.*

*Lib. 2. an-  
tid.*

**P**iperis fructus inter initia cœu filiqua co-  
ryli nucamēto similis, longū piper est:  
humidius, ob id citò perforatur, vt zīgiber,  
& tardè, sed diu linguā mordet, vt arus. Hęc  
filiqua postea in grana milij æmula racema-  
tim degenerat, quæ aucta & siccata, sed ad-  
huc tiquām omphacodea & immatura Pi-  
per albū sūt, nigro *Ἀσπύριον*, id est, acrius,  
nam nigrū iam superassatum sole & super-  
ficcatum est, tamen utrūq; valenter calfacit  
& siccatur, & maximè digerit. Idē in agreste  
rufum cœli & soli iniquitate degenerauit.

*Lib. 1. an-  
tid. & lib.  
4. san. tu,*

Piper lōgū adulteratū seculo Galeni erat  
duplex, afferebatur alterum ex Alexandria,  
alterum erat germen herbæ cuiusdā, quale  
est nobis coryli aut betulæ nucamentum.

Piper longum nec sit pertusum, nec adul-  
teratum: album sit maximum, plenissimū,

grauē:

grauicidem & nigrum, neque id sit rugosum. Piper nigrum maius est alio pipere, & corticem habet tenuiorem & minus rugosum, lib. 1. Antid.

Piper albū stomacho est accommodatius, & acrius nigro, li. 9. cōp. ph. p. Piper omne coctionē sumptū iuuat, sed albū supra duo reliqua genera stomachū roborat, lib. 4. sanit. tuendæ, & lib. 9. c. ph. par. Radicibus piperis maximè proceris etiam utitur Andromachus apud Gal. lib. 7. comp. ph. part. His vires costo similes tribuit lib. 8. simpli.

Piper longū & rotūdū bis scribitur li. 10. comp. ph. p. ut id albū & nigrū cōprehēdat,

Piper *λευκόν*, id est, commune Actuario in antidoto podagrica, diapæronia, & diatrion pipereon, est nigrum: nam longum & album ibidem commemorat.

Pistacium fructus strobilo proximus, ex Syria largus affertur, subamarus, odoratus, tenuis essentia, obstructions præsertim iccoris, sed & pulmonis, & thoracis liberat. Lib. 8. simpli.

Pruna dulcia aluū subducunt, alia pro qualitate saporis nos afficiunt, bilē ex ventre comprimendo vacuāt astringentia. Damascenis ad aluū subducendam longe præfert Galenus Hispanica seu Iberica, vulgò hodie Augustana, quia mense Augusto matura leguntur, & Cathalaunica etiam Italica. Lib. 9. sanit. tuen.

Italis dicta ab hac Hispaniæ regione, in qua luxuriant.

*Sumach.*

**R**hus hic aut hæc, est fructus racemosus, cortice acido, astringente, repel-  
lente, nunc medicamentarius tantum, olim  
etiam culinaris, pro sale obsoniis asperge-  
batur: stomacho valde idoneus: alter verò  
& corarius dēfandis pellibus applicabatur.  
Ille etiam Syriacus & ruber, libr. 3. & lib. 6.  
comp. ph. part. Vterque tamen musto auste-

*Ibidem.*

ro incoctus stomachicum est medicamen-  
tum optimum, lib. 6. com. ph. part. Eius suc-  
cus omphacij vice est in Gallia Narbonēsi,  
in hortis Gulielmi Pellisserij, Episcopi Mō-  
tispeffulani lōgē omniū doctiss. et optimi.

Ribes Arabibus dictus, fructus est race-  
mosus, acidus, acerbus: frigidus siccus secū-  
do gradu sitim extinguit, vomitū & fluore  
alui biliosum sistit, morbilis & variolis  
(quas vocant) saluber, frutex nobis poteriū  
rubrum dicitur. Quid sit, frutex an herba,  
& quæ, ambigit Serapio in suis testimoniis.

Succus ex his expressus cum saccharo cy-  
doniati modo coctus est delicatissimus.

Ribes Damascenus Musæ additur foliis  
rotundis, & magnis viribus iisdem.

*Li. 3. hist.  
plant.*

Rubi, seu Sentis, Græcè βάρου genera  
Theophrasto tria sunt: magnus seu rectus,  
humilis, & medius. Batus magnus seu rectus  
est

est Dioscoridis & Galeni *λευκοβάτ* Ⓞ, fructu oblongo per maturitatem rubente, cytino simili, in quo ceu lanę flocci arteriam si denotentur infestant: huic foliis, fructu, rosa similis est cynosrhoda, Englentier nobis dicta: & rosa frutex omnis, nisi quod ferè gerit folia florum magis multiplicia & maiora, arte opinor adiuta: sed Cynosbatos spinis hamatis horridior, rectior, & altior asurgit, odore caret, quem Cynosrhoda tota habet præstantissimum: rosa verò frutex flore solo est odorata, nunc albo, nunc rubro, nunc amborum medio (incarnatum vocant) nunc etiam moschato. *Χαμαιβάτ* Ⓞ autem, id est, humilis rubus. Dioscoridi & Galeno absolute tantum *βάτ* Ⓞ dicitur, foliis multo maioribus quàm cynosbati, bicoloribus, per nodos ternis, sarmentis longissimis & firmissimis, qua parte terram attingunt, radicem iterum faciētibus, flore albo, tenui, racemoso. Cui succedunt Mera grandia, racemosa, multis granis coagmetata, per maturitatem nigerrima. *βέρνα* Galeno dicta. Medius denique est *βάτ* Ⓞ *ἰακί* Ⓞ Dioscoridis, longè tenerior priore, ac minoribus spinis horrēs, quāquàm & sine spinis inueniatur: freques is est in sylvis, folia habet chamæbati, sed paulò minora, reclusè ferè surgit ad duo aut tria cubita, scapo gracili

Ronce  
Gallie



gracili & infirmo, & minimùm spinoso, flore simili, & fructu, sed minore & granis, quinque, sex coagmentato, & per maturitatem nigerrimo, sed in cœruleum inclinâte ob aërium quoddam tectorium, nigris uvis & prunis, & aliis multis fructibus innasci solita: astringunt, siccant, refrigerant omnia hæc magis & minùs. Ad rubum Ideum docti hodie reducunt hortensem rubi recti, brevis, parum spinosi speciem, foliis bicoloribus, fructu dum maturuit olfactu & gustu iucundissimo, fragi rubri (est enim etiam album) æmulo: quem fructû herba trifolia & bicolor fert acré, præsertim semine. Flos rosarum astringit magis quàm ipsæ rosæ, lib. 6. comp. ph. part. & alibi sæpe. Est autem id crocatum in flore medio, quod Anthera vulgò dicitur, corrupto fortè vocabulo. pro *ἄνθος ῥόδου*: cum Anthera Galeno sit nomen compositi medicamenti.

**S**enna Hermolao, Serapioni Sene, folliculis latis sed falcatis, & in his semine utilior purgando humori melancholico, in morbis ab eo prodeuntibus. Datur pulvis eius ad drachmā vnam, decoctum vel infusum eius à drach. 2. ad drach. quinq;: multis torminosa est, aliis est clemens pro varia sumentium natura: tutius tamē est, mastiche vel

vel caryophyllis & alio corrigere: foliis nõ  
est inefficax. Non esse autẽ Dioscoridis vel  
Empetrum, vel Delphinium, vel Peplium,  
vel alypum, planè intelliges, si rem cum pi-  
cturis horum conferas: veteribus enim o-  
mnino indicta est planta, amara, subastrin-  
gens. Indica, Aegyptia valentior vncia di-  
midia, quàm Apula, aut Ligustica vncia v-  
na: & recens præstantior quàm inueterata.

**V** Va satiuæ vitis coquit, astringit, læui-  
ter digerit. Vuæ passæ caro tantum  
astringit, quantum eget hepar affectũ. Ha-  
bet præterea facultatem coquendi crudos  
humores, & euincendi malignos: ægrè cor-  
sumpitur, tota substantia familiaris est he-  
pati, & vsu crebro consueta est: ob id felicif-  
simè miscetur medicamentis hepaticis. *ῥα-  
φιδας λευκαθρανομερας*, id est, exemptis vina  
ceis Actuar.

*Li. 6. sim.*

*Lib. 8. cõ.  
ph. part.*

Fructus herbarum, vt mandragoræ, cu-  
cubitæ, vtriusque cucumeris, peponis,  
ex herbis, quarum naturam ferè sequun-  
tur, noti sunt: tamen pomum mandrago-  
ræ calorem quendam odore testatur: &  
colocynthidis fructus medulla amarior &  
purgantior, quàm ipsa planta, vt antè dixi-  
mus: *ἀγρύπτερον* peponibus addit Actuarius.

## L I G N A.

*Diosc.  
Lignum  
aloës.*



**A** GALLOCHVM est lignum quod ex India & Arabia defer-  
tur, maculatum, odoratum, gu-  
stu astringēs, & subamarum, cu-  
te aliquantum, versicolore. Halitum mālū  
commenlat, ventriculū frigidū iuuat  
A& est enim eustomachū. Pro thure ad  
suffimenta substituitur Dioscoridi, eiusque  
modo liquefcit, sed tardiū: aquæ iniectū  
subfidet, & bullulas edit. Arborem huius  
triplicem scribit Ludouicus Rom. Patrici-  
us in tractu Indico videri, Calāmpar perfe-  
ctissimā, Bochor vilissimā, Iubā me-  
diam. Xylaloë Aëtio & Actuārio dicitur,  
id est, lignum aloës, arboris non herbæ.  
Rhodiis militibus est frequens in corollis  
precariis. Quod verò ostendunt officinæ,  
verius est aspalathū acre & austerum. Gal-  
lib. 6. sim. quod aroma apud suos nasci idem  
Gal. scribit lib. 8. comp. ph. part. & in Syria  
& Rhodo Dioscoridēs: graue, detractō cor-  
tice rubens aut purpurascens, densū, odo-  
ratum, amarum, astringens: alterum deteri-  
us, candidū, lignosū, inodorum, Diosc.

**B** Ersilium, vel Verzinium, à Verzinia  
vrbe Indiæ aduectum & dictum, me-  
dicis

dicis in vſu nondum venit, ſed infectorium tantum eſt rubenti colore.

**G**Aiacum lignum haud ita pridem inuentum, morbis omnibus ex humore præſertim frigido nariſ ſalubre eſt: nam acrimonia & amaritudine incidit, tenuat, terget, vacuat. De huius facultate mira doctiſſimus Antonij Galli medici commentarius, hiſ diebus paucis in lucem editus, facit, ne mihi de hoc pluribus ſit agendum: vt interim taceam Huttenum, Mathæolum, Maſſam, & alios quamplurimos, qui verboſiſſimè vires eiſ nobis inculcarunt, potiſſimùm in curâda lue Hiſpanica: ſed tamen etiam morbis aliis, præſertim frigidis, conferre tam eſt hodie perſuaſum, vt certatim eo etiam magnates vtî geſtiant.

**Λ** *Ωτὸ ῥίνευμα*, id eſt, ſcobs & raſura Loti, ad ſanguiniſ ſputū vſurpatur Actuario in *Διά κλέντρν*: Galeno autem ad muliebri profluuium, dyſenteriam, cœliacos affectus. Huius fructus etiam valèter aſtringit. Alifa vulgò dicitur, & arbor ipſa Alifier.

*Libr. 7.  
ſimpl. in  
lota arbo-  
re.*

**S**Antalum triplex Actuario Græcorum ſoli, Arabes vt videri poteſt, imitato: album peſſimum, rubrum bonitate medium.

*Sādalum  
vulgò.*

*λίρπιον* Act. flauum odoratissimum & optimum: frigida omnia gradu tertio, sicca secundo, hepar roborant Act. Ex agro Calicuti Indiae emporij aduehunt Lusitani. Quod autem officinae usurpant, est calidum, & linguam acrimonia pungit, praecipue citrinum: ut cedri vel alterius aromaticae & calidae arboris lignum iure optimo censerī debeat: nec utendum nisi medicus iusserit.

Xylobalsamum in carpobalsamo dictum est. Xylocinnamomū, in cinnamomo dicetur mox; & Xylocasia Actuarij in casia.

*Lib. 9. cō-  
ph. par.*

Aromatica verò medicamenta sunt nardus Indica & Gallica, *σέλιον ἄνθος*, casia, amomum, cinnamomum, costus, spica nardi, calamus aromaticus, iris, ladanum, malobathri folium, styrax, bdellium, opobalsamum, xylobalsamum, & reliquus aromatum catalogus, aspalathus, myrrha, crocus, macer, opus Cyrenaicus, pretiosa haec & sumptuosa: pauperum verò communia, meum, dictamnus, acorum, cardamomum, *lib. 6. & 8. comp. phar. part.* Piper verò non esse aroma, ex priore loco colliges. Omnia autem aromata sunt calida sicca, tenuium partium, *libr. 7. comp. phar. part. in fine.*

DE CORTICIBVS.

COR





**C**ORTICES fructuum, vt arancij, citrei, granati: radicum arborum, vt oxyacanthès; capparis, tamaricis, fraxini, sambuci, mori, thuris: & herbarum radicum, ebuli, apij, petroselini, fœniculi, mandragoræ, raphani, in cognominibus plantis vel dicti sunt, vel dicentur. Qui verò præter hos sunt exotici, & ob raritatem quidem, etiam ob facultatem in maiore pretio habiti, nunc præcipue dicentur.

**C**innamomum arbor lauro foliis & bacis similis, & eius ramorum non trunci, tertio quoque anno delibratorum cortex: Ludouicus Romanus Patricius. Cinnamomum calidum tertio ordine, siccat autem & digerit super omnia æque calida; propter summam essentiaë partiū tenuitatem: propter hæc dispositionibus scirrhosis mederi solet. Idē cunctas corrigit putridas & venenatas vires ichorum, & humorū, & lethaliū pharmacorum, & veneni virulentarum bestiarum. Idem sua facultate alteratrice & digerente, & odoris gratia, præsidium est non paruum aduersus omnes prauas dispositiones, & casia, & pleraq; alia aromatum materia. Cinnamomum quia tenuissimarum est partium, ventriculi meatus aperit, qui humores crassi & lenti inhaeserunt, tenuat, &

*Li. 7. sim.*

*Lib. 6. cō.*

*ph. par. in*

*diabesa-*

*sa.*

*Lib. 7. cē.*

*ph. part.*

*Lib. 8. cē.*

*ph. part.*

*Ibidem.*

terget, ob id cōmodè hieræ miscetur. Cinnamomi autem facultas qualis initio adest, integra seruari nequit ad annos triginta, multò minus ad centū, vel etiā ducentos, ut quibusdam visum est, cinnamomū semij expertis putantibus. Nam id seruatum vasculis ligneis ab imperatoribus variis, Traiano, Hadriano, Antonino, Commodo, Seuero, imbecillius tātò est expertus Galenus, Seuerotheriacen componens, quāto vetustius: cōtrā tanto valentius, quanto recentius. Nam Seuerō Imperatori theriacā parare iussus, qualē Antonino Imperatori parauerat, contactus cinnamomum capere ex Traiani & Hadriani temporibus relictū, cū nōdum triginta anni prēterissent, multò inualidius expertus est, lib. i. antidot. Arborem enim totam primi generis cinnamomi ex Barbaria in scrinio cubitos quatuor & semisē longo ad Antoninum allatam vidit Romæ Galenus, ex eaq; theriacen paratam aliis longē pręstantiorem expertus est, ut ea etiā ante duos menses Antonino vtilicuerit, nō expectata medicamenti cōctione. Cinnamomum optimum, iis qui id crebrò viderūt, omnium facillimè dignoscitur: & cū principum cinnamomorum sex sint diffētię generales, optimi tamē supra deterrimum insignis est excessus, ut in casis, quorum

rum tamē optima parum à prauissimo cin-  
namomo abest. Id autem cinnamomum est  
odoratissimum, ac indicibilē quandā odo-  
ris gratiā super alia omnia refert, gustatu  
admodum calidum est: non tamen adeò, vt  
molestè rodat: color illi est lacteus, cū *σαῦν*,  
id est, giluo, & cum cyaneo mistus. Cinna-  
momum quantò casia sit præstantius, do-  
cet Gal. lib. 5. comp. pharm. part. in dentifri-  
cio: quod si odorum facere vis, misce casiae  
aut anomi drachmas duas: si regi paras, cin-  
namomi drach. vnam, vbi non solum casiae  
pōdus duplat, sed etiam mediocribus dicat  
cinnamomum regibus. Ob id penuria cin-  
namomi duplum casiae miscendum omnes  
propemodum veteres scripserunt, vti quod  
pondus aliquis robustus ferre consuevit, eo  
absente ferant duo imbecilli. Quintus au-  
tem penuria cinnamomi multum vti du-  
plum carpesij miscebat, cinnamomo miscer  
casiam duplicatam, Aet. in pastillo ad ileo-  
sos. Pseudocinnamomum verò est simile,  
ob id facile nobis imponit, sed gustu & odo-  
re lōgè est inferius. Xylocinnamomum li-  
gnosum est: valida habet virgulta, nec simi-  
lem habet suaueolentiam. Cinnamomū o-  
moium præstantissimū est cineritiū colo-  
re, virgultis gracilibus, nodis frequentibus,  
odoratum vehementer: idque odore longè

*Libr. i.  
antid.*

*Gal. i the  
riace ad  
Pisonem.*

optimo & suauissimo, gustu acri, & admodum mordaci, & quod mansum *πικρὸν* id est, rutam olere videatur, læue, confringi facile: addit ibidem veri cinnamomi genera aliquot. Vero igitur, cinnamomo nos caremus: nostra autem Cannella aut Casia est, aut pseudocinnamomi species. *καπνιστὸν ἄμυμον* Act. pro optimo vsurpatur.

*Casia lignea vulgo, & aromatica: est autem nostra cannella.*

*Li. 1. ant. Galen. in theriace ad Pis.*

**C**asia verò genere proxima cinnamomo est, quia ipsa nonnunquam ex æmulatione euadit cinnamomum; ut totum quidem veluti exacta arbor, casia videatur: furculi autem in ea quidam cinnamomi, ramis casia proximi reperiantur. Optima Casia in cinnamomum degenerat. Vidit enim saepe Galenus casia sublimis & ramosa ac fruticis æmule in magnitudine furculos cinnamomi furculis omnino similes, corticis tenuitate, & firmissimis cinnamomi notis in odore & gustu deprehensis. Casia saepe imponit, nisi sis in diiudicando expertus: pseudocasia enim veræ est perfimilis, sed odore minus est grato, & corticem medullæ adhærentē habet. Optima autem laudatissimaque est *καίσα, ποδίσσα, διρίσσα*, id est, rufa, rosam expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens, fistulosa, & aromatum modo vehementer odora. Casia cortex Actuarius etiam dicitur. *σπρίγ τῆς λαοίας* idem, Casia

Aegyp

Aegyptia idem, in asyncritico casia cathartica, id est, purgatrix quibusdā dicitur. *ἡ σούργις τῆς κασίας*, li. 1. antidotorum in compositione theriaces. Casia *σούργις*, id est fistula, & *λίρρα*, id est, rufa dicitur in arteriacis Andromachi: *πυρρὰ* verò bis lib. 6. eiusdem. *μυλαίνα* autem in fine lib. 7. bis, & libr. 8. eiusdem. *ῥοδίσσσα* denique, id est, rosam spirans, lib. 8. *φυλονασία* eadem Actuario, & Arabum alumnis casia lignea. Casiam fistulam cum Andromacho minore ad Galeni ætatem omnes theriacæ miscebant: hæc autem omnibus nota est, & comparatu omniū facillima. Corticem verò exteriorem (quem & fistulam dicunt) odoratu & gustatu valentem habet: quod autem intus est, maximè imbecillum, ob id inutile. Aduersus putria, deleteria, venena, proxima post cinnamomum casia, quæ optima est, atq; illi cognata valet: aromatâq; cætera, nardus, iuncus odoratus, calamus, aspalathus, myrrha, crocus, eandem habent facultatem: sed cinnamomum digerit: casia verò & malabathri folium, & amomum astrictionem participant. Casia, crocus, costus, amomus, nardus astringunt quidem, sed magis digerunt, præsertim costus.

**M**acer Dioscoridi est cortex flavescent, seu cum Plinio rubens, radicis

*κασία ἐα  
φνίτις.*

*Lib. 9. c.*

*ph. part.*

*Lib. 1. an  
tid.*

*Libr. 8. c.*

*ph. par.*

*Libr. 4. c.*

*ph. par.*



Libro 7.  
simpl.

magnæ, nomine suæ arboris nobis incognitæ, crassius, gustu perquam astringens, ex Barbaria allatus. Galeno autem est cortex gustu multum acerbo, cum leui quadam acrimonia, odorem iucundum redolens, vt pleraque aromata, siccat ordine tertio, calore & frigore est temperatus. Tameñ libro 6. comp. phar. part. in compositione *διὰ ῥοιῶν*, ad finem scribit *καλὸς μύρον μά-  
νις φλοιὸς τις ἀροματικὸς ἰκανῶς διρμαίνων  
τι καὶ τὸ φῶρ*: nisi causeris aduerbium *ἰκανῶς* transponendum, vt solùm determinet *τὸ  
φῶρ*. Ex India verò affertur. Macis autem Arabum membrana est extima nucem moschatam propè totam vestiens, tenuis, rufa, aut flaua, interdum nigricans, aromatica, odore suauis, sapore subacri, & minimum amaro, tenuium partium, calida sicca tertio gradu, ventriculum roborat, coctionem iuuat. Ex quibus liquet, Macis & Ma- cer res planè diuersas, licet odore, colore quadantenus conueniant: at temperamento tamen differunt, nisi contendas in Dioscoride & Galeni simplicibus mēdum esse, quod vix queas demonstrare. Quòd si res sint diuersæ, vt ex Plinio aperte patet, Ma- cer hodie est incognitum: tamen pro Nico- lai Macis Actuarius *μάνις* reponit.

DE SVCCIS.

χυλῖς



**X**ylis, id est, succus ex plantis totis, vel plantarum partibus cōcis & tuis torculari, vel manu, vel aliter expressus, aqua interdum aspersa, aut vino, aut liquore alio, vel recens vsurpatur, vel vase, aut loculamento aliquo reponitur, hīcq; vel liquidus, vel ficcus. Liquidus item aut per se seruatur, vt vinum, acetū: aut misto sale, vt omphacium, oleum: aut superfuso phialæ oleo, vt succus rosarum, granatorum, limonum, cydoniorum, sambuci, ebuli, & similibus: aut sole, veltatēve, aut igni per se ficcatur, vt succus glycyrrhizæ, opus Cyrenaicus, scammonium: aut coctione cum melle, vel saccharo ad iustam crassitiē facta sole vel igni vt in plurimis syrupis audies. Quiverò succi sine melle [aut saccharo] reponūtur, plurimum corrūpuntur: nisi igne diutius cocti, aut sole æstiuo vsque ad mediocrē crassitiē ficcari fuerint. Idē temporis spatio ficciores euadūt, pluribúsque annis seruati, eo ficcitatis veniunt, vt balausticis similiter læuigari possint (quales sunt succus hypocisthidis, vuæ acerbæ, glycyrrhizæ, cētaurij, & alij propè omnes) qui verò ex his lentore quēdā natura habēt, dilatātur magis, quā læuigētur, nisi ficciorib⁹ multis mista horū parua portio. Portulacæ, semperuiui, coryledonis, &

*Libr. 6. 2.  
phar. par.*

*Lib. 1. 60.  
ph. 2.*

aliarum similiter glutinosarum succus, præ lentore nimio per se non potest exprimi, cū omphacio probè trita herba exprimitur: alij tritas igni lento calfaciunt: alij tritas loco frigido, vt cella vinaria, vimineo vasi impositas in catinum subiectum destillare permittunt. *χυλὸς* etiam id est, succus, sape cum humore aliquo extractus ex partibus plantarū, vt semine psyllij, cydoniorum, lini, scenigræci, lentorem, aut velut cremorem & muccorē significat: vnde dictum est emplastrum *ἀπὸ χυλῶν*, id est, de glutinosis quibusdam succis: diuersum tamen ab eo, quod est de muccilaginibus, vt in compositis leges.

*Li. 7. sim  
pli. & li.  
2. c. phar.  
gen.*

**O**leum propriissimo nomine appellatur, quod ex oliuis exprimitur: maturis quidem dulcissimum, calidū, moderatè humidum, vel dum est recens, frigidum humidum, libr. i. comp. ph. gen. ex crudis autē & immaturis omotribes & omphacinum quantum astringit, tantum refrigerat: illud veteratum calidius fit, & potentius digerit: hoc autē si dulcescit vetustate, dulcis vires induit, quas sapore explorabis. Tenue est purum, translucidum, & cuti affusum eius modicum, latissimè per eam extenditur, continuum sibi manens, & citò à cute combibitur: idēque optimum aestimatur, quale in

Ital

Italia Sabinum. Oleum lotū morfu omni  
 caret. Lauandi modus in lib. de comp. ph.  
 gen. Sicyonum autem, cicinum, raphani-  
 num, sesaminum, amygdalinum, caryinū,  
 sinapinum, lentiscinum, laurinum, melanti-  
 num, terebinthinum, mastichinum, myrti-  
 num, balaninum, hyoscyaminum, & alia  
 præter hæc plurima ex fructibus expressa,  
 fructuum, ex quibus extrahuntur, naturam  
 sequuntur. De his in compositis medicamē-  
 tis fusiū. Salsum autem oleum iam compo-  
 situm est, tantūmq; caloris & siccitatis assu-  
 mit, quantum salis. Oleum vim habet mi-  
 tigatoriā & laxantem, lib. 2. comp. ph. pa.

**V**inum protropum, id est, quod ab vuis  
 defluit, antequā calcantur, medium  
 inter calidum & frigidū, hepaticis saluber-  
 rimum, præsertim cum hepate lupi: quia  
 proprietate substantiæ hæc nutriūt, nec cal-  
 faciunt, nec refrigerant. Vinum musteū ca-  
 lidum primo ordine, verus tertio, medium  
 secundo, calori proportionē respōdet siccī-  
 tas. Ex musto cocto fit *ψευδα*, id est, sapa,  
 lib. 7. comp. ph. part. Nescio quo modo ne-  
 glectū est, quod à nostris Asiæ Græcis *ψευδα*  
 dicitur, ab his qui Attico sermone magis  
 videntur *είπω* id est, sapa: quāuis etiā *είπω*  
 dicitur, quod pinguibus ficis in aqua coctis  
 efficitur, quod magis digerit & terget.

Must

Lib. 8. cō.  
 ph. par.  
 Li. 8. sim.

Mustum verò coctum magis est emplasticum, non rodens, lib. 7. comp. ph. par. Ex sapia dissolutum castorium cum opio dolorem aurium inflammatarum magis sedat, quàm vinum dulce, initio libri 2. eiusdē. Facultatum vini differentia sunt permultae: à substantia tenui, crassa: colore, albo, fuluo, rubro, nigro: odore imbecillo, valenti, sapore vario, sumendae: de quibus Gale. libr. de vinis, lib. 4. & magis 5. sanit. tuendae: Apho. 17. 18. 21. lib. 2. lib. methodi 7. maximè 12. libro 1. antid. lib. 3. aliment. Vinum medicamentis stomachicis, coeliacis, hepaticis, feliciter miscetur, si absit phlegmone, erisypelas, abscessus, intemperies calida. Nam totius substantiae similitudine alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperiem frigidam vel humidam, si qua adsit, tutò persanat, libro 8. comp. phar. par.

Omphacium sic à vino differt, ut oleum omphacinum à dulci: siccato interdum utimur, ut Heraclides apud Gal. libr. 6. comp. ph. part. id quia repellit, incipientibus phlegmonis est salubre.

**A** Cetum crassis partibus, & facibus, seu facii proportionē respondentibus calidum videtur, nō tamen causticum: tenuibus verò partibus frigidū, idq; magis quàm calidum, aut fortè frigidum per se, calidum

*Libr. 1.  
simpl.*

per



per accidens. Nam spongia aceto madida, plebeio cuidā admota, is principio & post horam vnam, duas, tres, frigus percipit: ablata deinde spongia, sensim nascentis in parte caloris phantasiā & opinionem habet, acrimoniam mordētis ratione. In œdematis verò calorem non inducit: omnino autem siccatur. idem purum, idem aquæ non mistum, & perlucidum maximè est partium tenuiū, lib. 1. com. ph. gen. Acetum incidit, tenuat,

*Lib. 1. &  
2. c. ph. p.*

digerit, refrigerat, reprimat, ac repellit influxum. Nam substantia modicè calidum est, plurima parte frigidum, tenuium est partium, si est acre admodū, & nihil vini qualitatis representās. Idem solum ob suæ virtutis vehementiam capitis affectibus non adhibetur, sed mistum alteri: album magis est tenuium partium, libro 6. comp. ph. par. Acetum atram bilem parit, & in massam attollit, biliosis salubre, Hipp. lib. 3. rat. vict. acut. & ibidem Galenus, tamen quartanis datur ad incidendum & tenuandum.

**M**EL in succorum censum referri potest: quod autem est calidum siccum ordine secundo, vt medicamentum: vt alimentum verò, & dum actu nutrit, calidum humidū lib. 3. temp. terget, alit, coquit, putredini resistit, vt vinum, non cogendo substantiam

*Libr. 7.  
simplic.*

stantiam corporū quibus exhibetur, vti sal;  
sed siccando, tergendo, ora aperiendo, tran-  
situs purgando. Vrinās mouet, stomachum  
subuertit, ob id non miscendum remediis  
vomentium: intemperies frigidas humidas  
tūtò sanat, calidis siccis seu biliosis est adue-  
rsissimum, sinuosa vlcera glutinat. Coctum  
& despumatum minus acre, & tergens red-  
ditur, sed magis nutriendum. Mel medicamen-  
tis miscetur vel crudum, vel coctum, vel  
solum despumatum, vel cum his coquens-  
dum, aut solum despumandū, aut vt crudū  
maneant. Cum autem despumandum est, co-  
quitur super prunas aut flammam ligno-  
rum aridorum, & sine fumo.

*Libr. 6. r.  
phar. p.*

*Lib. 4. fa-  
nit. & li.  
7. meth.*

Mel optimum fit purum adeò, vt totum  
perluceat, odorum, flauum, acerrimum, dul-  
cissimum, gustanti iucundissimum, confi-  
stentia nec crassa, nec liquida: sed tam sibi  
cohærens, vt continuitatem suam quasi li-  
nea longissima non intercissum seruet, si di-  
gito attollitur. Idem coquendo paucam spu-  
mam remittit, nec thymum improbè olet.  
Album etiam ex Gallia Narbonensi præ-  
stantissimum affertur, & pallidum magis  
est primo apum nouellarum mellificio.

**S**acchar autem, vt vocant, & ipsum mel-  
lis species, ex India, & felici Arabia adue-  
-ctum,

Etum, in calamis (vraiunt) cōerescit, minus dulce quàm nostras: similiter tamen terget, siccet, digerit, nec inimicum stomacho est; nec sitim affert, vti nostras: quæ res ipsum à melle substantia differre ostendit. Idē sal Indus quibusdam dictus videtur, vi solis gutta extra cannas extracta & densata. Idem Zuchara Arabum re ipsa esse apparet, solo differens compositionis modo per coctionē & expressionem: noto quidē Varroni & Straboni, ignorato autem Dioscoridi, Galeno, Plinio. Nec tibi difficile fuerit rationes euoluere eorū, qui Saccharū Græcorū à Zuchara Arabum diuersum contendūt. Actuarius Sacchar vbiq; scribit pro Arabū Zuchara, voce ab his suo more ex Græcis deprauata, aut fortassē contrā cūm res ea fuerit Arabica, Græci ex his nomen mutuati sunt. Saccharum rubrū est ipsa velut spuma sacchari, spurcitiem coctione deponentis, calidius & acrius saccharo, vti spuma mellis, melle.

**A**eromeli, id mel aërium Galeni est, Maana Arabum, liquida & granulosa. Cuius & mellis eadē parte bona videtur esse materia, quod cœli sereni rorē à frigido concretum in floribus (qualem in maturis vuis, batinis, prunis videmus) apes colligūt, licet etiam floribus quibusdam mellea insit dulcedo apibus appetita.

*Μάνα*  
*Persicam*  
*laudat*  
*Actna*

Man

Manna hæc subalba fit, & recens, ex plâ-  
tis odoratis, & homini salubribus collecta.  
Laricea hodie probatur, anno seruatur, bile  
leniendo purgat sanguinem data ab fescū-  
cia ad vncias tres: calida ordine secundo.

Libr. x. c.  
ph. part.

**C**era calidi, frigidi, humidi, sicci quodā-  
modo media, crassæ essentia, emplastica,  
debiliter coquit ad mota, habet paulum  
quiddam digerentis calidæq; potentiæ, quæ  
melli plurimum inerat. Materia ob id est  
aliorum medicamentorum calfacientium &  
refrigerantium. Ea aut lutea est, aut fusca,  
aut alba: & hæc aut natura, vt Pōtica aper-  
tè acris: aut ablutione, vt Tyrrhenica, & no-  
stras acrimonix expers. Cateri colores sunt  
ascititij, vt viridis ab ærugine, ruber ab an-  
chusa vel cinabrio vulgari, niger ab atra-  
mento, vel charta vsta, à quibus mistis vires  
mutat. Optima subfulua, subpinguis, pura,  
odorata, sapore melleo.

Κηρὸς γάρβη Ⓞ opinor pro γάρβη Ⓞ, id est,  
cera stacte & stillatitia, initio lib. 2. compo-  
sition. ph. gener. legitur.

Oxyacanthæ succus Actuar. Scillæ succus  
cum melle coctus tribus cochlearibus ante  
& post cibū datur ægrè spirantibus, Actuar.  
Succus Brassicæ cum melle coctus linctu  
est

est arteriacæ Asclepiadis & Antonij Musæ,  
ibr. 7. co mp. ph. part. Galeni.

Succus pomorum mandragoræ vigen-  
tium optimus, ex Creta Romā fictilibus po-  
culis seculo Galeni afferebatur: & hyoscy-  
ami succus æstate collectus, libr. 1. c. ph. g.

Χυλὸς ποτὶ Pōticæ lib. 7. comp. ph. part.  
indiacodio Damocratis. Succus alterci &  
mandragoræ Andromachus lib. 7. Chylus  
seu succus eryngij in aqua cocti. Succus fi-  
cium in aqua coctarum, lib. 7. cōp. ph. part.  
Succus scillæ, libr. 7. Succusari masculi lib.  
8. Succus plantaginis aridus, refrigerato-  
rius, initio lib. 8. Succus radicis mādragoræ:  
succus pomorū lib. 9. Succus ex acinis ma-  
lorum punicorū tritis expressus. Succu plan-  
tarum sole vel igne vel temporis diuturni-  
tate siccari, qui tamen humentes vsurpari  
possunt, in vsu medicorū frequentiore sunt.

**A** Cacia succus est ex fructu seu semine, *Dioscor.*  
interdū & foliis spinæ Aegyptiæ ex *Li. 6. sim-*  
pressus, in vmbra siccatus, siccatur ordine ter- *pli.*  
tio, refrigerat primo: secūdo autē, si lotionē  
lenē suā acrimoniā deposuerit. Acacia *lib.*  
lib. 7. compo. ph. part. in diacodio Hera.  
Hæc tamen humidior vsurpari potest, vt in  
theriace leges. Eligendā modicē rufa & o-  
dorata, quatenus illi datum est. Eius loco



**Diosc.** ex bacculis prunorū agrestium coctis succum expressum tessellatim confectum insolatūmq; vsurpamus minimo errore, quia refrigerat, siccāt, astringit vt veterum acacia.

**Perro-  
quet vul-  
go.**

**A**Loë herba semper virens, nunc in multis Galliaë occiduaë domibus ad ostentationem appendi solita, & eius herbaë succus calidus in fine ordinis primi, aut initio secundi, siccans ordine tertio, valenter amara est, astringit modicè, idque sine morfu, ecoprotica est, id est, stercus deducens, & eustomachos præcipuè lota: repellit, digerit, terget parum, quantum scilicet vlceribus puris non fit molestum, sinus glutinat, vlcera dysepulotica, præsertim sedis, pudendi, oris, glutinat: & phlegmonas harum partium sanat aqua subacta.

Sumpta sæpe hæmorrhoides venas aperit, vel à tota substātia, vel quia calida: crassæ essentiaë, & pro modo terfionis mordax, lib. 5. simpl. cap. 13. & Aphor. 47. lib. 6. quauis anastomorica sint acria, terrea: admota autem sanguinis fluorem cohibet, quia astringit, & emplastica est, ob id emphractica, id est, obstruens dicitur, cap. 11. libro 5. simpli. Nihil enim sumptum & admotū vires habet easdem, libr. 3. temp. de sinapi, & libr. 8. methodi de mulsā. Aloë, vt rosæ,

**Lib. 4. cō.  
ph. part.**

mistæ

mixta est faculatissima amara substantia  
terguunt, astringente vlcera contrahunt, &  
cicatrices terguunt. Optima est pinguis, li-  
bro 9. comp. ph. part. glutinosa, ex rubro ru-  
fa, hepatis modo coacta, & intus foueata,  
proinde minus grauis, bono odore myr-  
rham amulante, syncera, nitida, transpa-  
rens, arenarum & calculorum expers, fria-  
bilis digitis, facile liquefcens, eximie ama-  
ritudinis, non adulterata acacia, vel misto  
gummi, quod illam minus amaram, vali-  
dioris odoris, non friabilem digitis ad mi-  
nima vsque frusta reddit. Indica est optima.

Valet etiam ex Cœlosyria, & Arabia. Ex  
magna Syria humidior. Arabicam tamen,  
tanquam omnium vilissimam & solis mu-  
lomedicis vsurpandam, damnauit Mesues:  
& inde caballinam vocant, nigram, obscu-  
ram, fæci simillimam, amarissimam odore  
tetro, arenosam, vt optimæ sedimentum vi-  
deatur. Primam succotrinam, secundam  
hepaticam seu Persicam, tertiam Armenia-  
cam, quartam bonitate Arabicam statuunt  
Mesues & alij. Aloë lota minus aluum  
ducit, multum enim virtutis medicamēto-  
sa lauando deponit, magis tamen ventrem  
roborat. Aloë etiam lota his maximè ad-  
uersa est, qui citra prauos humores intem-  
perie calida sicca laborant.

*Dioscor.*

*Gal. li. 6.  
simpliciu,  
c. libr. 8.  
c. ph. part.*

*Li. 7. me-  
thod.*

*Libr. 8. c.  
phar. p.  
Ibidem.*

*Dioscor.*

**E**laterium, succus ex fructu cucumeris  
agrestis, à bimatu ad decennium bilem  
ac pituitam vtriusque parte vacuat, à semiobo-  
lo ad obolum sumptus. Extrahitur variè  
Dioscoridi.

*Diosc.**Gal. Lib.**6. simp.**Memi-  
ste.*

**G**laucium, succus herbæ ad Hierapolin  
Syriæ urbem nascentis, foliis ferè papa-  
ueris corniculati: à quo tamen quantum  
differat, docet Dioscorides, & succum ex-  
trahendi rationem: Græcis in usu multo &  
Arabibus, nunc ignoratur: valenter astringit,  
& insigniter refrigerat.

**G**lycyrrhizæ succum ex Creta delatum  
præfert Gal. lib. 7. comp. ph. p. in sua  
antidoto diacodio. Cetera de hac dicta in  
radicibus.

*Diosc.*


**H**ypocisthis iuxta cisthi radices nasci-  
tur flore punici similis, siccatur & astringit  
magis quàm acacia: prodest disentericis,  
coeliacis, sanguinem siccantibus, foemina-  
rum profluuii sumpta & indita. Hypo-  
cisthis succus, & Hypocisthidis succus pas-  
sim dicitur in lib. com. ph. p. Hypocisthidis  
succo addita γλυκύς, id est, passi parte, ma-  
cerat. gummi, tragacantham, myrrham,  
thus, lib. 7. comp. ph. part.

*Lib. 7. sim-  
plic.*

**L**ycium à Lycia regione dictum, & dela-  
tum, succus est Pyxiacanthæ Dioscoridi  
&

& Galeno liquidus, quo vtebatur ad sugillata. Phlegmonas oris & sedis, herpetas, putredines, vlcera contumacia, aures purulentas ficit, & digerit ordine secundo, astringit, terget. Calore symmetris est proximū. Copiosum etiam est in Cappadocia: Indicum autem est ad omnia valentius. Hæmorrhagiam à naribus Lycium sistit, linamēto impositum lib. 2. comp. ph. part. Lyciū coquit, digerit, vt castoriū. Indicum autem dico, nō quod apud nostras gentes nascitur, lib. 4. comp. ph. par. Lycium etiā Aphrum dicitur, lib. 3. comp. ph. part. Spumam Lycij appellat ex Solone, libro eodem. Succo ex baccis Periclymeni id mētimur. Modus aliusest in lib. de dynamibus, qui Galeno adscribitur.

## DE LIQVORIBVS.



**P**LANTIS partes præter cōpositas insunt etiā similes ac simplices: sua quædam caro, os, nervus, vena: su<sup>p</sup> velut sanguis & humor in omnes partes nutriendas dispersus: suæ etiam lacrymæ ex planta sponte sua defluentes, vt gummi: suus *χυλός*, id est, succus, de quo prius: suus item *ὀπός*, id est, liquor, qui est crassum illud & lentum, quod ex vulnere effluit, quanuis radice incisa, qui

*Theophr.  
lib. 1. et 9.  
hist. plant.*

inde *ῥιζία* dicitur: vel caule etiam vsque ad medullā secto, terebrato, castrato, qui *λευχία* dicitur, dilutior, altero puriore, & perucidior.

*Assa a-  
romatica  
et odora-  
ta & ben-  
ioun.*

**S**pecialiùs tamen & per excellētiā *ἰπὸς*, Cyrenaicus & Medicus, & Syriacus intelligitur, quia omnes caliditate, & tenuitate exuperat, ob id omnium maximē digerit per halitum: quanquā reliqui liquores sint multum calidi, & spirituosī, & plurima horum pars essentiaē aëriae & ignea. *χυλὴ* tamen, *δάκρυον*, ἰπὸς Græcis saepe confunduntur, & Latinis Succus, Lachryma, Liquor. Præstantissimus autem ex Aphrica est Cyrenaicus Galeno, Indicus & Armenus Mesuæ: imbecillior Medicus & Syriacus: uterque etiam virus & putrilaginem resapiens, ut & Parthicus, & Persicus, Dioscorid. Est autem Lasensis seu Laserpitij seu Silphij herbae liquor, caule ipsius ferulaceo, aut radice scarificata defluens, acer, mordax, digerens, optimus modicē rufus, non porraceus colore, translucens, myrrhæ æmulus, odoratus, suavi gustu, dilutus citò albescit. E Taprobana maris Indici insula omnium maxima conuehi hodie præstantissimum, Belzoë vulgò dictum, scribit Ludouicus Romanus Patritius. Opus Cy-

renaic

*Assa fa-  
tida.  
Libro. 6.  
c. ph. p.*



renais est saluberrimus phlegmonæ gargareonis, & aliarum partium, non incipienti, sed veteratæ, & in scirrhum durescenti. Est enim acerrimum & maximè calfaciens medicamentum.

*Libr. 6. c.  
ph. p*

**M**ηκώνιον & μήκωνος ἰπὸς libro. 1. phar. gen. succus ex foliis & calice papaveris tuis expressus, pro Opio à multis supponitur, alia eius adulteria, Dioscorides. μήκωνος ὀπὸν, & μήκωνον diuersa facit Asclepiades apud Gal. libr. 2. Antid.

**O**pium est lachryma ex inciso papauere nigro defluens, hodie etiam ex albo destillat. Ex Apulia affertur: refrigerat, siccatur, inspissatur, Dioscor. Incidendi & colligendi modum docet idem. Præfertur Thebaicum. Hispanum opium vsurpatur lib. 7. c. ph. part. Opium calidis dispositionibus medetur, ut altercum, & similia: medicamenti additur ad sedandum dolorem, somnum conciliandum, siccandum, Gal. lib. 8. comp. ph. part.

*Gal. li. 3.  
simplic.*

Opium etiā stomachicis miscetur ad sensum stomachi hebetandū, & somnū conciliandum. Vehemens autē refrigeratio ex opio, corrigitur castorio, pipere, & similibus, libr. eodem octauo. Opij 3. duas arteriarum 14. miscet Andromachus, lib. 7. eiusdem.

Cum multi sint *ἰπῶς*, id est, liquores, foli-  
us papaueris *ἰπῶς*, neutro genere *ἰπῶς* à me-  
dicis propriè nominari solet, lib. 9. cō. ph. p.

Opium omnium quæ sensum stupefaci-  
unt, & somnum torpidum inducunt, valen-  
tissimum est lib. eodem.

Opobalsamum, in Carpobalsamo di-  
ctum.

*Li. 8. sim-  
plic.*

Opopanax liquor è panacis Heraclij ra-  
dice incisa emanans, cum caulis primum  
erumpit, aut vulnerato caule messibus: ca-  
lidus ordine tertio, siccus secundo, emollit,  
digerit, modicè terget. ob hoc ossa nuda ve-  
stit carne, vlcera maligna & cōtumacia sa-  
nat. Recens est candidus, ubi aruit, colore  
foris est croceo, aut subflauo, intus candi-  
do, odore graui, amarissimus, lævis, pinguis,  
friabilis, tener, facilè in aqua liquefcens.  
Damnatur maximè niger, & mollis.

**C**edrinus liquor impensè calidus, & sic-  
cus, frigida & humida cerebri tempe-  
raturæ, ob id saluberrimus: capillum sistit,  
& auget, odore non ingrato consuetis, in-  
grato delicatis: lib. 1. comp. ph. part.

*Dioscor.*

**E**vphorbiū & Euphorbia arbor spino-  
sa in Athlante Libyco ad Mauritaniā  
mōte, ferulacea q; & ex ea conto eminus in-  
cisa

cifa liquor emanās lacteus, facult. est causticæ ac vrentis, tenuiū partiū, vt alij liquores: *Li. 6. simplic.*  
 vnū orobi magnitudine, sarcocollæ modo emicat: alterū in ouillis vel hēdinis ventriculis quib⁹ excipitur, cōcrescit, vitreūq; spectatur. Elige trāsflucēs, acre, recēs, albissimū, si calore multo & igneo egetur: si modico: *Li. 3. cōp. ph. g.*  
 vetus & luteū. Nā recēs albius est ac valentius calfacit, citō autē virtus eius exoluitur, calorē enim habet caducū & statim euandū: & fit vetustate cineritiū, pallidius, aut flauius, modicē calidū. Id autē si recēs sit feruidissimū, vt linguā vrat, & leui gustu os accēsum detineat diurius, & quicquid gustatur, Euphorbiū planē resipiat. Bimū aut trimū mediocre viribus adhuc est (talīq; vritur Gale. li. 1. cōp. ph. p. in alopecia) interdū & quadrimū. Quinto autē vel sexto anno iā exoluitur, deinde procedēte tēpore in totū elanguescit. Gal. ne putes cū vulgo annis decem posse seruari: etiā cū milio, lētib. fabis adulteratur lacte hēdino, sarcocolla, glutino, id igni iniectū odorē edit fastidiendū. *Li. 9. cōp. ph. p.*  
 Euphorbiū siue liquor est, siue aliud ex occiduis regionibus affertur, vt Sagapenum ex orientalibus, lib. 1. comp. ph. gen. Euphorbium liquor est stirpis cuiusdam spinosæ in Maurusiorum terra prouenientis, facultate calidissimus, in vētre ouiū reponitur, quo-

niam hunc solum non erodit.

*Gal.li.8.  
simplic.*

**G**Albanum liquor ferulæ Syriacæ, seu plantæ ferulacæ in Syria frequentis, calidus in fine ordinis secūdi, aut principio tertij, siccus initio secundi: molliit, digerit, addit Dioscorides, trahit, vrit. De hoc pauca leges mox in Sagapeno.

Laudatur purum ligno, aliquid tamen feminis mistum habens, odore graui sapore abominabili, humidi & sicci medium, pingue, & in hammoniæ aut thuris similitudinem cartilaginofum. Eius obolos tres miscet Andromachus arteriacæ 12. alteri drach. sex lib. 7. comp. ph. part. Purgandi eius sordibus ratio Dioscoridi traditur.

*Hammo  
niaci gut.  
ta.*

*Diosco.  
Li.6.simplic.*

*Dioscor.*

Vitiatur resina, faba fricta, hammoniaco. **H**Ammoniacum seu Hammoniacum thymiam, liquor est resinæ aut gummi modo stillas ex ferula quadã Cyrenaica in Aphrica prope Iouis Hammonis oraculū vnde illi nomē: calfacit, discutit, & adeo valēter emollit, vt tophos articularū dissoluat, & lienes induratos sanet, ac chæradas per halitū digerat. Probatum purū ligno, arenis terra, sordibus, bene coloratū, odore castorei, sapore amaro, prædesū, & in thuris masculi similitudinē, minutis glebis, cartilaginofum. Hāmoniacū eryngio & melli mistū, arteriace est valida, & diuturnis affectibus

bus vtilis Critoni apud Gal.li.7.cōp.phar.  
part. Hammoniacū, Galbanum emolli-  
unt, mitigāt, emplastica sunt, & opopanax,  
sed illis valentius, libro 10.eiusdem. Ligno,  
terra, arenis, & sordibus aliis vitiatur.

**S**Agapenum est frutex ferulaceus, seu fe-  
rulae similis planta, lib. 8.simp. seu feru-  
la quædam panaci similis, lib.1.anti.in Me-  
dia regione, & abusiue ex ea succus: qui e-  
tiam *ἰνὸς σαγαπηννός* dicitur, lib.1.anti.d.ca-  
lidus, tenuium partium, vt alij opoi, seu li-  
quores: modice terget, oculorū cicatrices  
purgat & terget, suffusiones & oculorum  
hebetudines, à crasso humore leuat. Lauda-  
tur perlucidum, foris rufum, intus candidū,  
acre, odore porri, seu medio inter laferis li-  
quorem & galbanum, quibus adulteratur.  
Opopanaci enim nihil est simile, sed galba-  
no albiori. Nam spumosa, cohæres, albior,  
leuisq; pars galbani in Sagapenum degene-  
rat: pars altera densior & multò quàm aliud  
galbanum constrictior, fit galbanum opti-  
mum, sagapenum resipiens, eaq; tanquàm  
præstantissima vtendum, libro 1.anti.d. Si  
verum est, vino aut aqua statim dissoluitur:  
adulteratum non liquefcit, ibidem.

Scammonia, vel Scammoniū liquor ema-  
nans ex vulnerata radice crassa herbæ cu-  
iusdā in Myfia Asiatica, vnde laudatissimū  
affert

*Dioscor.*



affertur: hoc est, nitidum, rarum, fistulis tenuibus, fungosum, leue, taurino glutini colore simillimum, linguam non vehemēter exurens, linguæ tactu albescens, quam notam misto cum erui farina tithymali lacte adulteratum etiam habet, ac linguam vrit, quale pessimum est, & graue, densum, Syriacum, Iudaicum. Bilem verò & pituitam purgat, à drach. vna ad obolos quatuor. Seruatur annis 20. Mesuræ: 40. Serapioni, cum malo cydonio, in quo ab interaneis purgato coctum fit clementius.

Scammonia etiam foris admonetur, bis in cephalalgia apud Gal. lib. 2. cōp. ph. part.

*Diosc.*

**T**Hapsia liquor herbe ferulaceæ, valenter calidus, cum larga humiditate, ob quam citò corrumpitur: & cum violenter extrahat, & extractum digerat, plusculum ad ea tempus postulat. Eadem post annum est admodum imbecilla, bima prorsus expirauit, lib. 1. com. ph. gen. Primum in Thapso insula, inuenta est, vnde illi nomen.

#### DE LACHRYMIS.



*Αμυρον*, id est, lachryma seu humor ex planta spōte sua defluēs, siue in gummi aquea res cōcre-scat, siue in resinā lique-scat, olea

leagina eius substantia. Arborum partibus præsertim trûcis à germinatu incisis & scarificatis etiam resinas elicimus. Accensis autem arboribus resinosis, vt pinu, picea, larice, terebintho, teda, cedro, ex resinosa substantia igni parū siccata fit pix liquida, cui quod supernatat pissanthum tenui consistentia & facultate est astringente, ob id caniciem sine vlla noxa tardat, vt pissellæum, id est, pix liquida cum oleo mista, Gal. li. i. comp. ph. part. Pissasphaltus autem est Mumia Serapionis. Si pix iterum coctione siccetur, Palimpissa dicitur, sicca adeò, vt puluerizari possit: qualis est Græca, etiā Colophonia, & Hispana, & Gallica dicta. *ωίαρα βύρτια*, lib. 8. comp. ph. patt. & Dioscoridi probatur & Lycia. Est etiam Dioscoridi ex iisdem arboribus resina liquida & sicca. Resina omnis calfacit, siccatur: tenuium est partium, magis minus.

**R**esinarum iure præstantissima est Lentiscina, id est, Mastiche, parum astringit, siccatur sine morfu, calida & sicca ordine secundo, minimum est acris, tenuium maximum partium, stomachi, ventriculi, intestinorum, hepatis imbecillitati & phlegmonæ prodest: laudatissima & copiosissima est Chia insula (vnde Galeno Mastiche Chia passim dicitur) affertur, hoc est, fulgore quodam ignis

*Li. 8. sim.*

*et lib. i.*

*et 2. com.*

*ph. ge.*

ignis splendida, candore ceræ Tyrrhenicæ,  
adulta, retorrída, odorata, stridens friando.

**Dioscor.** Deterior est viridis, & nigra Aegyptia dicta, aut Pontica, bitumini nigredini similis. Mastiche apta stomacho, odoris grati, vim medicamentosam aloës & aliorum purgantium efficaciter frangit, initio libro 8. compo. ph. part. adulteratur mistura thuris & resinæ nucis pineæ.

**Li. 8. sim.** **P** *ῥηῖν τερβινθίνῃ*. Terebinthina resinarum cæterarum præstantissima, astringit manifestè, sed minùs quàm mastiche: emol-

**Lib. 8. cõ.** lit autem magis, coquit, digerit, qualitate  
**ph. part.** subamara, & partium tenuitate terget angu-

**Li. 5. san.** stos meatus vasorum, & in eis osculorum  
**tuend.** obstructions liberat, ob id putredinè prohibet, aut finit: & hepaticis probè miscet: è profundo potentiùs trahit quàm cæteræ re-

**Li. 1. ant.** sinæ. Hæc aluum citra noxam soluit, & viscera omnia, iecur, lienem, renes, pulmonè abstergit. Terebinthina resina omnis ex Chio insula est præstantissima, & odore & gustu cæteris præcellit. Chia igitur semper utenda, si haberi potest. Huius penuria Libyca, Põtica, & ex aliis regionibus optima

**Nunc Cy** est miscenda theriacæ & aliis medicamen-  
**pria Vene** tis: non autem Libyca, tanquàm omnium  
**tis cõmẽ** præstantissima cum Andromacho. Præ-  
**datur.** stantior est alba, vel carulea, vel colore vi-

tri,

tri, perlucida, odorata, & Terebinthum  
plus referens, qualis quæ ex insulis Cyclo-  
dibus affertur: ob id Chiam quoque terebin-  
thinam laudat Gal. Minus laudata Cypria,  
Syriaca, Iudaica, Arabica, Aphrica. Libyca  
tamen, vt dixi, laudat Andromachus. Quæ  
autem pro Terebintina refina venditur, aut  
Laricea est, aut Abietina.

Inferiores autem Terebintina in dige-  
rendo & attrahendo sunt, pinea, strobilina,  
picea, abietina, laricea, cyparissina, pityna,  
id est, pinea, propriè physma dicitur, libr. 2.  
comp. phar. gen.

Terebinthina mordax asperæ arteriæ &  
ori, initio libro 7. composit. phar. partic.  
ἐν τῷ 7ῷ φάρμακῳ libr. 2. comp. phar. gener. & lib.  
comp. phar. par. sape.

Resinarū mitissimæ sunt Terebinthina *Libr. 1. c.*  
& Larix dicta: aliæ mordent modicè, quæ *phar. gen.*  
dam etiam insigniter. Resinæ Terebin-  
thinæ Larix propemodum similis est, ob id  
illius penuria hac vtendum: illa autem per  
omnia est melior quàm Cōlophonia, &  
quæ Phryctē dicitur, ibidem. Resinæ siue  
Larix siue Terebinthina vocatæ aduersus  
vlcera maligniora magis valent, ibidem.  
καλοφονία καὶ πικρα in emplastro epulotica  
ἀπὸ λαρικῆς vocat, paulò post φρυκτίνην appel-  
lat, libr. 2. composit. ph. gen.

Strobi

Strobilina resinarum longè calidissima, & celerrimè siccans, omnium moderatissima est, utraque qualitate terebinthina.

Pitynon, Phylsema priuatim dictum, genere etiam resina est, multò minùs calida & sicca quàm Strobilina, media harum calore Abietina, liquida tamen diu durat, ut Colophonia, thus redolens, odore suauis, calore, ut Abietina mediocri, quæ à nonnullis sola dicitur Colophonia, nascitur admodum modica, ob id est pretiosa.

Resinæ siccæ pinguis expertes fiunt: ob id emplastra bene adhærentia cōficere non possunt, ut viscosæ & liquidæ.

Humidissima est Larix altera: est enim resina Larix dicta duplex, vna Terebinthinæ omnino similis: altera calidior, liquidior, odoratu grauior & ingratiior, gustu amariior, acrior, mordacior. Quare satis est terebinthinam omnibus medicamentis vlcera rectè curaturis miscere, in quibus curandis præcipuus est scopus non mordere: in comp. ph. gen. *ῥημινθίνῃ πικρῷ μίχῃ* retorrida; lib. 8. comp. ph. part.

Terebinthinam veram è Cypro allatam Venetiis ad me dono misit Ioannes Baptista Opizo, Medicus longè omnium doctissimus, nostræ Laricinæ & Abietinæ affinē, sed infinitis partibus præstantiorem.



## DE GUMMI.



**G**UMMI est lachryma congelata concretâq; in truncis arborum ipsam producentium, veluti resina in multis visitur, quæ resinam proferre possunt. Est autem gummi aquea magis substantia, vt resina oleagina: proinde illud aqueis promptius miscetur, oleaginis ægerrimè, hoc contrà. Eadem flammam concipit, gummi verò in igni crepitar.

**E**X Acacia quadam Aegypti spina (ex cuius semine Acaciam succum, exprimi antè diximus) manat gummi in vermiculorum speciem contractum, vitri modo perlucidum, purum, refrigerat, densat. Huius non meminit Galenus in Acacia lib. 6. simpl. vti nec Acaciæ mentionem facit paulò post in Acantha Aegyptia seu Arabica (quo nomine solo Dioscoridi vocatur) unde colligas licet, Acaciam & Acantham Aegyptiam seu Arabicam diuersas esse in Aegypto spinas arbores. Tamen in lib. comp. phar. part. frequenter leges *λέγμυ* absolute, tragacanthæ coniunctum pro gummi Arabico, quod *λέγμυ* *ἰνδὴν* vocat lib. 7. comp. phar. part. à Thebis opinor Aegypti centifloribus, vti etiam Babylonicum quibusdam dicitur, à Babylone Aegypti Arabiam

*Li. 7. simplic.*

*Li. 7. simplic. in hederâ.*

*Diosc. Gummi Arabicum.*

attingentis. *κομπίδιον ἀραβικόν* perſape Actuarius vocat.

*Dioſcor.*

**A** Mygdalæ amaræ gummi calfacit, astringit, ſanguinem reiicientibus prodeſt, impetigines cum aceto illitum tollit, ruſſi antiquæ medetur, calculoſis prodeſt. Mitius multò eſt, quod ex Amygdala dulci profluir.

*Gummi  
Lacca*

*Dioſco.*

**C** Ancamū lachryma eſt Arabicæ arboris, Myrrhæ quodammodò ſimilis, viroſi guſtus, ad ſuſſimenta uſurpatur, emaciat: lienoloſos, epilepticoſ, aſthmaticoſ iuuat, ad doſoreſ dentium efficacifſimum, menſeſ ciet. Lachan ſape Actuario dicitur paſſim, præcipuè in duplici deſcriptione dia lachan, ubi ſcribit, *λάχαν λυαβαριμύρον* purgatum.

**C** Aphura poſt Dioſcoridiſ, Plinii, Gale-  
ni, Pauli, ſeculum inuenta, Aërio & Actuario, & Simeoni, & Arabiſus celebrata eſt, lachryma Indiçæ arboriſ ferulaceæ quidẽ: ſed maximè frequentibuſ fulgetriſ, tonitribuſ, terræmotibuſ copioſior prone-  
niens. Quæ igni vel ſole ex rubro albefeit, perlucet, friabilis eſt, melior, tenuior, duran-  
tior, quàm craſſa, fuſca, nigra, aſſuliſ ligni ſui implicata. Pani calido impoſita ſi mæde-  
ſcit, ſyncera eſt: ſi areſcit, ſpuria: frigida ſe-

Ca gradu tertio Arabibus dicitur: tamen mistam habet calidam substantiam, acrem, odorem, flammæ ciendæ aptissimam morbos acutos, cephalalgias à calore, phlegmonas præsertim iecoris iuuare refrigerando dicit Simeon ordine non expresso. *λαφρὰ* Aët. & Simeoni, & Aëtio, & inde *ῥαπιδιον λαφρὰτον* Aët. dicitur.

**C**eraso resudans gummi tussi vetustæ comedetur, arterias exasperatas lenit, suo lentore morsus experte, colorem commendat, visum acuit, appetentiam inuitat, calculosis ex vino potum prodest. Quæ facultas essentiæ tenuitatem inesse significat.

Dioscor.

Galen.

Li. 7. sim.

**E**X Elæa, id est, olea Aethiopica & nôstrate inquit Dioscorides, & Italica Plinius, & oleastro lachryma funditur scammonio similis, fulua, stillis exilibus confusâs, mordax. Similis autem hammoniaco, vel gummi, colore nigricans, morsus expers, inutilis. Explora an verum sit officinis.

Gummi e-

lemmi ab

elæa, vel

corruptè

pro enhæ-

mâ Her.

**H**ederæ lachryma est velut aqueus quidam liquor, sicut aliæ omnes lachrymæ. Hæc adeo calidæ est facultatis, ut obturet adurat, lentes & pediculos interimit, pilis caput nudat: illitu enim est psilothrō odoratissima est.

Li. 7. sim.

Dioscor.

*Diosc.* *Libr. 7.* *simpl.* **G**Vinmi Pruni agglutinat, porum in vino calculos frangit, ex aceto quoq; illitum lichenas infantium sanat. Quæ si præstat, clarum est extenuandi ac incidendi facultatem illi inesse.

**I**Uniperi gummi nec Dioscor. nec Galenus memorant, fortè quòd ad nihil sit utile, vt Actuarius, Plinius. Subit verò mirari, cur medicis hodie Arabas secutis, Sandaracha vocetur, & suffitibus propè omnibus misceât, fluxiones à capite prohibentibus: cùm sit calidum, & planta ipsa etiam ymbra, non solo vapore sit grauis. Vernigo dicitur Hermolao, Vernix vulgò, quòd rore verno magis concreascit. Scriptoribus in vsu est multo, & pictoribus.

*Libr. 8.* *simpl.* *Lib. 1.* *6. c. ph. p.* *et 1. com.* *ph. g.* *Li. 8. eiusdem.* **M**Yrrha est arboris Arabicæ lacryma, calida sicca ordine secundo, tenuis essentia, multa amaritudine, terget potenter, tamen sine exasperatione, imò lenit, digerit non ignauiter, sed citra rosionem: siccat valde, tamè sine astrictione: coquit modicè etiam prauos humores, & præter naturam habentes: qua ratione stomachicis in id malum compositis miscetur, sed pauca, & cuius qualitatibus medicamentosa absurditas odoriferis superetur, tamen ea tutius auferri potest. Myrrha rubra Actuarius, *σμύρνα ἀλυσινὴ*, Myrrha verax eidem. Eli-  
gend

genda recens squalore & situ obducta, le-  
uis, tota concolor, & quæ confracta candi-  
das vnguium modo venas, & læues osten-  
dat, glebis minutis, amara, acris, odorata.  
Quapropter colicæ Paccij Antiochi pauca  
myrrha miscetur, quæ odorem tantummo-  
dò præster. Omnibus antefertur Troglody-  
tica, viridis, perlucida, mordax: ab hac se-  
cunda est, tenuis, bdellij modo facilè sub di-  
gito mollescens, odore grauiuscula, apricis  
nascens. Mala nigra, aut colore piceo gra-  
uis, retorrida, præter modum maturitate  
exolera: omnium pessima pingui carens,  
cano situ obducta, acris, ad gummiis imagi-  
nem vergens, & viribus eius proxima. Im-  
probatur à *μυρρία* nomine Dioscoridi: Gale-  
no autem eligitur Troglodytis, quæ & Mi-  
nea dicitur à regione, vbi præstantissimam  
gigni affirmant. Ea gratissimi sit odoris, &  
nullo vitiata liquore. (Vbi Minea, vel vt  
bis lib. 9. comp. ph. part. legitur *μυρραία*, vi-  
detur eadem, quæ Dioscoridi Aminea im-  
probatur) adulteratur enim gummi mace-  
rato aqua, in qua myrrha maduerit. Vera  
enim est rara inuentu, præcipuè syncera:  
nam in optima myrrha opocalpasen inue-  
nitur, ab optima myrrha diuersum, vt in  
galbano sagapenum, in casia cinnamomū,  
& horum aliquid medium quæ à seinuicem

*Lib. 9. c.  
ph. part.  
Dioscor.*

*Libr. 6. c.  
ph. pa. c.  
li 1. am.*



discernere is solus potest qui saepe ea obser-  
uarit, adeò vt ex vna sola nota saepe inter-  
noscat. Nam Sapapenum ex Galbano odo-  
ris hircini speciem retinet: nō habet autem  
proprietaem odoris cuiusdā, vt propriè di-  
ctum Sagapenum. Tamen in hoc sagapeno  
& congenerē galbano parua est differentia  
ad medicamēti compositionē. Ambo enim  
conueniunt, quia aduersantur virulentis &  
deleteris: sed galbanū minùs sagapeno. At  
opocalpason lethale est intra corpus sum-  
ptum: ob id sua etate multos perisse scribit  
Galenus vsu myrrhæ, quæ opocalpason ha-  
bebat, à nonnullis de industria mistū myr-  
rhæ, vt eam redderēt laudatissimam. Nā sic  
mista, collyriisq; indita, pus citra rosionem  
discutit, ac interdum suffusionem incipien-  
tem substantia tenuem, siue ceratū, siue em-  
plastrū, siue aliud medicamentū myrrhā  
opocalpaso mistam recipiēs oculo iniicias.  
Myrrhæ igitur officinarum omnino adul-  
teratæ parum tutus est vsus in sumendis.

*Hacten⁹  
Gal. li. i.  
antid.*

*Syrax li  
quidus.  
Dioscor.*

Myrrha facta, id est, stillatitia ex myr-  
rha recente, pingui, & solo lactiore nata, lar-  
gior exudās cū aqua pauca rūditiur, post ma-  
china exprimitur, colore pallido, amaritudi-  
ne præcipua, odoratissima, & pretiosissima  
res, minima portione efficacissima: eadem  
præstat quæ myrrha, sed efficacius. Huius

fax

**S**ax Styraxtubra dicitur Arabum familia.

**B**ellium est *Δανγρον*, id est, lachryma  
 Arboris Sarracenice, calfacit, mollit, co-  
 quit, discutit mediocriter, hepaticis misce-  
 tur, calculos renum potu fragit, hernias sa-  
 nat. Scythicum est atrius, resinosius, ad emol-  
 liendum efficacius. Arabicum autem est Pe-  
 tra delatum resinosum, liuescens, dilucidius,  
 magis siccans quam emollientia, nisi recens  
 & humidum sit, & quod tundendo facile  
 mollescat. Id enim idem pollet quod Scythi-  
 cum. Tertiū Indicū addit Dioscor. sordidum,  
 nigrum, grandioribus glebis in offas con-  
 uolutum. Optimum est cortice, ligno, sordi-  
 bus carens, ut taurinum gluten translucens,  
 ob id bdellium clarum dicitur, lib. 8. comp.  
 phar. part. odore est marini unguis incen-  
 sum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu  
 subigatur, mollescit: adulteratur gummi,  
 sed id minus est amarum & suffitu odoratum.

*Dioscor.*

*Li. 6. sim.  
 pli. & li.  
 8. c. p. pa.*

*Dioscor.*

**S**tyrax lachryma est arboris Syriacæ, cal-  
 facit, mollit, coquit, tussis, catarrhos, co-  
 ryzas, brachos: menses autem mouet sumptus &  
 admotus. Styraçis drac. vnā miscet Andro-  
 machus arteriace 13. lib. 7. cōp. ph. p. Proba-  
 tur flauus, pinguis, resinosus, sordescens, albi-  
 cantibus grumis. acer admodum & amarus  
 quāplurimū in sua odoris fragrantia perma-

*Li. 8. sim.*

*Dioscor.*

*Libr. 7.  
antid.  
Styrax  
calami-  
tes.*

*Lib. 5. sim-  
pli. ca. 18.*

*Libro 8.  
simpl.*

*Charabe  
Persis, id*

nēs, & qui subactus melleum reddit liquo-  
rem. Deterior niger, furfurosus, friabilis, ca-  
no situ obductus. Adulteratur multis mo-  
dis Dioscoridi: sed dictis notis dolus depre-  
henditur. Styrax iniiciendus theriacæ, qui  
ex Pamphilia in arundinibus affertur: hic  
autem paucissimus est, & tanto discrimine  
à copioso hoc Styrace variat, quantum Fa-  
lernum vinum ab eo, quod in tabernis ven-  
ditur. Tamen illius penuria, huius accipe  
quod calidissimum, & odore & gustu va-  
lentissimum est. Styrax, vt crocus, myrrha,  
quantitate sunt deleteria: nam largius po-  
ta quædam dementât, quædam mortem in-  
ferunt, sed mensura apta aliis mista iuuant.  
*στυράξ σπώνιον*, id est Hispanum cognomi-  
natur Actuar. in trochisco Neapolitæ.

**S** Arcocolla arboris Persicæ lacryma pol-  
lini thuris similis, rufa, emplastica, suba-  
mara, citra morsum, proinde siccatur, & vlce-  
ra glutinat, vnde & nomen commeruit, o-  
culorum fluxiones inhibet, coquit, digerit,  
sed minùs quàm galbanum, lib. 4. comp. ph.  
part. Adulteratur gummi misto, pulueriza-  
ta est suspecta adulterij: vera enim est rara:  
lacte identidem mutato correctâ collyriis  
miscetur.

**S** Vccinum seu Succina gutta à succo di-  
cta, Græcis *ἐλάνισρον* esse lacryma popu-  
li

li albæ, vel etiam nigræ quibusdam videtur, ab eiusdem arboris resina Dioscoridi & Galeno dicta differens, & ὠρίγυρος, id est, paleas trahens, quoque vocatur, quam vim ei quoque Galenus tribuit lib. facult. naturalium: qui tamen esse censuerit: nondum in eo legi. Plinius verò lib. 37. capit. 3. Succinum scribit à quibusdam pinei generis arboribus, ut gummi à cerasis exudare autumno, & largum mitti ex Germania septentrionali, & insulis maris Germanici. quod hodie nobis est compertissimum: adhæc liquata igni valentiore, quia à frigido intensiore concrevit, pineam apertè olet calidum primo gradu, siccum secundo, stomachum roborat, vomitum, nauseam arceat: cordis palpitationi prodest, prauorum humorum generationem prohibet.

**A**mbra autem, seu ἄμβρα, Ambarum seu Ambra Arabū, & Actuarius ac Simeonis recentiorum Græcorum, est odoramenti genus, locis diuersis scaturiens, ut bitumē, sulfur, nobis hodie larga & præstantissima ex littore Aquitanico mittitur, cineritio colore: Indica rufa, pinguis, odorata, quod Succinum oriētale vocat Hermolaus. Est Arabibus & Simeoni prælata Arabicæ subalbæ, & tertiæ præter has nigræ, quæ à piscibus

est, paleas trahens, ambra vulgò in corollis præcarijs frequens.

Ambra grisea.

fontes. Ambaris gustantibus deuorata sit, omniū pessime. Calfacit, humores incidit, ob id stomachicis à quibusdā additur, cor item & caput roborat. Tamen si ante potum odoretur, ebrietatem accelerat, multo magis si vino imponatur.

*Li. 7 sim  
plic.*

**T**Hus est lachryma Arabicæ arboris, calidum ordine secundo, siccum primo, modicè astrigit, terget imbecilliter, coquit phlegmonas, anodynū est & sarcoticū, cicatricem remoratur, emplastri temperaturā iuuat, acribus mistum vehementiam illorū obtundit, pus mouet, quia calidum emplasticum, nullam euidentem astringendi vim sortitum, præcipuè pinguius & albius. Nam flauius siccatur magis. Adulteratur resina picea, & gummi quod non inflammatur, illa autem in fumum abit, thus ardet.

*Libr. 13.  
method.*

Cortex Thuris insigniter astringit, siccatur ordine secundo, crassiorū est partium, quam Thus, minimā habet acrimoniā, ardet igni cū odoris fragrantia. Cortex, verò nucis & pini quo adulteratur, fumaturū, & sine odore.

*Lib. 4. cō.  
ph. par.*

Mannam, seu Mannam thuris (vt libr. 9. comp. ph. par. bis leges) propriè vocant micæ Thuris ex magnis fasciculis cōcussu elisas, à Thure leuigato diuersas. Nā fragmēta quardam exigua corticis thuris ei manne inharēt, à quibus exiguum quiddam astringention



tionis assumpfit, qua differt à Thure quippe quò magis astringit, tamē etiam coquit, lib. 1. comp. ph. part. Manna est thuris purgamētum, leui astrictione præditum, quòd ei corticis thuris paululum sit admistum, lib. 13. meth. Thus enim puris tantum morandi facultatem habet, nullam astringendi vim obtinens præsertim pinguius & albius. Primatū tenet in Thuris genere masculinum, quod *ἄβανον ἀππύον* Actuatio dicitur, suapte natura rotundum, indiuiduum, candidum, cū frangitur intus pingue, in suffitu statim ardens.

**T**Ragacanthos, Tragacantha, vel Tragacāthon, lachryma radicibus incisif Dioscoridi, sponte Theophrasto profluens: vim habet similitē gūmi emplasticā quādam siccantē, acrimoniā leuiorē, arteriæ asperitatē lenit cū vino macerata & leuigata, ut cācani radix, vel in aqua die vno, lib. 7. cōp. ph. p. Tragacanthæ fructus, li. 10. cōp. ph. pa. Tragacātha alba Actuatio sepe. Prestat per lucens. gracilis, lævis, syncera, subdulcis.

Ex plantis quoq; , & aliis quibusdam vicariorum aquam per vaporem educere, neotericū est, vnde Actuatio frequens *πόδι τρυγῶν*, id est, stillatitius rosarum liquor, & *ἰνὸς τρυγῶν* intyborum. De quibus pauca quædam generatim libro tertio dicenda putavi.

Lib. 8. simpli.

Li. 7. simpli. in cancano Dioscorid.

## DE METALLIS.



**M**ETALLICA vim medicamentosam habent magna sui parte maximam, quædam etiam deleteriam, ut coniectura sit magna, ex his vapores caloris interni vi elatos platarum varietatem non parum iuuare. Ne putes massam tantam frustra à Deo maximo conditam, & otiosam, in quibus facultates naturales etiam omnes inesse soli chymistæ testantur, nec meo iudicio malè sentiunt, quod oculus in multis apertè videt: licet plumbo metallorum soli incrementum concedat Galenus.

**A**Vrum metallorum purissimum, pretiosissimum, temperatissimum, in foliola & velut bracteolas percussu multo inter chartas latefcit, eoque vtuntur medici ad naturæ robur, & affectus melancholicos, quanuis in eo principiorum mistio sit firmior, quàm ut à calore nostro possit dissolui. Aequius multò arte chymistica solutum & potabile exhiberent, medicinam latificantem, & in iuuentute corpus conseruantem, si Geboro in metallicis exercitatissimo credimus.

**A**Rgentum similiter foliatum est, quando auri loco vsurpant, solutum & potabile, ut aurum: felicius propinatur, nisi au-

ro esset multò imperfectius atq; impurius.  
Argentum à colore, viuum à motu Latinis  
dicitur, à consistèntia verò Græcis *ἄργυρος*  
*ἄργυρος*, sed hanc arte factam Gal. lib. 9. simp.  
illud minerale vult Hermolaüs: cum tam  
factitium ex minio, quàm minerale, seu in  
argenti fodinarum tectis stillatim concre-  
tum, siue per se in metallis inuentum, Dio-  
scorides hydrargyron appellet. Cui conge-  
ner ex aquæ fontibus vomica perpetua sca-  
turit Plinio. Argentum viuum est metal-  
lorum omnium cum sulfure materia à ca-  
lore tēperatissimo sic per minima vnitum,  
vt siccum humido, & humidum sicco æqua-  
liter in eo temperentur, Geberus. Vnde opi-  
nor, chymistis calore & frigore temperatū  
quoq; dicitur, non quarto gradu cum qui-  
busdam frigidum, cum aliis calidum. Neq;  
contra chymistarum placitum pugnare vi-  
detur, quod scribit Dioscorides, potum vim  
habere perniciousam: suo enim pondere in-  
terna erodere addit, non qualitate aliqua  
caustica. Neque verba Galeni libr. 4. simpli.  
cap. 18. quòd scilicet calore nostro calidum  
actu redditum per erosionem interimit, &  
lib. 5. cap. 18. quòd tota sua substantia nobis  
contrarium sit, & venenū si sumatur: neuter  
enim id aut calore immodico aut frigore  
deleterium dicit; sed ille pondere, hic tota  
sub

substantia, vt scilicet omnino nos ledat nec-  
cessario, quantūuis paucū sit sumptum: cū  
deleteria calore aut frigore sint sola quāti-  
tate deleteria. Adhuc Galenus de sola hy-  
drargyro factitia loquitur, cuius quod inte-  
rimat sumpta vel admota, se periculum fe-  
cisse negat, libr. 9. simplicium. Hodie verò  
vel pueris maximè perspicuum est, maximo  
mortalium incommodo, quas vires sum-  
ptum vel admotum, vel suffitum in scabie  
Hispana, & eius symptomatis & multorum  
artificum vsu vario, habeat argentum hoc  
femiatuum, & crudum quouis modo pa-  
ratum & mistum. Quod verò in mettāl-  
lis perfectis coctum est maximè, id longè  
omnium est efficacissimum, vt & pretiosis-  
simum, si quis secernere, & secreto nouerit  
vti. Illud tamen essentia esse omnium te-  
nuissimæ, indicant apertissimè celerrima  
eius in vaporem præteritū abitio, & in  
corpus quoduis etiam densissimum pene-  
tratio, vt etiam calculum iactilem affrictū  
non ita multo subeat, intusque dealbet, &  
fragilem maximè reddat. Ob id non probo  
ipsum enulato vnguento, & aliis quibus-  
dam misceri. Argentum vitium sublima-  
tum calore ignis erodente iam præditum,  
fit eodem quoq; deleterium, vt calx & vi-  
ni fæx vsta. Sublimandi autem (vt chymi-  
stæ

fre loquuntur) modum docet Geberus, ex quo & aliis non contemnendæ leges, quæ ad cognoscendam plenius argentiviui naturam pertinent.

**L**ithargyros est purgantis se igni materia vitri, seu feruescētis spuma vt scoria iam purgata fax est, ex plumbo molybditis seu molybdena, ex argento ἀργυρίτις, ex auro χρυσίτις omnium optima, præcipuè que foliata est. Lithargyros moderatissimè omnium terreorum siccatur, sine manifesto calore aut frigore, modicè astringit & terget. Eius vsus latissimè patet libris propè omnibus compositionis phar. generalium, maximè 2. & 3. Lithargyros manifestè nec calfacit, nec refrigerat, nec humectat, sed siccatur primo abscessu à temperatis: nullam enim qualitatem manifestam gustatu exhibet: nec emplastica est, nec ecphractica, nec repellit quod influit, nec digerit quod parti inflammatae est infixum, nec vlcera terget, nec expurgat euidenter, nec rodit, nec carne implet, nec eam supercrescentem absumit, parum tamē à mediis ad partium transitum recessit (licet sit tenuioris essētiæ quam molybdena) quam & coctione diuturna deponit fusā vi ignis, & alterata. Ex his enim est medicamentis, quæ tota liquefiunt, vt resina, cera, sed nō mox ubi ignem attā

*Hermolaus.*

*Li. 9. simpli.*

*Lib. 1. cōph. gen.*



attigerit: quæ res multis imponit, eam non fundi putantibus. Cum oxelæo autem cocta citius liquefcit, & cum ærugine quàm cū hydrelæo, vel cœnelæo, & quo plus liquoris ad coquendum habuit, eo glutinantius fit, medicamentum. Melius enim fit ex Lithargyro medicamentum, quod magis coctum erit, quod ex liquidorum, quæ miscentur, copia contingit. Expers tamen pulchrum harum virium Lithargyros, medicamentis miscetur, ut phœnicino, dia calciteos viribus eius nec commodans, nec incommodans, sed materiæ ad emplasti pharmaci compositionem idoneæ rationem obtinet. Cruda etiam per se femorum ex itinere attritus iuvat parum siccando.

Lithargyros absolute, interdum tamen ut in melinis à colore cydonij emplastris Lithargyros *χρυσίτης* dicitur, li. 2. cōp. ph. gen.

*Libr. 4. c.  
phar. par.*

**A** Rrhenicon à vetustis Græcis ab huius ætatis hominibus Arsenicum, Latinis Auripigmentum: in iisdem metallis, ut auro, argento, quibus Sandaracha gignitur: ob id eadem gleba ambo sæpe mista vidimus: optimum existimatur crustosum, *χρυσίον* (sic Galeno 1. libr. & 9. compo. phar. part. & Dioscoridi dicitur) id est, aureo colore micans, nulli materiæ permistum, in

*Dioscor.*

squam

zmmas tāquām bracteolas fissile: alterum globosum, pallidum, & colore Sandaracham imitans. Vrendo multū. sulfur exalat, in argenti speciem fūsum concrefcit, intus rubet, causticū est; crustasq; cum vehementi vredine & violento morfu exat, hyperfarcosin absūmit, astringit, & ro, depilat tam non vstum quām vstum: quod tenuiorum est partium, miscetur differentibus & tergentibus.

Andaracha Arsenico nō solis natalibus, sed etiā tota natura affinis, vt coctione a naturæ videatur hæc Arsenicum vin-  
eid enim vstione Sandaracha fit, vt ce-  
fā trita; mota, probè vsta, in Sandarachā  
toriā abit Vitru. lib. 7. Adhæc Sandara-  
licet rubra sit, aqua tamen soluta luteū *Dioscor.*  
orē intensum facit: floridum autē colo-  
luteum, reddit Arsenicum. Probatur  
, saturation, cinnabaris colore, sulfur vi-  
redolens, friabilis, aliena materia va-  
st Auripigmentū rubrū dicitur Serapio.  
adem chymistis Arsenicum rubrū di-  
r, vt Arsenicū croceū est Auripigmētū.  
nicum autem absolute his est albū na- *Lib. 4. cō.*  
le & fossitium. Risagalū autem (quod *ph. part.*  
ant) in genere est Arsenici in iisdem fo *Lib. 2. c*  
inuētum. Exedunt Arsenicum sanda- *ph. gen.*

rachæ, Petræ Alie flos. Arsenicum & Sandaracha & chalcitis vsta. emplastro reddūt flauas vel rufas.

Sandarachæ drach. semissem, & alumen scissile & rotundum miscet Andromachus stomachicis, lib. 6. comp. ph. part. & misyos Cyprij drach. 8. apud quosdam legi scribit, ibidem. Vide necum Arabibus Sandaracham voces gummi iuniperi, néve vires illius huic attribuas.

*Li. 9. sim-  
plic.  
Diosc.*

**A**Es vstum astringit, reprimit, acre est: ob id tenuat, trahit, vlcera purgat, fect, cicatricem inducit carni dure, in molli lauandum probatur rubrum, contritu cinnabarin colore imitans: nigrum verò plusquam decet exustum est.

*Diosc.  
Li. 9. sim-  
plic.*

Squāma æris vi & ictibus ex clauis & panibus æreis excussa, astringit, reprimit, renuat, rodit, mordet carnē, detrahit, & liquat. Probatur crassa, rufa, præsertim æruginosa.

*Diosc.*

Flos æris fit, cū in fornace fusum in receptacula delabitur per canales, ministris aquam clarissimā vt refrigeretur affundentibus: quādo flos subitō exilit, milij effigie, brevis, grauis, splendens: cū teritur, rufus, friabilis, multū astringit & mordet, tenuioris essentia, & magis tergentis quam æs

*Li. 9. sim.* vstum, & squamma æris. Adulteratur æris squam

amma aut limatura.

Iphryges, quasi bis tostum, est perfecti aeris velut fax subsidens & cohaesimae fornacum parti, tanquam vstus in foco lignorum cinis, ablato ere vi-  
Duobus aliis modis fit Dioscoridi & modice & astringit, & acris est, ut acrius, vehementer ficit, ulcera rebelia, ochra vsta adulteratur.

*Gal.li.9.  
simpli.*

Coria est omnium metallorum spurcilla, recementumque & velut stercus: sic sed omnium maxime Scoria ferri la-  
me trita.

Erugo est aeris velut rubigo in aereis vasis, laminis, squammis, scobibus, labus coepta decem diebus aceti acerri apore, aut acescentium vinaceorum con-  
post decussa vel derasa. Est acris, mordet, liquat carnem, etiam dura, di-  
vehementer ficit. Adulterandi & a-  
ratam noscendi rationem a Dioscori-  
aditam sciens omitto, quod larga eius  
ere copia toti Gallie a mulieribus Mo-  
lanis suppeditetur. Aerugo vsta (&  
neruo vulnerato prodest, non vsta au-  
iusto est mordacior.

*Viride  
aeris.*

*Verderis  
vulgo, vel  
Verdet.*

*Li.9. sim-  
pli. & lib.  
6. co. ph. p.*

*Li.3. cep.  
ph. gen.*

*Lib. 4. cō.  
ph. part.*

*Lib. 9. sim-  
plic.*

*Lib. 6. cō.  
ph. part.*

*Lib. 3. cō.  
ph. part.*

**C**halcanthus, hic aut hæc, vel hoc Chalcantum, essentia est eiusdem & naturæ cum Chalciti: hæc autē nativa est, illud ex hac factitium, & in hanc tandem per se rediens: vehementissimè astringit, & calfacit non instrenuè, putridis vlceribus congruit, gargareonem etiam scirrhotentatum irritat. Adhæc quum medicamentum id est vehementissimum, validis vtrisque viribus astringendi & calfaciendi præditum, vitanda eius per se vehementia, sed mitioribus mistis obtundenda. Vstum verò & lotum multò moderatius redditur, lib. 4. comp. phar. part.

*Li. 9. sim-  
plic.*

**S**ori, Chalcitis, Misy, acria, vrëdo escharas excitant, & non nihil astringunt, essentia consistentia, & situ differunt. Nam Sori in fodina infimum ac crassissimū: & quia lapidosius ac vehementius cōpactum, in humore nō liquefcit, friādō nigrius ceu melanteria apparet, ac scintillat vt Misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue est Diosco. Misy grumosum & frustulosum magis est durum, auro simile, quod friando auri colorem imitatur, & stellæ modo splēdet. Dioscor. summum & tenuissimum, & à calore ingenito magis elaboratū, & siccius. Proinde ægrius liquefcit, & corporibus duris admo-

*Lib. 9. sim-  
plic.*



notum ob tenuitatem minùs ea mor-  
 ,quàm Chalcitis, tametsi æquè calidū.  
 dem ratione Chalcitis vsta minùs mor-  
 at, & minùs astringit, non minùs tamen  
 eat. Chalcitis situ & essentia est me-  
 , ari similis, friabilis, nō lapidosa, prom-  
 sime liquefcit. ea vsta melior est quàm  
 n vsta: quia tenuiore est substantia, vt  
 omnia vsta, non tamen acriore, quod  
 s multis vstis accidit. Vsta autē omnia  
 ando mitiora & minùs mordacia eua-  
 nt. Soreos pars extrema & summa in  
 lcitin, & chalciteos partes extremæ in  
 sy tandem transeunt: in metallica fodi-  
 & quo loco seruatur, quomodo ari in-  
 citur ærugo. Hæc Sori, Chalcitis, Misy  
 enter tergent, Misy etiam modicè par-  
 ps est facultatis exedentis. Chalci-  
 cruda mordax est, vim autem eius vren-  
 minuimus, idonea est columellæ in-  
 mmata, quando vehementer inuetera-  
 & curatu contumax est. Chalcitis vsta  
 eligenda, quæ vrēdo cineritia euaserit,  
 n ὡς ποτὲ αἴνεται, qualis vstione fit à multis,  
 odus vrendi in Diosc. Chalcitis vsta  
 n minùs efficax, sed minus mordax.

Admia est corpus racematim & dense  
 , concretū in rudibus ferreis, ex fuligi-  
 eris in fornacibus candentis egesta sta-

*Diosc.  
Gal.*

*Lib. 4. cō.  
ph. part.*

*Lib. 6. cō.  
ph. part.*

*Libr. 1. cō.  
ph. gen. &  
in Theria-  
ce.*

*Diosc.*

tu, & lateribus camerisq; fornacum ferratis inhaerente: est colore spodij, fractaq;, cinerulenta, & aruginosa, quæ optima est. Fit etiam ex argenti terra, & cocto lapide Pyrite. Siccat vt terrena omnia, mediocriter terget, igneæ facultatis & mordētis aliquid habet, quam lauatio adimit, vlcera carne implet in carne molli. Melior & tenuior botrytis, id est, racemosa in summo collecta, quam placitis, id est, crustacia in imo & lateribus. Cadmia etiam lapis est in montibus & riuis Cypræ repertus, alia omni cadmia multò efficacior, inuentu rarus. Lapide calaminari dicto hodie æs tingunt ex rubido in albidum, quo lebetes ferè fiunt.

*Diosc.*

**D**Um æs perficitur detrита cadmia cumulatius inspersa fauilla in cameram integrā effertur tenuissima, quæ in Pompholygē ceu bullas quasdam coit: fit & sine ære ex solis cadmiæ fragmentis in ignē coniectis & perflatis. Ea dum fit, quæ excrementi portio in pauimentum repercussa recidit, Spodos est, seu spodium, grauius, & impurius, & minùs efficax Pompholyge. *Pompholyx* lota omniū propè citra morsum siccantium præstantissima, ad vlcera ob id cancrofa, & alia maligna, & oculorum fluxiones efficacissima.

*Li. 9. simplic.*

Plum

Lumbum frigidum humidum, ob id liquor quiuis frigidus (vt oleum omphacum, rosaceum, mælinum, myrtinū. seminiui, coryledonis, intybi, lactucæ succi) in mortario plumbeo, pistillo plumbeo ductus dum crassescat, seipso frigidior fit, optimumq; fit remedium phlegmum incipiētium, & fluxionum aliarum inguina, pedes, articulos alios, & vlcerum rebellium, & cancrorū. Lamina plumbis instrata veneris insomnia sedat, anglia diffecat illigata. Plumbum vstum totum vlcera rebellia, charonia cancro carne implet, ac cicatrice regit.

**A** Olybdena substantiæ est crassioris & frigidioris, quàm Lithargyros, nõ get tamē, cætera vsum habet propè eum in emplastris, licet varium colorem erant. Ambo liquantur tardius cum hyaleo, celerrimè oxelæo.

**C** Erusa aceti acris vi ex plumbō soluta refrigerat, siccatur, astringit, emplasticum est, candefacit, hæc lota plumbō vsto viribus proxima: vsta transit in Sancta, fitque tenuior, nondum calfaciens, Lycos cerussæ frigiditate seruata tenuiorem assumpsit, qua vis eius adiuta in fundum corporis penetrat. Cerussa hodiaca, vel illi similis ex ciuitate Di-

*Li. I. cōp.*

*ph. g.*

*Li. 9. simp.*

*ph. c.*

*Li. 9. simp.*

*ph. c.*

*Lib. I. cō.*

*ph. p.*

*Ga. lib. I.*

*c. ph. gen.*

*Lib. 4. cō. ph. part.* cæarchia olim dicta, nunc Puteolis: præfer-  
tur si emplastrum vis eximiè candidum fie-  
ri, quia albidior, leuior, tenuiorum partium  
his, quæ alibi nascuntur. Sal ex Cerussa ad  
multa efficacissimus, & oleum ex Cerussa.

*Li. 9. sim-  
plic.* Sulfur omne calidum, tenuis essentia, tra-  
hit, terget: saliuæ, vel lotio, vel oleo vete-  
ri, vel melle, vel terebinthina exceptum, ve-  
nenaris ictibus impositum sanat Psoras, le-  
pras, lichenas cum terebinthina tergēdo &  
dissipādo per sanat. Nobilissimum est *ἀπυ-  
ρον*, id est, viuum, & ignem non expertum:  
ignem expertum quo virentius, oleosius,  
pinguius, eo melius. Ex Sulfure oleū chy-  
mistis efficacissimum trahitur, fumo eius  
ardentis in campanam vitream recepto, in  
oleum concreto, & in catinum subiectum  
destillante: sed quia ex multo sulfure pau-  
cum ascendit, pretiosum est: fit & aliter.

Sulfur idem sublimando (vt illi appel-  
lant) purgatissimum & clementissimum ef-  
ficiūt, etiam pretiosum eadē de causa. Cu-  
ius vsum non est quod vereare quorundam  
imperitorum exemplo: cum Galenus viuū  
Sulfur impurissimum diamoro stomachico  
medicamento ad digerendū misceat, bis li.

*Lib. 1. cō. ph. part.* 6. comp. ph. p. Nocet Sulfur achoribus: quia  
plus quàm par est, eos calfacit, & digerit.

Alum

Lumen ab astrictione vehementissi-  
 ma Græcis *συνήγρια* dicitur, crassarū  
 partium, maximè liquidum, & Placites  
 Plinthites dictum à crustæ & lateris for-  
 : minus strongylon & astragalotes, id  
 rotondum in astragali modum: mini-  
 m schistum, id est, scissile non in fila sed  
 itis friabile. Omne alumen in aqua sol-  
 ur, & igni liquecit, tardiùs scissile, quod  
 e bullis tandem mollescit, idem aquæ in-  
 at, linguæ & cuti integræ est mordacissi-  
 m, adulteratur segmentis lapidis amiā-  
 sed hæc acrimonia carent, & ex pingui  
 quo ardent rediuiuo corpore, aqua mer-  
 ntur, & integra manent, in filâq; dissi-  
 nt. Alumen scissile colore candidum &  
 stâtissimum, idem tenuius & vtilius, lib.  
 omp. ph. part. Et quia rarum inuentu,  
 us: liquidum contrâ, crassum & vilissi-  
 pretij, quia in omnibus regionibus in-  
 tu est facillimum, lib. eodem sexto.

*Lib. I. cō.  
 ph. gen.*

Puma nitri, aphronitrum, nitrum, poten-  
 ter tergēt cuti affricta: sit autem nitrum  
 enuibus partibus constans: quod autem  
 dosum est, vrendum ac diligenter leui-  
 dum. *ἀφρόνιτρον*, seu *νίτρον*, id est, Spu-  
 nitri ab Aphronitro differt, (sic *χαλκοῦ*  
 & *ἀκακάνθω*, & *ἀκάνθη λιγκὴ ἀλιγκ-*



*nārvn*, & multa alia similiter) illa enim alba est farinæ triticæ similis, eiusdem cum nitro facultatis & naturæ, sed essentia tenuioris: hæc autem in glebas coactum & congelatū, amarum, in balneis sordes terget, & ichoras pruritus excitantes digerit. Nitrum præsertim bernicium, seu beconiceum potius. libr. 8. Meth. siccatur, digerit: sumptum autem in corpus incidit, tenuat crassos & lentos humores multo potentius quam sal: amarum enim est, cap. 3. lib. 4. simpl. vltum verò tenuitatem substantiæ adeptum spumæ nitri proximum est.

*Ga. in dio  
spolitico.  
Lib. 4. fa-  
nit. tuen.*

Nitrum rubrū libr. 9. comp. ph. part. Aphronitrum magis quàm hæc incidit, stomacho inimicum est, ob id non deuoratur, nisi grauis vrgeat necessitas. Nitrum verò sumitur, & aluum subducit. Omnia hæc hodie desiderantur, quorum loco supponunt officinæ salem petreæ purgatum, in panes coactum. Id mentiri satius esset cineribus betæ, brassicæ, & aliorum nitroforum.

*Li. 9. sim-  
plic.*

**S**AL, tam fossitius, vulgò sal gēme, quàm marinus, terget, astringit modicè, validè liccat, digerit, libr. 6. composit. ph. part.

*Lib. 6. cō.  
ph. part.*

Per se, & cum galla læui attractu iuuat gargareonem inflammatum iam durescētem in scirrhum: non autem in initio, neque dum augebit

gescit, aut cū multo calore viget: quod corpus sit plethoricum, aut saltem caput enum, si initio adhibetur inflammato garreoni, extrema laboranti noxa inferitur.

Sal astringit magis quā tergeat, siccatur non minus quā nitrum, aut nitri

*Lib. 2. cē.*

*ph. gene.*

ma: sed hæc non astringunt, ob id ceram mixta vlcerum sordes tergent: Sal obstrictionem id non præstat. Sal Arme-

*Li. 9. sim.*

ncus terget, subacer est, leuissimè astringit, humores acres in superciliis inspersus consumit, à quibus pili male nutriti ex-  
lunt.

Hammoniaco sali similem forma schism lapidem docet Discorides. Sal Hammoniacus valenter digerit, libr. 6. composi-  
ar. part. noster tam nigricās quā albi-  
us factitius est.

Timmi, id est, Stibium siccatur, astringit, Antimonium.

*Antimonium.*

oculorum collyriis liquidis & siccis mi-  
tur, illotum valenter astringit, lotū sol-

*Li. 9. sim.*

ur, & naturam essequitur propè rofionis  
perrem, fossitium melius: Quod enim e-

ndunt, igni coctum est, idque purius, vel  
ulentius & scoriosum. Oleum ex Stibio

*Lib. 6. sa-*

triosissimum. Mulieres oculis gratiam  
bio conciliant, ipsum palpebris specillo

*nit. tuend.*

ucentes quotidie, sic ne oculi membra-  
n intus contingant.

Chry

*Li.9. simplic.*

**C**hrysocolle tam metallica quam factitia, valenter digerit, & siccatur, carnem liquat sine valenti morfu. Chrysocolle, Spodium, Pompholyx, Psoricum, metallica sunt admodum tenuis essentiae citra calorem. Nostra omnis est factitia, aurique ferrumini fundendo celeritatem addit, unde illi nomen.

*Lib.3. cõph. gen.*

*Li.9. simplic.*

**G**ypsum siccatur, ut cætera terrea, emplasticum est: cogitur enim ac lapidescit liquore aliquo ut albumine maceratum, sanguinis eruptionem cohibet, cum tenui farina pilis leporum vel similiter mollibus exceptum: vltimum minus est emplasticum, tenuium partium, siccus est, ex oxycrato repellit. Nostrum verò Gypsum, uti calx, vrendo emplasticum magis euadit.

*Ibidem.*

**P**umex sarcoticis miscetur, dentes polit, facultate deterforia, & asperitate, ut smiris, testæ, cornua animalium vsta: vltus tenuiorum fit partium, & acrimoniam sumit, quam lotionem deponit. Nunc scriptoribus propè solis ad papyrus exoliendam cum gummi iuniperi est vsui.

*Ibidem.*

**C**yanus hic aut hæc, acer est, cathæreticus, id est detrahens, digerit potentius quam Cinnabari, & subastringit. Vim purgantem melancholicam supra & infra, ac melancholico

melancholicum succū ipsi illoto præbet Me-  
 es communem cū lapide Armeno, ob id  
 ambos valere cēset aduersus omnes melan-  
 cholicos affectus, maniam, melancholiam,  
 epilepsiam alteram, elephantiam, cancos,  
 ophos nigros, quartanas, hæmorrhoidas.  
 & alias ei vires miras tribuit, vocatq;  
 lapidē lazuli & stellatum, quod velut stel-  
 lę quędam aureę in eius fracturis cernan-  
 tur. Is vrendo cęruleus magis euadit, si  
 rursus est: malus verò nigricat vstione. Tam-  
 en quàm sequens nostratibus medicis in-  
 uentus hodie sunt rarissimo.

Armenius lapis illotus suprà & infrà  
 atram bilē vacuat datus à drach. vna  
 scrup. quatuor: lotus autē etiam quinq;  
 scrup. tutior est, ac tantū infrà vacuat à scrup.  
 quinque ad scrup. sex. Alexander Trallia-  
 nus in melancholia, & post eum Mesues in  
 epilepsia.

Antalem lapidem addunt, quī dēs pi-  
 scis alicuius videtur forma & interna  
 similitudine. Antalem addunt nescio quem, &  
 sic dictum.

Alex viua vehemēter vrit, adeò vt cru-  
 stas efficiat, & mox vbi est extincta.  
 si diu extincta non est caustica ampliùs,  
 calida sicca: carnem tamen liquat: lota  
 quater sine morſu strenuè ficcatur.

## DE LAPIDIBVS.

*Galen.*  
*Li. 9. sim.*  
*& lib. 10*  
*cō. ph. par*



**L**APIDES in spōgiis reperti, tri-  
 ti, ex vino poti, lapides renum  
 rūpunt, non autē vesicæ, quia te-  
 nuioris sunt essentiæ sine insigni  
 calore. Velicæ autem calculos rumpere scri-  
 bit Dioscorides, si ex vino bibantur.

*Li. 9. sim.*

**I**Aspis virens stomachum & ventriculum  
 tactu suo inuat. Omnes Iaspidum spe-  
 cies femoribus appensa partum accelerare  
 traduntur Dioscor.

*Li. 9. sim.*

**S**Apphyrus potus ictos à scorpione iuuare  
 creditur, intestinas vlcerationes potu e-  
 mendat, Dioscor.

*Lib. 9.*

**L**apis Iudaicus, qui in Iudæa nascitur le-  
 uissimè tritus potus renum lapides frā-  
 git, ad lunt quidam & vesicæ. Pueris datus  
 cū lacte, vrinalia & intestina purgat. Est no-  
 bis multus Dios. elegātem picturā explens.

*Li. 9. sim.*

*Geet Gal*  
*lis.*

**G**Agates lapis colore atro, odore dū v-  
 ritur bituminis. siccatur, glutinat, dige-  
 tit ad motus, in corollis precariis & salinis  
 frequens.

*Li. 9. sim.*

**M**Agnes siccatur hæmatitæ modo, & a-  
 stringit, ad enterocelen vtiliter sumi-  
 tur, & adinuetur. Magni est miraculi in  
 eo tanquā mundo aliquo polorum cœli  
 rationem inesse.

Hama



**H**æmatites à sanguinis colore dict<sup>9</sup> frigidus, astringēs, excreſcētia reprimi, oculorū vulnera perſanat, ſanguinis expulſionivalet: ſiccāt humores, ſed minūſ quāmadmīa. Nam ex humida ſubſtātia non terreſtri conſtat, & ſuper cotem medicā cum liquore tritus, in ſuccū ſoluitur: per ſe verò in corpus ſimilare minuitur, vt ſchiſtus lapidis, non in fragmenta terreſtria, vt cadmīa.

**S**chiſtus lapis hæmatitæ vim habet perſimilem, ſed infirmiore.

**S**miris terget, dentes puros in dentiſcicio efficit, & eo annularij ſcalptores expurgāt lapides: ad erodēdū & vrēdū vtilis. Nūc in vſu eſt vitrariis laminas vitreas diuiſuris.

**P**yrites lapis de quo æs perſcitur, æris aſpectu ſcītillas leui percuſſu edēs: cruſtus & coctus calfacit, terget, digerit. Valide autem eſt facultatis, Gal. lib. 9. ſimpl. Marcaſita æris quibuſdam dicta putatur.

**E**cote Naxia quod exacuendo ferro deterritur, illitum alopecias ad pilum reſcit Dioſcorides.

**P**ropus lapillus, id eſt, Rubinus, plurimus eſt in inſula maris Indici dicta Zaylon, Ludouicus Romanus Patritius.

**E**ranus lapillus in Euphrate inuentus, Turchica vulgò, Ludouicus Romanus Patritius.

Corall

**C**orallus lapis Actu. dicitur, *καὶ θόλιον ὁ ἄλλος*.  
 aliqui vocarunt, fruticis forma cinna-  
 momi æmulus, crescit ad promontoria in  
 mari, astringit & refrigerat, contra sangui-  
 nis reiectiones magnopere efficax. Rubrū  
 & nigrum tātum facit. Dioscorides, albus  
 tamen etiam visitur citra vstionem.

Lapis

Aquila.

**A**etites lapis veluti prægna's, cū qua-  
 titur alio in vtero sonāte, grauidis cō-  
 tinet partus, Diosc. Id vsu quotidiano pro-  
 batū Gallis est sursum alligātibus: cū ve-  
 rò partū iuuare volūt, fœminibus adhibēt,  
 tanquā fœtū ad se trahat, vbi vbi fuerit.

**A**mianthus lapis ē Cypri alumini scis-  
 sili similis, quiq; pro eo propriè solus  
 venditur. Ex hoc telæ contextæ flammis  
 iniectæ ardēt, sed flammis inuictæ splen-  
 didiores exeunt. Ellychnij loco hodie ad  
 ostentationem lychniis adhibent, & ob id  
 Ellychnium immortale vocant. *Menche  
 sans fin.*

**S**igillum Lemnium efficacius sanguinis  
 ex quauis parte eruptiones cohibet, quā  
 Samius Aster: hic contrā tenax & viscosior,  
 quā Lemnia terra: ambo moderatē ter-  
 gent. Lemniæ etiam adstrictio quēdam in-  
 est. *μίαντ & λίμνια*, lib. 7. comp. phar. part. in  
 arteriace 14. Andromachi. Ea nobis est ve-  
 ra Constantinopoli delata.

Cimolia

**C**imolia terra digerit, siccat sine morfu, maximè si elota sit. Eius loco vtimur hodie ferri & molæ retrimētis in subditam aquam congestis, quod à Cimolo insula è Cycladibus vna non afferatur.

**C**retica terra admodum imbecilla est, multum aëriæ habet substantiæ, terget sine morfu, ob id vasa argētea etiam polit. Creta nobis hodie dicitur.

**A**rmēnia terra colore pallido vel luteo, *Li. 9. sim.* promptissimè in summum leuorem calcis modo soluitur pistillo, aut quouis liquore mista, arenosa substantia caret, summè siccat: ob id est optima sāguinis expuitioni, dysenterię, vētris fluori, catarrhis & fluxionibus à capite in thoracem, & inde nascenti asthmati, & phthoæ, quia vlc<sup>o</sup> in ea siccat, & tussim sedat: vlceribus etiā putribus oris, fistulis ani remedio est. Et in pestilentia Romæ maxima, quotquot bolum hanc Armeniam biberunt, celeriter curati sunt. Quibus autem, vtpote incurabilibus, non profuit, omnes interiere, à nullo alio adiuti. Bibenda ex vino albo consistentia tenui, modicè diluto, si aut planè feбри careant, aut ea leuis sit: sin grauis sit, multum diluto: quam pestilens parum calet. βῶλ & ἀρμένια & πῶλον, id est lutum, ἀρμενικόν Actuario sape.

Lib. I. cō.  
ph. gen.  
li. II. sim.

**A** Sphaltos hic aut hæc, lib. I. antidoto-  
rum, id est, bitumen, verū est nigrum  
& splendescens: dum aquis innatat, molle:  
cū siccatum est, pice sicca durius efficitur:  
calfacit, siccat ordine secūdo. Optimum est,  
ex mari mortuo, stagno salso in Cœlosyria.

Ioannem Baptistam Montanum Veronensem medicum egregiam nauare operā in medicamentis metallicis etiam arte chymistica parandis, Simon Thomas medicus longè doctissimus Georgij de Selue Vau-rens Episcopi vnde quaque absolutissimi affirmavit.

## DE ANIMALIBVS, ET

### eorum partibus.



**S**ANGVIS hirci quadrimi, bene  
habiti, aliquandiu nutriti vino  
albo, fœniculo, fœseli, lauro, &  
cæteris calculum frangentibus  
Augusto mense iugulati, medius effluens  
(nā prius tenuior, postremus crassior pu-  
tatur) vase vitreo receptus, tectus, linteo ra-  
ro, sole siccatus, etiam cum myrrha, foliis  
lauri, & similibus, calculum potenter fran-  
gere dicitur Tralliano, Auicennæ, & cæteris  
practicis. Huic quandiu ab animali caler,  
coquēdi abscessus vim tantū tribuit, Gal-  
lib.

lib. 10. simplic. qualem caprino, taurino, & cæteris calidis humidis modicè. Quòd si hircinus sanguis adamantem frangit, sed calidus tantum ab animali: sic lapidem calidus tantum epotus fregerit. Quod & sanguinem vulpinum ex vena secta potum præstare audio. Ne autem coaguletur, Xenocratis exemplo, miscere possis acetum feruefactum aut coagulum. Hirci quoque, capri, cerui, leporis, sanguinem sartagine frixum, dysenterias & celiacorum profluuium sistere tantum docet Dioscorides, nõ addit calculum frangere, quæ vis tenuibus conuenit, cum dictorum animalium sanguis substantia crassa & terrea, & cum calore ficcatoria dysenterias sanat. Sanguis ex secta vena sinistra profluens lieni affecto infricatur Archigeni, lib. 9. comp. ph. part.

Sanguis Draconis veterum, & Cinnabaris vera, hodie ignorantur: qui verò sanguis draconis ostenditur, factitius est ex sanguine hirci, bolo Armenia, & succo sorborum, vel aliis. Quo tamen rectius vti possis, quàm cinnabrio neotericorum, ex sulfure viuo, & argento viuo simul vstis, loco cinnabaris Græcorum, quæ vires habebat easdè cum hæmatite lapide, & tam rara erat etiam ætate Dioscoridis, vt versicoloribus pictorum lineis vix satisfaceret.

*Gale. lib. 10. in sã. vespertilionis.*

*δράκωντος  
aut δὲ α-  
κόντισιονος  
αὐμινον  
αἷμα.  
A&.*



*Lib. 10. si.* **L**ac lauat, terget serò, emplasticum est  
*Lib. 7. cõ.* Butyro & caseo: ob hæc acres & mor-  
*ph. part.* daces fluxiones obtundit, recens vtendum.  
*Lib. 5. cõ.* Butyrum, & Caseus etiã veterata vsurpan-  
*ph. part.* tur. Butyrum etiam minimũ terget, vt deco-  
*& lib. 11.* ctum glycyrrhizæ: coquit item & digerit,  
*simpl. de le* bubonas, parotidas, oris phlegmonas in  
*poris cere-* pueris & mulieribus, gingiuas puerorum  
*bro.* cum dolore dentientium crebro illitu te-  
 nuat, quantum mel: idem lacti canino, & le-  
 poris cerebello tribuit Archigenes. Expui-  
 tionem Butyrum promouet (maximè cum  
 melle aut saccharo) in pleuritide & peri-  
 pneumonia, quos affectus etiam coquit.

Caseus recens refrigerat, repellit, siccatur, vulnera etiam magna glutinat. Ex vetustate verò acer, cum pernæ decocto subactus tophos eliquat & aperit.

Coagulum omne ex lactis in ventriculo primo corruptione acre, digerit, siccatur. Lac aut sanguinem in vetriculo coagulatum dissoluit: leporinum omnium est praestantissimum.

*Aph. 19.* Quia igitur menses immodicos cum Pra-  
*lib. 5.* cticis & Medicorum vulgò queat sistere, cum calidum sit vitandum, ubi sanguis fluit, aut fluxurus est?

*Ga. li. 11.* **A**deps seu Pinguedo omnis calfacit, hu-  
*simpl.* mectat magis vel minus, pro varia ani-  
 maliũ natura. Leoninus calidissimus siccissi-  
 mus,

mus, id est: minimum humidus: potētissimè  
 omniū digerit ob acrem multāque calidi-  
 tatem, & partium tenuitatem, ob id scirrhis  
 & inueteratis tumoribus tantum aptus. Par-  
 dinus ei proximus, pardino vrsinus, tauri-  
 nus vrsino vicinus, sed tanto quā suillus  
 calidior siccior, quanto minùs leonino est  
 calidus siccus: ab vtroque enim ex æquo di-  
 stat in amborum medio cōstitutus. Suillus  
 autem omnium propè humidissimus. Capri-  
 nus, præcipuè hircinus, crassior taurino, ob  
 id celerrimè concrescit. Inter taurinum &  
 suillum fuerint vulpinus alopecias sanans,  
 caninus, melinus, felinus, cuniculinus, came-  
 linus, equinus, vaccinus, vitulinus. Anseri-  
 nus maximè tenuium partium, ob id in vo-  
 lucrum genere præstat ad scirrhi curationē:  
 gallinaceus illi proximus. Adeps humanus  
 omnium est temperatissimus. Idem vetu-  
 state calidiores & sicciores euadunt, vt ole-  
 um, mel, vinū. Reponitur aut incuratus, lo-  
 tus, siccatus in vmbra, vel exemptis pellicu-  
 lis fusus sole vel igni in vase duplici. Adeps  
 cerui nullo medicamentorum mollienti-  
 um est inferior, lib. i. comp. phar. gen.

*Lib. 2. ad  
 Glauco-  
 nem.*

**M** Edulla calfacit, rarefacit, emollit, *Gal. lib. ii. simpl.*  
 scirrhos quarumvis partium, præci-  
 puè ceruina, & post hanc vitulina. Taurina,  
 hircina acrior & siccior est. Recens utili-

or est, sed etiā reponitur, vt adeps. Vtraque fumatur hyeme, vel æstatis exitu, cū appetit autumnus, Dioscor. Loco sicco & edito, & septentrionem spectanti reponitur, cum foliis lauri siccis, ne putrescant, aut situm ducant: quæ iniuria in locis humidis meridiem spectantibus eis accidit. sunt qui reponant bifariam adipum modo.

**C**erebella Passerum vere vel autumnocaptorum, prolificis remediis miscentur, vel recentia, vel cum vitello oui & melle, siccata sole vel cinere calido.

li. II. sim.

**O**ssa præcipuè humana vsta admodū digerūt & siccant. Eadē nescientibus ne auersentur, pota epilepticos & arthriticos multos sanarūt. Sed epileptico os bregmatis, arthritico articulorū ossa exhibendum cēsent practici, sexu etiā obseruato. Os crani humani donec albescat vstum potum epilepticis succurrere hodie est certissimum.

Ari. ca.

4. lib. 3. de

par. ani.

Ga. li. 6.

vsus par-

tium.

Os à corde cerui humanū cor totius substantiæ similitudine roborare Actuarius cū Arabibus consentit: sed ab aliorum animalium maiorum corde potius fuerint, quæ tam multa proferūt pharmacopolæ, quàm à corde cerui. An verò cartilaginosa hæc substantia magis præstare id queat, quàm cordis aut arteriarum corpus, ipsi viderint.

Os sepiæ dentificiis aptissimum.

Ebur

**E**bur tota substantia cor roborare, & conceptum iuuare, practicis scribitur, frigidum siccum primo gradu.

**C**ornibus cerui & capre vstis, & (si opus est) loris vtimur ad dentium candorē, gingiuas mollicie fluidas, dysenteriam, fluxiones in oculos, oculorum vlcera, quia tergent sine rosione: tamen nec dōlorem leuiunt, nec coquunt quia frigida sicca. *Li. II. sim pli. Libr. 4. c. phar. par.*

**C**ornu Rhinocerotis hodie frequenter vtimur contra diuitum affectus pestilentes, aut venenosos, aut dysentericos, & puerorū nobiliū lumbricos, magno enim ob raritatem emitur. Quin & aqua, in qua huius cornu portio aliquandiu maduertit, pota idem præstare probatissimum est.

**M**umia nomē & res barbara, hominū scilicet liquamē aloē, myrrha, balsamo in sepulchris cōditorū, calida sicca tertio gradu, astringit. Serapionis autē Mumia est Pissaspalthus, id est, pix cum bitumine Iudaico, quia hæc duo redolet Dioscoridi.

**T**unicam interiorē ventriculi secundī gallinarum miro quodā modo lorā & siccāt ī & potam stomachicis augere coquendi facultatem: & ventrē mergi, vel recentē elixum vel siccātū & sumptū, falsum

*Li. II. sim  
plic.*

esse expertus est Galenus. Vnde subit admirari in ea heresi falsa medicos omnes etiam hodie permanere. Putant, opinor, eam vim illi esse, quod ea similis sit tunicae internae ventriculi nostri, sed vi tanta coquendi praedita, ut lapillos conficiat: sed æquius fuerit, eam tunicam ex struthiocamelo sumere, quippe cui mira sit natura coquendi, quæ sine delectu deuorant, ut ferrum & ossa veruecum integra. Vnde & pelles eorum cum plumis mollioribus concinnatas stomachicis applicant. An non vident harum pellicularum temperamentum vitari siccatione, & vim illam coquendi viuis inesse, non superesse mortuis: nec fortasse pellibus illis insitum, sed potius à carne multa crassa, densa, pelliculam hanc vndique ambiente.

*Libro II.  
simpl.*

**I**Ecur lupi in medicamentum ex eupatorio hepaticum saepe indidi, nec multò efficacius ob id comperi. Hepaticos tamen ipsum tota substantia iuuare sufficientem se habere experientiam scribit lib. 8. comp. phar. part. Puluerem quoque ex eo in hydropo cum vino albo in dies aliquot mane potum, inter secreta quædam remedia reponunt nonnulli.

Hepar tamen vulpis aridum ex oxymelite potum splenicis imperat Archigenes  
apud



apud Galenum, lib. 9. comp. phar. part.

Splen onagri, aut equi sylvestris tostus & tritus idem ibidem pollicetur. Hepati calido sicco salubre existimo hepar raia, cithari, id est, rousseta, & hepati, id est, aquile maris, & si qua sunt alia in piscibus similia.

**P**ulmonem vulpis siccatum potumque asthmaticis Galenus, phthisicis verò ob eandem totius substantiæ familiaritatem saluberimum omnes propè practici inculcant. Plura de his in libro sequente de ratione medicamenta componendi leges initio, ubi facultates composituro noscendas declaramus.

*Ga. li. II.  
simpl.*

**R**enes scincorum, crocodilorum terrestrium, tanquàm pudendum ad venerem intendentes quidam bibunt: alij sumen quoq; & caudam assument: vnde compositio est Actuario diascinu.

*Ga. li. II.  
simpl.*

**C**astorium, seu testes castoris calfaciunt, siccant, sunt tenuium valde partiū, conquunt dispositiones cōtumaces & scirrhas. Eligendi qui ex vno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore grauis & virus olēte, gustu acris & mordaci. Ex quibus duobus suspicari possis, substantia esse nobis aduersissimos: nulli

*Lib. II.  
simpl.  
Lib. 3. cō.  
ph. part.  
Dioscor.  
Li. II. simp.  
plic.*

*Bieure*, si autem vel ad motū vel sumptum est pernicio-  
*ber meta-* ciosum castorium. Lutræ animalis fibro si-  
*thesi di-* milis testes idē pollere addit Herim. Pontici  
*etus Pli.* castores sunt præstantissimi, quod & Virgi-  
*c. 30. li. 8.* lius innuit li. 1. Geor. vbi virofa Pōtus casto-  
*et cap. 2.* rea mittere dicitur. Nec inepti qui ad Ma-  
*lib. 32.* tronā Galliæ fluuiū crebrō capiūtur, mirabi-

li spectaculo animalia, cauda piscosa, soleæ æmula, pilo supernè canino: alibi Lutræ pedibus anterioribus anseris, sed vngatis, firmæ posterioribus, auribus minimis, rotundis, dente validissimo, ad unco, prælōgo, seta oris cornea, architectura in fossa sua mirabili. Castorium nigrum foetidū, rancidū, die vno necare affirmat Auic. Castoriū è Perside fermè adulteratū ad nos defertur: syncerū enim tanta vi odoris est præditū vt olfacienti vesicā castorij, sanguinē è naribus eliciat. Persæ autem adulterandis rebus sunt exercitatissimi. Seruatur annis deceni.

*Ludoni-*  
*cus Ro-*  
*ma. Pat.*  
*Lib. To-*  
*bie.*

**F**elle animalium ob acrimoniam & calorem solo vix utimur, præterquàm ad aperiendas hæmorrhoidas, sed collyriis, trochiscis, alijsq; remediis miscemus: Fella piscium oculis sunt turiora, vt eorundem hepata sicco hepatis salubriora.

**S**ordes gymnasiōrū & balneorū colligi desierunt, his tamen multò efficacior ad digerendum est auriū sordes planè biliosa.

Oesy

**O** Esypus est succidarum lanarum pinguitudo, calfacit, explet vlcera praesertim sedis & vuluæ, ac emollit. *ὑαροπον* & *ὑαροπον ὑργον* apud Paulum aliquoties legitur, vnde opinor practicis consuetudo appellandi hyssopum humidum, pro æsypum, volentibus ab hyssopo herba separare: *ἕσυν* autem Galeno cum Dioscor: semper dicitur. Lana succida & sordida contusis *Lib. II.* utilis ob æsypum: lota verò est vice lini *simpl.* menti carpti, vsta autem acris calida sicca, tenuium partium.

**S** Tercus canum & luporū, osibus, ac puerorum pane, & lupinis triduo educatorum. Galenus ceu certissima multorum affectuum remedia pradicat: ob id sicca sunt seruanda in vsus medicorum.

**M** Oschus Aëtio, Paulo, Actuatio, Arabibus animalis Gazellæ dicti, dorcadis similis, est pus in vmbilico maturū, Dioscoridi & Gale. incognitus. Cætera aperte declarat Ruellius, calfacit, siccat ordine tertio Simeoni: tenuiū est partium, odore aromatico. spiritus instaurat, imbecillas partes confirmat, lipothymiam & vires resolutas sanat, ob id cōpositionibus multis analeptici miscetur: quibusdā mulieribus vteri præfocationem affert, aliis in pello cōtra hanc mirè prodest, vtero, valde gratus, vt cū oleo  
cici

*Serapio.* cicino inunctus pudendo, venerem excitet. Melior est subflauus, quàm nigricans, & qui pelui humectatæ immixtus leuior euadit, quàm qui grauior. Indicus est melior Aphro. Ex Catay tamen niger præstantissimus hodie affertur. Citrinū Auicenna præfert hodie incognitum, nam ferrugineus est. Quibusdam malè olet, aliis caput frigidum iuuat, calidum ferit, & in eo epilepsiā excitat, pallore corpus inficit, odore in humido crasso perennante viuacissimus. Serapio contrā scribit, cerebrum calfacere, ficcare, roborare.

**V**ulpes tota in oleo percocta oleum facit vulpinum.

**C**ancrorum fluuialium vstorum cineris drachmæ duæ cum drachma vna gentianæ ad morsum canis rabidi datur Actuario, in diacarcino antidoto. Idē Gale. lib. 11. simplic. vbi partibus decē cineris cācrorum addit partes quinque gentianæ, & thuris partem vnam. Cancrorum caro ex lacte, vel lacte ebutyrato cocta, hecicis analectica est.

*Gal. li. 7.  
6. ph. pa.*

**A**Selli sub aquariis vasis delitescētes in vase fictili super prunas tosti donec albescant, triti melle cocto excepti dātur mixtri mensura (trium cochlearium Act.) ante cibum in spirandi difficultate ab Asclepiade,

de, tanquam extenuandi & digerendi facultate præditi. Quæ verò notione ad ipsorum usum venerit, explicatu difficile est.

Oleum decoctionis eorundem capiti perfrictum dolorem eius diuturnum à frigore aut crassis humoribus sanat.

*Libr. 2.  
cō.pha. p.*

**C**antharides probantur in frumento inquectæ, versicolores, & quæ luteas in alis transuersas habent lineas, corpore promisso, crasso, blattarum modo præpingues, inertes, ac imbecillæ: quæ vnius sunt coloris. necantur vapore aceti per lineum vasis, in quo sunt, operimentum. Totis vitur Galenus ad psoras, lepras. Hippocrates caput & pedes aufert, libro de fœminarum morbis. Hæ vesicam vlcérant solæ, vreticis autem salubriter miscentur.

*Libr. II.  
simpl.  
Gale. in  
theriace  
ad Pison.*

**M**ελαξα ὄμυ Aët. id est, Sericum crudum, minutim concisum, tritum, spiritum & sanguinem purgare, virtutem vitale roburare creditur Serapioni & aliis: eius infusi expressum idem præstat, ut ostendit diacoccon compositio. Sericum propriè quod arborum foliis Seres Scythiæ populi depexerant ad vestes, Greci recetiores etià ad serum, id est, bombycem vermiū fila transtulerunt: quæ etià Setæ à setarum equinarum forma dici possunt. Gosopium autem est coto dictus Bomba

*Cōfectio  
alkermes*



Bombasa Italica. Sericum putat Musa frigidum, ut folia mori, quibus vermes nascuntur, nec roborare cor cum Serapione & Auienna, quia inodorum est. Chermes idem ex herbae similis bipinnellae radice excauata capi in Polonia sepe, rem à cocco baphico diuersam, quo charmesinus color floridustingitur, non autem cocco: tingitur autem cum alumine, galla, & aliis, ob id panus ille non capiendus, sed potius coccus, quem Arabes Chermes vocant. Coccus astringit, abortum prohibet.

Lib. 6. cō.

ph. p.

Gal. l. 6.

6. ph. p.

**C**ernis recens hirundinum in diabesasa recipitur. Pulli hirundinum cum pen- nis in fictili super prunas vsti diachelidoniū stomachicum ad anginas Andromacho faciunt apud Galenum. Hirundinum ster- cus acre & digerēs, ut aliorum animalium, magis, minus.

**B**λατῆ & βλάτῃου βύσσινος appellatur. Actuario in aurea Alexandrina diamar- garito calido. Vnguis odoratus vel aroma- ticus, lib. i. comp. ph. p. conchylij tegumen- tum odore in castorium quadantenus incli- nante suffitus gratia adhibetur, Dios.

**V**niones seu Margaritæ velluntur ex quodam concharum genere, leui, mi- nimos ex myculorum conchis extrahi. Cor roborare, & putredini circa ipsum resistere.

cred.

re-lūtur, frigidi sicci. Ob hanc remediis im-  
becillorū febricitantiū, pestilentiū, miscen-  
tur integri potiores his, quos ars pertrudit.

**V**iperarum caro siccat, valenter digerit, *Lib. II.*  
mediocriter calfacit. Visei<sup>9</sup> ad cutim *simpl.*  
roperat, & ad eā expellit corporis excreme-  
ta, à quibus in multum cacochymis ingens  
numerus pe liculorū prouenit, & à cute ve-  
nit squāma abscedit, & decidit epidermis,  
ad quā protrusi sistantur crassi & terrosi hu-  
mores, à quibus psōræ, lepræ, elephantes na-  
scuntur. De his plura in theriace dicemus.

Ex prædictis aromata sunt, amomū, cin-  
namomum, cassia, calamus odoratus, nardus  
Gallica & Indica: partes balsami, crocus fo-  
liū, foliū malabathri, ladanū, aspalathū, id-  
iū, xylaloë, macer. Ad sunt recentiores tan-  
quā pretiosissima, ambrā, vngue odorata,  
caphurā, cubebas, doronicū, galāgam,  
aryophylla, moschum, macis, nucem mo-  
chatam, santalū triplex, cornu monocero-  
tis, zedoariam. In his quæ odorata magis  
sunt, in suo genere præstantiora censentur,  
ut Galenus in antidōtis. Sapore autem si-  
mpliorabis, ne multa continenter gusta, sed  
vel os inter eā abluere, vel papyrū mandere, vel  
cibus interponere, donec prioris aromatis fa-  
vor exoleuerit, ut nō prioris reliquiarum indi-  
cū tibi falsum afferat posterioris aromatis.

**Hæc**

Hæc cum sint essentiæ tenuis, celerius examinantur, præsertim aëre calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiã iam comminuta. Ob id vtenda cum vegetissima sunt, nondum verò cariola, foraminulenta, exoluta, & emortua.

Ex his item purgatoria sunt, Agaricus, colocynthis, cucumer agrestis, elleborus vterque, tithymalli, & aliæ multæ lactariæ, daphnoides, opopanax, polypodium, sagapenum, sarcocolla, dracunculus scammonium: & quæ Arabes ac neoterici addiderunt, euphorbium (huic enim nec Dioscorides, nec Galenus vim purgatricem tribuunt) cassia fistula myrobalanus quintuplex, hermodactyli, lapis Armenus Alexandro Tralliano, & cyaneus, manna, rha barbarum, tamar Indi, turbith, senna & alia quædam Mesuæ tradita.

Hæc autem purgatoria quàm prædicta omnia maiore cura & studio deligenda, reponenda, nec ita diu seruanda, vt deteriora euaserint. Ad hæc quæ in horum quibusdã vis est malefica & vehementior, est mitiganda.

Ablutione, in Aloë & cæteris.

Formatione in Trochiscos, in Agarico, colocynthide, Sagapeno.

Infusione, in Myrobalanis omnibus.

Coct

Cōstione, in Malo cydonio & maza in Scammonio: in malo citreo & maza in Euphorbio.

Mistis aromatibus, vt spica nardi cū Rha barbaro, quam si omiseris cum Medicis Parisiēsis, nihil peccaueris, quòd satis sit mite Rha barbarum, nec Spicæ viribus magnoperè egeat. Turbith, zinzibere, vel spica, vel mastiche: hæc enim malefica omnia corrigunt.

Affatione, aut siccatiōe in solē, in squilla. Iure Capi vel Galli veteris, vel vino musteo, in Senna, Polypodio.

Sorbitione aliqua medicamenti, præsertim valentioris, reliquias detergente & extrudente, vt iusculo carniū, pisorum, aqua hordei mellita vel saccharata, vino, oleo, in cucumere agresti, & scammoniatis.

Alia in his mitiora domari non postulant, nisi si quando morbum aliquem corporis auctura videntur: ob id cassiæ fistulæ in fluore alui miscetur mastiche, vel aliud stomachicum.

Tamar Indis in vētriculi intemperie frigida miscemus calida stomachica. De his omnibus plura toto propè lib. 3.

Cætera ad purgantium medicamentorum naturam pertinentia fusiùs hîc eram declaraturus, nisi Ioānes Tagaultius Parisiis Do-

Actor Medicus longè doctissimus, eam ipsam operam ex Mesue, & aliis eius rei peritioribus nobis diligenter contulisset.

Simplicia alia Dioscoridis, Galeni, & aliorum plurima, hodie parum cognita, fecissem notiora & certiora, nisi hac gloria merita Gulielmum Pelisserium Episcopum Monpessulanensem, doctissimum, diligentissimum, integerrimum, fraudare noluissem.

Adde quòd ea hoc loco

potissimum tractanda

censui, quæ in descri-

bendas postea

compo-

sitiones frequentius recipiuntur,

ut ex cognitis simplicium

viribus, totius facul-

tatem lector

intelli-

gat.

**F I N I S.**



METHODVS MEDICA-  
MENTA COMPONENDI,

*& ab alijs composita expendendi ac  
iudicandi, quibus affectibus me-  
deantur, & an quod titu-  
le pollicentur, præ-  
stare possint.*

LIBER II.

**H**OMINES cùm simus, errare  
non est difficile. Hinc Archi-  
genes priorum errata quædã  
coarguit, & Galenus Archi-  
genis. De Galeno autem dice-  
re ausim, quod is de Hippocrat. passim in-  
culcat, scriptum scilicet esse ab eo nihil per-  
peram. Nos verò Galeni vmbra vixdum  
assequutos, medicorum propè reliquorum  
conditionem subire non fuerit mirum: sed  
lectorem rogamus, vt quicquid laude di-  
gnum in his laboribus nostris commen-  
darit, Galeno præcipuè tribuat, vitia au-  
tem nostro assuat capiti. Quanquàm si  
quid iudico, aut nulla sint, aut perpauca, &  
quæ nos fugerunt: nisi nasutus aliquis ca-  
uiminetur. multa sæpe hîc exempla cõgeri,  
nulla vel vtilitate, vel necessitate: interdum

ea desiderari. Præter hæc illa passim nõ magis coherere, quàm sine calce arenas. Sed id vitio non verterit, si institutum nostrũ intellexerit fuisse, vt hæc tanquàm idonea rei propositæ testimonia etiam vt in manũ venirent scriberemus: aliquando tamen ordine certo digessimus, vbi ordini erat locus. Neq; enim Hippocratis Epidemia, tãquàm scopas dissolutas, sparsa & interhiantia exempla quisquam damnarit, ex quibus tamẽ ille tam diuinos excerpfit aphorismos, & prognostica medico maxime necessaria. Quomodò ex his exemplis nostris vniuersalia illa theoremata ad componendi rationẽ maxime necessaria colligere possis, aut hæc per illa inducendi methodo cõprobare. Quod si non videantur ad plenum absoluta, quæ ad medicamenta componendi methodum pertinet, cum anni posteriores docta & elaborata magis asserre consueuerint, tum virorum doctorum animaduersionibus admoniti, tum iudicio lectione Galeni plurima firmando, meliora aliquãdo reddemus.

Methodus verò medicamenta cõponendi hunc habet scopum, vt si quando librum consuetorum nobis medicamentorũ compositiones scriptas cõtinentẽ perdiderimus, perditis similia possimus cõponere, ex formula quadã mutationis ad propositi inuentionem

tionem nobis cognita, quam multis particularibus compositionibus exercuerimus. Non modò autem rectè pharmacà componere docet hæc methodus, sed etiã præstat, vt quæ à veteribus medicis sunt scripta composita medicamenta, promptè expédamus, & his omnibus etiam citra limitationē pronuntiatis, commodè vtamur. Melius enim est, maiorum experimentis probata medicamenta à nobis sumi rationē his vtēdi scientibus. Empirici verò cū ignorent, qua ratione composita sint pharmaca singula, perditis descriptionibus, alia componere non possunt. Quòd si naturam scirēt affectuum curandorum & eorum magnitudinem, & methodū cognoscerēt inueniendi vires simplicium medicamentorū, & curationis scopum, nō desiderarent modum curationis & compositionis. Hunc autē laborem eo nomine sumpsimus, vt Galenū à calumnia liberaremus, quem falsò insimulant siues quidam stolidi, quòd operibus de cōpositione medicamentorū κατὰ τὸ πρῶτον, καὶ κατὰ γένος, catalogū tantū compositorū à se & aliis medicamētorū recenseat, sed cōponēdi rationē nusquàm libris prædictis tradat. Probamus enim hanc methodum ceu animam quandā locis probè omnibus interspersam. Quam rē vt tibi verissimā esse magis per-

suadeas, loca indidē signauimus hāc quā-  
plurima: addidimusq; libros illos Galeni, si  
quis identidē relegerit, esse dignissimos, qui  
a medicis in vsu frequentiore habeātur. Ex  
his item & aliis non paucis probauimus ali-  
quando, neq; Galenum fuisse, neq; Galeni  
studiosos esse operū Medicorum, seu, vt cū  
illis loquar, praxis imperitos: quod vitium  
Arabistæ quidā impostores Medici nomine  
indignissimi, & Galeno, & Galeni familiæ  
impingunt: idq; imperitis quibusdā phar-  
macopœis persuadent eò facilius, quòd illi  
Galenicas sebedas ferè auersentur: quia ve-  
terū more scribantur, hoc est, purius, & bre-  
uius, & quantū fieri potest, paucissimis sim-  
plicibus constantes. Illi verò lucri helluones  
nihil de ægrorum salute solliciti, ea tantū  
laudant Medicorū rescripta, quæ sumptuo-  
sa sunt ac pretiosa: ob id quòd magna simpli-  
cium idem pollentiū turba sunt coagmen-  
tata: quòd Arabistarum istorum publicum  
est vitium, egris saepe noxium, semper sum-  
ptuosum, nota certè Cenforia, aut paulò se-  
neriore alia castigandum: ea etiam ratione,  
quòd Auicennæ sui principis dogma dese-  
runt, imperantis parsimoniam medicamen-  
torum potiùs quā multitudinem, vbi vni-  
cus est nobis scopus, nec multi affectus com-  
plicati.



**M**EDICAMENTVM est, quod corporis nostri naturam alterare potest ac immutare prima, secunda, tertia, quarta facultate, seu tota sua substantia, id est, ad sanitatem faciendam (nam ad tutandam medicamenti opus nequaquam est) siue ipsum fumatur, siue admoveatur. Medicamenti vero significatione hoc loco minus late fundimus, quam Galenus, pharmaci etiam deleteria complectentis, quæ nemo recte medicamenta vocarit, nisi si quando illorum quardam castigata & aliis mista vim ipsorum obtundentibus corpori admoveantur, & quædam horum etiam in corpus recipiantur: quod in compositis medicamentis audies. Simplex medicamentum, cui nulla alia substantia opera nostra accessit: compositum verò, cui accessit.

Compositio medicamentorum est ipsorum viribus variorum cum ratione à Medico facta mistio. Qualis naturæ in re eadem per frequens cernitur, cum pauca liceat inuenire non medicamenta solum, sed etiam alimenta, quæ substantiis pluribus, sed singulis elementa quatuor sortitis non consent, iisq; natura diuersis, & plerumq; etiam contrariis: vt in aloë substantia est vna terrea, crassa, cruda, frigida, astringens: altera

*Initio simplic.*

*In lib. 1. de natura et qualitate.*

*Li. 3. de temperamentis.*

*Li. 1. phy.*

*Lib. 1. de alimentis.*

*Lib. 2. de simplicibus. c. 13.*



*Lib. 4. fa-  
nit. tven.*

terrea quidē, sed calore interno multum tenuata, amara, calida, cholagoga: sic in Rhabbarbo, Alumine, Chalcātho, Chalciti substantiæ insunt duæ cōtrariæ. In Rosa, Agarico, & aliis permultis etiā tres: sunt & quibus quatuor naturæ insunt. Caterum hæc omnia Medici vocare simplicia consueverunt, quemadmodum & quædam verè composita, sed quæ paucioribus constant simplicibus, quàm alia eiusdem generis cōposita. Hac ratione dia trion pipereon simplex Galeno dicitur, quanvis cōstet trium pipereonana drachmis quinquaginta, & anisi, thymiana drachmis octo. Minus idem fuerit simplex, si zinziberis etiā drach. octo recipiat. Compositius quoq; fuerit, si horum trium pondus duplum, hoc est, drachm. sexdecim recipit. Præter quæ omnia quod cōpositum dicitur, etiā recipit ami, seseli, libysticū, enulam, spicam nardi, cassiā, & alia id genus, quæ ipsum vehemēter medicamētosum reddūt. Sic Actuarius & practicus Oxymeli simplex & cōpositum, Oxosacchar simplex & compositū, & alia permulta eadē ratione dicuntur. Quomodo opinor, vena, arteria, musculus, Gale. lib. de differentiis morborū partes vocātur simplices & primæ, cum reuera sint cōpositæ vena & arteria ex fibris & membranis, Gal. lib. de inæquali intemperie: musculus

sculus ex carne simplici, fibris neruorum & ligamētorum, venis, arteriis, tunica, Gal. de motu musculorum, & in anatomicis passim. Sed ex paucissimis cōpositæ partes dictæ, simplices videri queant, maximè compositis organis collatę. Simplicia igitur medicamenta propriè vocamus, quibus mistio nulla à nobis accessit, etiam si sint ex substantiis natura diuersis composita. Quæ verò minus à nobis composita sunt, catachresticos etiam simplicia vocamus. Composita enim medicamenta nobis hoc loco vocantur, quæ minister naturæ Medicus, ac imitator ex variis simplicibus diuersa polulentibus commiscuit: non quidem tota per tota (id enim naturæ solius, ac Dei munus est) sed per partium minimarum viciniam, & contactum nonnunquàm tam exactum, præsertim cōctione longa, sed blanda, & veluti totius fermentatione, vt à vera mistione parum absit: mirum ni etiam à nobis mista quædam ægriùs separētur, quàm aliqua vi naturæ confusa, vt in lacte, rha barbaro. Aloë, & plerisq; aliis videre licet. Nec abs re addidimus, miscēda esse viribus diuersa, nō autem quæ idem possunt. Quod etiam hodie celebribus medicis in consuetudine est, quum id ad sumptuum magnitudinem magis sit, & remediorum multitudinis osten-

rationem,quàm ægrorum salutē,aut compositionis vsum. Sed id vitij non recipiendum esse, post abundè docebimus: simulq; excusabimus celebres illos ac priscos Medicos,si quando in eum errorem incidisse videbuntur.

Dicamus iam quæ maioribus nostris fuit medicamenta componendi non dico vtilitas, sed necessitas. Deinde quæ medicamenta tam sumenda quàm admouenda methodo certa, composituro sint necessaria. Post hæc, in quibus medicamenta componendi ratio consistat. Præterea exemplis aliquot celebribus vniuersalem hanc methodum exercebimus. Postremò, qua ratione quis rectè compositis vti queat, perstringemus.

**M**edicamenta cōponere Medici sunt coacti multis de causis, quas singulatim per censere visum est, vt lector diligēs nihil hanc in rē commodū desiderare possit.

Vt remediā inueniēdi prima indicatio ab affectu ipso præter naturam sumitur, sic ab eodē prima componendi medicamēta ratio est profecta. Si enim solis simplicibus medicamētis omnes affect<sup>9</sup> præter naturā curare liceret, nullus vnquam vsus foret cōpositorū. Simplex verò affectus simplicē exhibet  
indī

indicationem, cōplexus compositam. Quod si vno simplici remedio præsente affectum simplicem curare possumus, id adhibemus compositione neglecta. Si vero id simplex quod nobis ad manum est, valentiùs aut inualidiùs, quàm affectui cōuenit, aut colore, odore, sapore, consistentia, vel aliis pòst dicendis, à scopo nobis proposito est alienū: mitionis iam insurgit necessitas eorū, quæ vires minuant, vel augeāt, vel coloris, odoris, saporis, cōsistentiæ absurditatē corrigāt.

Dux igitur primæ & principales causæ compositionis videntur, affectuum natura contrariorum complicatio, & simplicium tam simplicem quàm complexum affectum expugnatorum penuria, & præter has temperatura, partis figura, situs, sensus, aëris natura. Ut si affectus sit intēperies totius vel partis vno gradu calidior, vno gradu frigidiora, vt profligaretur, postulare: haberet autem fortè ad manum Medicus tantū duo simplicia, vnum temperatum, & ob id imbecillius: alterum secundo gradu frigidum, idemq; valentiùs, quàm proposito affectui conueniret: vtriusque æqua portione mista medicamentum fecit frigidum primo ordine, malo præsenti idoneum. Quomodo vinum per se sitim non extinguat, quia calidum: nec acetum, quia siccum: nec aqua

*Exemplū  
necessaria  
compositio  
nis morbo  
similari.  
Li. 1. sim-  
plic. c. 3.*

aqua per se, quia tardiùs permeat & distribuitur: mista autem aqua alterutri horum certa proportionem, sicim probè extinguit. Nam hæc vini caliditatem, & aceti siccitatem sua frigidityte & humiditate corrigit. Tam vinum autem quàm acetum essentię suæ tenuitate ipsi aquæ celeritatem & permeandi promptitudinem impertit. In œdemate pituitam, quæ in partem affluxit oxy-cratum ex spongia admotum vacuat, quorum nullum per se id præstiterit.

*In organi  
coli. 2. ad  
Glaucōnē  
in com-  
muni.*

Cūm vlcus cauū curaturus habet solūm ceram siue ceratum, & æruginem, non etiā thus, irim, aristolochiam, farinam erui, radicē panacis, & alia vlceri cauo idonea. Cera autem & per se, & magis etiam cum oleo Rhodino in ceratum liquidius effusa, vlcus facit sordidū, quia nec terget, nec siccat, quæ duo carni gignēdæ ad vlceris cavitatē implendā sunt necessaria. Aerugo autem sola erodendo & exedēdo, vlcus magis cauat, & phlegmonem excitat: vtrūq; ergo per se vitandum est, ac ex ambobus misturam cera valētiorem, æruginē imbecilliorē facimus.

*Libro 1. c  
phar. gen.  
& libr. 3.  
meth.*

Sed quoniā ceratum paulò est inferius idoneo sarcotico, ærugo autem multo valentior, multo illi cerato, vt libię vni, liquidiori modicā æruginem, vt partem decimam vel duodecimam, hoc est, vnciam, pro corporis



poris differentiis miscbimus. Nam cuiusq;  
 quantitas ante exprientiam à nemine inue-  
 niri potest, coniectura tamen iudicari po-  
 test, vt primam experientiam nullus valde  
 infauustus sequatur euentus. Pars verò ærugi-  
 nis decima acrius medicamentum facit, ob  
 id est idoneum carni gignendæ in corpori-  
 bus validioribus, duris, siccis temperamēto,  
 vt agricolarum, nautarum, venatorū. Duo-  
 decima imbecillioribus & mollibus vel na-  
 tura, vel victus consuetudine, & humidis, &  
 candidis corporibus, qualia sunt mulierum,  
 eunuchorum, puerorum conuenit.

In quo exemplo simplicia vtraq; & inter  
 se sunt maximè contraria, & affectui per se  
 sunt nocētissima: mista tamen quo dixi mo-  
 do, sarcoticum, colleticum, & epuloticum  
 efficiunt præstantissimum, quale etiam est  
 dia chalciteos Galeni: cū cera per se, mul-  
 tō magis adeps, atq; adeò oleū ipsum ob hu-  
 miditatem multam & lentorem in vlcere  
 sordem cumulet, & chalcitis siccior, acrior,  
 erodentior cavitatem augeat. Optima verò  
 medicamenta maiores ex contrariis miscue-  
 runt ratione ipsa monstrante viam, & com-  
 positionem inueniente: de cuius virtute ex-  
 perientia posterior decernit. In hoc autem  
 & aliis propè omnibus medium est paran-  
 dum potius, ceu ad mediam temperaturam  
 apta

**aptatum** : ad temperaturas verò vtrinquè à media recedentes, si vires medicamenti sunt imbecilliores, augenda est ærugo vel chalcitis, & si vis, mel addendum : si validiores, ærugo chalcitisque minuenda magis & minùs pro effecti eius portione, vel augendum ceratum, adeps, & cætera. Coniecturam etiam tuam vsus & experientia docebunt. Si enim carne impletur, bonum : si sorde, est infirmius : si cauum magis fit, & erosionis sensum arger sensit, ac pars calidior, rubetior, tumentior apparet, est valentius : & in aliis eadem ratione compositis idem faciendum, vt pòst fusiùs audies.

Est etiam cùm affectus emplaston medicamentum exigit, qualem consistentiam cùm nullum simplex medicamentum per se facere possit (non enim bitumen, non cera, non resina, non pix, non propolis, non ladanum talem vsum præbent, multò minùs ærugo, cerussa, lithargyros, molybdæna, vel aliud metallicum, nec herbæ etià solæ emplaston medicamentum faciunt ) mixtura opus fuit, vt simplicia in vsu hoc esse possent, alioqui ob conditionem suam & naturā in id inepta. Propterea primi emplastrosum autores ratione optima, ex oleo quoq; **metallica coxerunt, & liquabilia liquefecerunt,**

runt, & herbas contusas, & cretas adiecerūt.

Quedā præterea cōponimus affectui præ-  
senti contraria ex naturæ imitatione, cuius  
ritè agentis Medicus perpetuò est minister,  
vt clysterem in aluo astricta ex hydromeli-  
te & oleo, interdum ex oleo solo cum sa-  
le componimus, in quibus durum siccita-  
te stercus emolliendi, id est humectandi, est  
facultas: deinde viæ ipsius per intestina oleo  
lubricandæ ad liberiores descensum: po-  
stremò aut mel aut sal mordendo: expultri-  
cem ad opus suum excitat, vt bilis flaua in  
sanis corporibus stercore mista. Tales sunt  
trebri clysteres Gal. in libro sanit. tuendæ, &  
therapeuticis: horumq; ratio ea redditur A-  
phrodiseo in problematis. Huc pertinet,  
quòd multis simplicibus etiam curado affe-  
ctui simplici vel cōposito idoneis, sæpe fa-  
cultates aliæ insunt affectui noxiæ: cū ra-  
rum sit simplex medicamentum, quod ex  
variis substantiis, & sæpe contrariis non sit  
temperatum. Quo casu eas mistione alio-  
rum inducimus: sic scāmōnio, cholagogo  
alia miscemus frigida, crassa, astringentia,  
partes principes roborantia, vt calori, tenui-  
tati, dissolutioni, partium principum noxiæ  
à scammonio imminenti occurramus.

Sic opium castorio, hyoscyamum allio,  
cepa, semine raphani, madragoræ corti-  
cem

cem absinthio, sinapi, frigida scilicet calidis obrundimus:& in theriace, mithridatio, aliisque multis similiter.

Secundo loco medicamentorum compositionis usus est maximus, in affectibus complexis diuersis simul facultates interdum contrarias desiderantibus, vt repellendi simul & digerendi, incrassandi & tenuandi, incidendi, tenuandi, tergend, qualia sunt multa composita polychresta, vt theriace, mithridatios, & alia non pauca.

Si est igitur hydrops frigidus humidus affectus cum febre calido sicco morbo implexus, vtriusque per sibi contraria remedia est habenda ratio, si æquè pollent, si alterutrum magis vrgeat, illi attentiùs prospiciendum, altero tamen affectu interea non neglecto. Sic vbi vlcus est cum phlegmone quæ hanc curant refrigerantia, vlcus mordent, & insuppurabile reddunt: quæ verò vlcus tergent siccantq;, phlegmonem exacerbant. Componendum igitur fuit medicamentum, in quo vtriusq; talis habeatur ratio, vt neutri magnoperè incommodetur: sed tamen eo casu phlegmones maior est habenda ratio, quippe citra cuius curationem vlcus nunquam sanaueris. Idem statuendum est, vbi affectus causa adhuc præses in corpore, & ipse affectus, naturæ sunt diuersæ: vt in  
quot

quotidianis & quartanis febribus causa est materia frigida, morbus calidus: vtriusque enim habenda est ratio, sed maior vrgentioris. Composito etiam medicamento saepe opus, cum morbi eiusdem permultae sunt causae: vt si succus & multus, & crassus, & lentus faciat obstructionem: crasso tenuans, lento incidens & tergens, & fluxile reddens, multo vacuans contrarium debetur. Quae omnes facultates cum raro in vno sint medicamento, simplicibus multis simul mixtis perficiendae fuerunt. Sin cum venena calida simul & frigida sunt expellenda de corpore, vel aduersus haec corpus est munendum. Qua etiam de causa theriaca multum contrariis est commista.

Exercere sese potest quisque ex exemplis plurimis per omnes affectus naturae diuersae complicatos, vt intemperies partium maiorum, aut etiam principum inaequales, si materia & cum humoribus, simplices & compositas: vt incommoderationum differentias sibi connexas, vt solutionis conui species secum compositas, vel etiam in aliis praedictis morborum generibus. Si vero naturae sint eiusdem affectus, vt febris & morbus calida (vt in tertianis) vt in intemperies calida ventriculi, & hepatis, & partium vicinarum: minus est necesse compo-



sito uti, si ad modum est quod refrigerare  
quātum affectus ipse postulat & partis na-  
tura, ut ad iustam temperiem reducatur.

*Lib. 2. cō.  
ph. part.* Qui igitur primi composuerūt medica-  
mēta propria & familiaria aduersus impa-  
ctam partis alicuius angustis meatibus ma-  
teriam, ut humorem crassum & lentum, in-  
terdum etiam spiritum flatulentum & vapo-  
rosum ad curationem longius tēpus requi-  
rentem, egerunt variis medicamentorum  
mixture, quorum quædam impactam ma-  
teriam tenuent, & meatus dilatent, per quos  
materia illa excernatur: alia partem affe-  
ctam roborent, ne talem materiam aut gi-  
gnat, aut aliunde recipiat, & ut quod exte-  
nuatum est excernat, impactum coquat &  
tenuet: alia quæ substantiam affluentem re-  
pellant: alia quæ receptam coquāt, alia dis-  
cutiant. *Ap. 92.  
libro 2.* Quod si singulis eis effectis peculia-  
re habes compositum medicamentum in  
affectibus curatu difficilibus, secundum Hip-  
pocratis consilium inspicere, in quoniam ho-  
rum medicamentū simplex calidum sit co-  
piosius, & in quo frigidum humidum sic-  
cum, aut tenuium partium, aut crassarum:  
deinde ex successu remedij loco affecto  
prius admotū, cōiecta an in eodem perseue-  
randum sit, vel ad aliud transeundum, etiam  
eorum quæ idem pollicentur, vel ambo  
miscen

miscenda, vt medium quodammodo facias.

Tertia causa componendi medicamenta fuit totius corporis natura, & partiũ ad quas ea ferri volumus, & per quas trãsitura sunt: vt si habeo medicamentum liberandæ obstructioni idoneum, ea autem est in liene, aut hepate, aut renibus, miscẽda sunt liquida, tenuia, & totius substantiæ similitudine ipsi parti familiaria, quæ medicamentum, aut medicamenti facultatem ad partes deducant, eãque robovent, si robore pars ipsa egebit, ob actionis præstantiam: vt eupatorium hepaticis, asplênium splenicis, nephriticis cestron aut cicer miscẽdum: de quibus postea: si stœchas agarico mista pituitæ ex cerebro purgationem iuuat, hyssopus verò ex thiorace. Præterea naturarum quædam proprietas hac vel illa compositione recreata, ab alia abhorrens, composito nos vti saepe coëgit: & item coloris, odoris, ac potissimum saporis gratia, & studium seruandæ diu missionis.

Tres hæ causæ necessitatis componendorum medicamentorum sufficere possunt, sumptæ ex natura & affectus, & corporis affecti, & medicamenti affectũ illum in hoc corpore sanaturi. Quæ verò minores sunt compositionis vtilitates, plurimæ ex aliis indicationum differentiis sumen-

*Lib. 2. cō. ph. gen.* dæ, in ratione componendi dicentur. Preter  
 quas omnes vna hæc maxima est, vt com-  
 positis tibi cōsuetis, amissis similia reponas:  
 vtq; compositionis rationem in compositis  
 veterum agnoscas, & quorundā ipsoꝝ facul-  
 tates ab illis non definitas inuenias, aut etiā  
 falso adscriptas refellas. Cognitis enim sim-  
 pliciū facultatibus & qualitatibus, poteris  
*Lib. 1. cō. ph. part.* virtutem compositorum à veteribus medi-  
 camētorum inuenire, & similia cōponere.  
 Hinc etiam cognosces affectus corpori ex  
 medicamento successuros, & prænosces: &  
 his iam factis atq; facilè cognitis, remedia  
 idonea inuenies ratione compositionis in-  
 uentrice, cuius facultas experiētia probāda  
 est, quauis ante hanc coniectura quoq; ar-  
 tificiosa colligatur: vt si corpora sicca sunt  
 & valida, valētius medicamentum posse su-  
 stinere confidis: si imbecilliora & molliora  
 vel natura vel victus ratione sint, ea nō fe-  
 rent. Sic cū à pulmonibus & thorace ma-  
 teriā crassam lentam expectorare oportet,  
 potui largiore opus est, atque liquidioribus  
 eclegmatis vtendis inter medicamenta ar-  
 teriaca, siue illa sint acria & mordacia vehe-  
*Initio lib. 7. cō. pha. part.* mēter ex aro, pipere, casia, cinnamomo, gal-  
 bano, resina terebinthina, & aliis eius gene-  
 ris incidentibus, & tenuantibus, & tergenti-  
 bus: siue tantū moderatè tergentibus con-  
 stent

stent cremore prissana, amygdalis. Nā quæ emplastica sunt exacte, & morsus expertia, ex passo Cretico, gummi, tragacantho, glycyrrhiza, arteriæ asperitates tantum læuigant, non etiam expectorant.

**N**unc mihi dicenda sunt quæ compositione certa methodo medicamentum sint cognoscenda, illa nimirum tria: affectus omnes corporis præter naturam, in quos medicamentum componimus corporis ipsius natura, sine qua nec affectus illos ad vnguem nosse, nec probè & tutò uti medicamento queas: tertio simplicium omnium medicamentorum facultates pernoscenda sunt, primæ, secundæ, tertiæ, quartæ, id est, causæ medicamentorum effectrices, seu naturales quædam eorum potentia corpus nostrum immutantes. Nam cum primus & præcipuus componendi medicamenti scopus sit affectus præter naturam, nullo simplici remedio curabilis, illius tota natura tanquam vngues & digiti cognitissima esse debet: si calidus scilicet, aut frigidus, humidus aut siccus, vel horum coniugatione intemperatus, & quoto ordine est vnusquisque talis. Item si cum materia vel sine materia, si causam habet desitam vel adhuc præsentem, & eam vel hecticam vel schericam: adhuc si profundus est morbus vel

*Libr. I. c.  
ph. g. &  
initio. lib.  
6. c. ph. p.*

sublimis,propè partem momentaneâ vel longè ab ea,& alia propè innumerabilia,partim pòst dicenda in ratione cõponendi,partim ex curandi indicationibus sumenda.

Quòd si natura affectus incognita vel neglecta aduersus ipsũ medicamẽta cõponis,cũ scopo certo cõpositionis careas,illi es similis,qui oculis clausis telum,quò fortuna feret,emittit. Is enim vt scopũ vel nõquam vel rarissimè,idq; fortuitò,attinget:sic medicamentum in hunc affectum exactè non cognitum si componis,illum vix vnquã sanaueris:mirum ni etiam plurimum auxeris,cũ medicamẽta sint rara,quæ nec prosint,nec obsint, sed ferè salubria sint, aut insalubria:paucissima,& rarò neutra. Se igitur quis est medicinæ studiosus,diligẽter exerceat in morborũ,causarum, symptomatum cognitione,vt perspecta horũ cuiusq; natura,statim concipiat ex theoremate illo Hippocratico contraria contrariorum remedia,quo genere remediorum sit opus, calidõne an frigido,humido vel sicco,tennuante aut incrassante,molliente vel durante, vel alio reliquorum similiũ. Deinde in ipsis simplicibus tanquã promptuario longè vberimo & copię cornu plenissimo,summa cura,precipuoq; studio vestiget,quæ quibus affectibus sunt,quantũ opus est,cõtraria. Id quod  
fin

*Lib. de flatibus.*



si in vno aliquo nō inest, duobus aut pluribus simul mistis efficiat. In quo studio nemo se vnquā feliciter geret, cui simplicium omnium natura (vt idē de reliquis salubribus causis tibi persuadeas) nō sit tanquā sua domus cognita. Nam præterquam quod illis simplicibus vti recte nequeat, neq; etiā possit ex his probè aliquid cōponere, aut aliorū compositis recte vti: nemo enim cōposito vnquam recte vteretur, viribus simplicium id componentium ignoratis: cū illius vires ex horum viribus propè solis sint æstimandæ: quomodo partes in nobis organicè seu cōpositæ, vt recte vel malè habeāt, id ex similitudine seu simpliciū magnitudine, numero, figura, situ, & cōnexionē accipiūt. Quis igitur pœna non sola ignominie nota dignos non putet, multos huius ætatis Medicos. etiā hominū opinione celebres, qui neglecta simpliciū exquisita obseruatione, cōtenti sunt facultate cōpositi vtcunq; cognita. Illis enim satis est scire catholicū humores omnes purgare, diaphœnicon bilē flauā, diacnicum pituitam, diasennam succū melicholicum, cocticia cataporia cerebrū, optica oculos: neq; sunt solliciti quibus horum quodq; simplicibus constet, & quanta singulorum mensura: neque curant hi, si vires habeant composita, quas titulo pollicen-

tur. Cùm tamen simplicia sint & natura & tempore priora compositis, & ab illis hæc omnem propemodũ habeant facultatē: nisi si qua ex contrariis composita (quorum maxima turba est) facultatem componēdo acquirant non modò diuersam, sed etiam sæpe contrariā simplicibus per se vsurpatis, quod in sarcotico ex ærugine & oleo, & dia chalciteos emplastro ostēdimus. Adde quòd vis quædam diuersa, sed ferè exigua ex ipsa cōpositionis & nostræ coctionis ratione nonnūquàm proficiscitur: magna verò quibusdam ex coctione à mistorum calore natiua tādē perfecta, vt in theriace & mithridatio audies. Quæ medicantium consuetudo si recipitur, quid miramur medicinam paucis admodum mensibus percipi? quid miri est, idiotas ad medicinam faciendam conuolare, cùm physiologiæ totius, prætereà vtriq; sint ignari, vt reliquam quorundam ignorantiam taceam.

Iam patēre cuius arbitror, medicamēta composituro cognitissimā esse affectus curandi, & remedij curantis naturā oportere. Qui enim morbum, ac morbi causam, & vtriq; naturā pernouerit, deinde simplicium medicamentorum omnium, aut saltē plurimorum & vsurpationum vires omnes, in singulis morborum speciebus rectē com-

ponat, & salubriter vtatur, tum simplicibus tum compositis medicamentis, si simul naturas corporū & aëris inspexerit. Mollihus enim & humidis, vt pueris, eunuchis, mulieribus, mitiora debentur medicamēta: duris autem & siccis, vt venatoribus, messoribus, nauīs, agricolis, validiora: mediis horum medicaria: & in carne siccavlcus, sicciora: in molli minus sicca, tam sarcotica quā colletica & epulotica requirit. Et in cognatis cuiq; intemperaturis mitiora, in contrariis valentiora requirūtur, quoto scilicet ordine quisque per morbum à sua natura recessit: & aëre calido minùs calida, & frigido minùs frigida, quā affectus requirit, medicamenta sunt adhibenda, & in reliqua oppositione ad portionem.

Quæ verò ad affectuū præter naturā cognitionem pertinet, hīc audire ne expecta, sed ex lib. de differentiis, & causis morborū & symptomatum, & de signis partiū internarum affectarū, & aliis Hippocratis & Galeni libris huc pertinentibus require. Vti quæ ad cognoscēdam cuiusq; naturā sunt necessaria, ex libris physiologicis repetenda tibi sunt, quorum omnium catalogus in ordine librorum Hipp. & Gal. tibi abundè suppeditatur. Quæ autem ad simplicium medicamentorum cognitionē sunt necessaria pau-

lò fufius explicabo, ne quid cupido lectori  
defit ad compositionis peritiā etiā ſi mul-  
ta ſatis attigiffē tibi Galenus videri poſſit  
libris quinque primis ſimplicium. Ex quibus,  
& aliis aliquot eius locis ad hanc rem ido-  
nea paucis perſtringere tibi conſtituimus.

Noſcēda eſt medicamēti ſimplicis ſacul-  
tas quadruplex, prima, ſecūda, tertia, quarta,  
(à quarum ſingulis ſua prodiit actio) & quæ  
medicamēta quibus locis abūdāt, & quibus  
itē locis, atque cōditionib⁹ aliis ſūt meliora.

Facultas medicamenti prima reliquarū  
communis eſt tanquam baſis (præterquā  
quòd quartā iuuare nō videatur) ex iſtis ele-  
mentis nullius interuentu prodēns, ipſiſque  
omniū maximè tributa: generatim quidem  
eſt calfaciendi, refrigerandi, humectādi, ſic-  
candi, & per horum coniugationem calfa-  
ciendi, humectandi, calfaciēdi ſiccādi, refri-  
gerandi humectandi, refrigerandi ſiccandi.  
Particulatim verò efficiēdi id ipſum in prin-  
cipio, medio, ſine ordinis primi, ſecūdi, ter-  
tij, quarti. Ea verò quæ ratione ſit tactu &  
guſtatu tanquā tactu quodam exploran-  
da & iudicanda, abundè docet Galenus lib.  
ſimplicium. Etiam ſepe ſecundas facultates,  
nonnunquā & tertias: eſt quādo & quar-  
tas in quibusdam ſimplicibus proſecutus.  
Omnes enim eas recēſere in omnibus ope-  
ros

**F**osum fuerit: cū etiā per multa sint, quo-  
rum facultas tertia parū cognita est, pluri-  
morum quarta adhuc omnino incognita,  
cognoscenda quibus, quando, quantū Deus  
voluerit, vt Auēzoar pulchrē dicebat. Satis  
fuerit (quod ad primas facultates attinet) co-  
gnoscere calidum frigidū humidū siccū or-  
dine primo, obscure: secūdo, manifestē: ter-  
tio, vehementer: quarto summē tactum no-  
strum & gustatum afficere. idque in horum  
singulorum ordinū principio medio, fine,  
sic vt ordines sint 12. medicamentorum tum  
calidorum, tū frigidorū, tū humidorū, tum  
siccorum, id est, calidiorū, frigidiorū humi-  
diorum, sicciorū temperato. Noscit etiam  
Medicus, quæ medicamenta celeriter etiam  
vbi adnota corpori nostro sunt, vel in ipsū  
recepta, virtutem statim amittant, quæ diu  
eandē seruant. Vt euphorbiū caducā & sta-  
tim euaniā adnotum parti caliditatē ha-  
bet: arus & alia quæ caliditatē humiditate  
multa & lēta mesam habēt, tardius eā exe-  
runt, sed diutius excitatam seruāt. Item eu-  
phorbium recens linguā vrit: trimū & qua-  
drimum adhuc vegetū est, annis sequētibus  
exoluitur: sic Thapsia post annū est admo-  
dū imbecilla, bima prorsus exoluitur.  
Quæ omnia multis Galeni locis tibi clario-  
ra simul & credēda magis reddere visū est.

Nisi

Cap. ult.

Libr. 5.

simpl.

Libr. 3. c.

ph. 2.



*Libr. 7. c. phar. p.* Nisi quis exactè & distinctè simplicium vires noscat, non cognoscit compositum, nec in quali ordine sit efficax, vtrum scilicet vehementissimum vel clementissimum, vel medium, vel inter hæc constitutum, vel si ex contrariis constet.

*Initio li. 3. c. ph. p.* Nullus cū ratione & methodo medicamenta componere, aut compositis vti potest, nisi simplicium medicamentorum vires mēoria teneat, & omnium quę in methodo medendi docentur, meminerit.

*Libr. 1. c. ph. g. et p.* Medicus prudēs & peritus noscat naturā affectuum qui curantur, ægri naturā, & medicamentorum facultates nō generatim solum, sed secundum quantitatem, id est, quāto recessu calidum, frigidum, humidum, siccum, tergens, & cætera: vt quotidie coniciat, quali remedio opus est, vt præcedens medicamentū intendas vel dissoluas, quantum affectus requirit: & sic curatio rectè absoluitur. Neque enim sufficit nosse hoc calfaciendi aut refrigerādi facultatem habere,

*Libr. 1. c. ph. g.* sed quo recessu, siue quantam habeat eam facultatem diffinire oportet. Nam resinæ omnes calfaciunt, idq; sibi habent commune: sed maioris & minoris rationem non exiguam sortiuntur, vti & liquores nō pauci calfaciūt: sed ὁπὲς panacis collatione ὁπὲς Cyrenaïci aut Medici parum calfacit. Anethum

thum etiam, ruta, cepa, omnia sunt calida  
 medicamenta, magno tamen inter se variã-  
 tia discrimine. Ob id curandæ parti admo-  
 dùm refrigeratæ, multum calida admoue-  
 mus: parum refrigeratæ, modicè calida: in-  
 signiter refrigeratæ, vehementissimè calida.  
 Proinde quatuor calfacientium, vt refrige-  
 rantium, & humectantium, & siccantium or-  
 dines statuimus, & in his singulis principiũ,  
 medium, finem. Itaque sunt ex his quæ ob  
 caloris vim vrunt, vel exulcerant, alia septi-  
 ca, id est, putrefacientia sunt, alia simulatq;  
 corpus attigerunt, suam potestatem osten-  
 dunt: alia horis duabus, tribus, quatuor: alia  
 die vno, alia etiam nocte, vel maiori etiam  
 spatio post applicationem agūt. Hæc quo-  
 que in refrigerantibus, humectantibus, sic-  
 cantibus similiter noscenda ei sunt, qui me-  
 dicamentum probè confecturus est. Quod  
 ob id etiã scitu maximè est vtile, vt si quan-  
 do valentiore medicamẽto egebis, ad quod  
 digrediare, cognoscas. Qui autem particulã  
 simpliciter calfaciendam iubet, non magis  
 piper, aut sinapi, quàm thus capiet, eodem  
 modo & in secundis facultatibus, si tergen-  
 dam solũ iubet, non magis mel, quàm  
 glycyrrhizam vel aloën capiet.

*Libr. 2. c.  
ph. g.*

Qui medicamenti vim, qua operando  
 iuuat, ignorat, eo rectè vti non potest,

*Initio lib.  
6. c. ph. p.*

Omn

*Initio lib.**7.c.ph.p.*

Omnium simplicium medicamentorum facultatis notas habere oportet eū, qui compositum aliquod vult efficere. Idem illis recte utetur, quæ alij composuerunt, & indistincte scripserunt: distincte autem scriptis melius quam alij utetur.

Rationalis enim Medicus pro varia affectuum natura medicamentū mutat. Quam rem is solus præstabit, qui omnium simplicium medicamentorum facultates cognoscit. Solus enim qui omnium simplicium vires nouit, sciet quando hoc vel illo medicamento certo ordine utendum erit, & quantum id à medio recedere debeat.

*Libr.1.c.**ph.p.*

Simplicium facultatibus & qualitatibus cognitis, quisque potest inuenire, qua sint virtute prædita, quæ à veteribus sunt composita, & talia ipse componere, & inde affectus qui medicamentis superueniunt, potest prænosse, & præsentibus succurrere.

Poterit idem solus distinguere, quibus affectionum differentiis remedia sine distinctione scripta conueniunt.

Non satis igitur est nouisse medicamentorum facultatem simpliciter & in genere, ut hoc calfacere, illud refrigerare (quod solum Dioscorides docuit) sed quoto quodque ordine id præstare possit, quod Galenus in plurimis definiuit.

Veter

Veterum quoque Medicorum præstantissimi ipso vſu edocti, optimas medicamentorum compositiones effecerunt ex ſingulorum natura, cõpoſitionis artẽ inueniẽtes: quæq; intenſa qualitatibus ipsis ſunt, aliorũ miſtura remittentes: ſimiliter acria hebetãtes, & vt ſummatim dicam, pro reliqua cuiuſq; virij differentia, & hominum temperie inedicamentis artiſcioſẽ vtentes.

Comperta enim morbi cuiuſq; natura & differentia temperamenti tum ægri, tum ſimplicium medicamentorũ cognita, ſic cõpoſita præparamus ſingulis hominibus pro corporis ipſorũ ſtatu congrua, & vnicuique morbo contraria. Quandoquidem ſemper memineris oportet, omnẽ qui præter naturam incidit, exceſſum contrario exceſſu eſſe corrigendum: hũcq; omne curationis conſilium dirige. Quod ſi prætereà corporum curandorum naturam noueris, & ſingulorum remediorum facultates, vniuerſæ iam artis peritus es, & valẽtudinẽ ſanis probẽ tueberis, & ægrotis priſtinũ ſtatũ reſtitues.

Facultas ſecũda eſt, quæ primas ſimplices facultates vel cõiugatas nullius alterius interuẽtu ſequitur: vt facultas molliẽdi humectationẽ primò ſequitur: durãdi, ſiccationẽ: rarefaciẽdi, attrahẽdi, aperiẽdi tenuãdi, calfactionem: denſandi, repellendi, claudendi,

cauſſ

*Galen. in  
theriaca  
ad Piſo.*

*Ibidem.*

*Lib. 5. ſa-  
nit. tuẽda.*

crassandi, refrigerationem. Vires & qualitates secundas in acerbis, austeris, acidis, dulcibus, falsis, amaris, acris, digerentibus, astringentibus, contrahentibus, repellentibus, ex alto trahentibus, referantibus, tergentibus, sensum stupefacientibus, scribit Gal. lib. 3. compo. phar. part.

i. A calfactione igitur procedit actio propinqua, tenuatio crassorum, quæ si liquida sunt, in vaporem tenuando versa, exhalant: interdum intra corpus, & fiunt pituitæ, aquosa, flatu, inflationes, palpitationes, & ceteri affectus similes: interdum foras, vacuanturque; halitu vel insensibili vel sensibili, cum sudore. Si verò sicca fuerant crassa, illa quæ tenuantur, aut etiam humida, sed minus exhalantia, tenuioris substantiæ euadunt. Sic ex austeris acida iam tenuia, ex acidis dulcia tenuiora, ex dulcibus falsa tenuiora, ex falsis amara adhuc tenuiora: omnium post hæc si saporem caloris indicem spectes, tenuissima sunt acria. Sic quæ veterascunt, à suo calore tenuata magis euadunt: sic ex vino acetum, ex lacte coagulum, ex maza fermentum, calore externo corrumpente, tenuiora ut calidiora euadunt: & psoricum in fine libr. 9. simpl. putrefactione 40. dierum sub fimo fit tenuius: & vnguentum ex nucibus viridibus sub terra putrefactis tribus mensibus, Heras apud



apud Gal. libr. i. comp. ph. part. tenuius efficit. Sic cocta omnia & vsta euadunt tenuiora: sic humores in nobis crassos caloricis causis salubribus, vt labore, cibo, potu, medicamento calido, aëre calido tenuamus. Tametsi quædā frigida tenuibus partibus prædita, vt acetum, cortex nucum viridium Galeno in diacaryo, caphura recentioribus, & alia quædā vim quandam tenuandi à tota substantia etiam habeant, nisi malis in his frigidis substantiam quandam calidam eandemq; tenuem inesse. Sed crassam aceti partem calidam, tenuē potius frigidam innuit Galen. lib. i. simpl.

2. Calidum deinde fundit & liquat à frigido concreta: pauco quidem, vt niuē, grandinem, glaciem, pituitam in nobis crudam, adipem, resinas, gummi, leuis calor fundit: multo autem & diuturno frigore cōcreta, vt succinū, crySTALLUM, metalla multus calor: in metallis tamē magna maioris, minorisq; ratio versatur. Nā plumbū & stannum Cap. 6. citissimē, aurum & ferrum tardissimē, as, & Li. 5. simplic. argentum medio inter hæc tempore igni liquantur. Sic scirrhus à frigido cōcretos calidum fundendo velut sub sole emollit.

Idē fundēdo mollit prædicta omnia concretionē à frigido dura, & nostrū corpus: ob id motus leues pulmōni, aut aliis partibus

*Lib. 2. fa-* corporis, aut etiã toto corpori ante iustam  
*ut. tuend.* exercitationem ad has partes præmolliẽdas  
 imperantur, vt mollitã, tensioni per motus  
 violentos vehementi citra noxã obediãt:  
 alioqui enim non præmolliã, citoq; ac ve-  
 hementer tense ruinerentur.

Idem fundendo & liquidiora ad motũq;  
 promptiora reddendo excrementa, obstru-  
 cta liberat, nisi præ copia aut lentore in via  
 hæreant. Fluxiones etiã aut excitat, aut ge-  
 minat: qb id æstate catarrhi Aph. 21. lib. 3. &  
 in diaria ab æstu cap. ultimo lib. 1. feb. & hy-  
 pochondriis, calorifica admoueri, & balneu  
 in febris non probẽ vacuato corpore, &  
 viscere aliquo imbecillo prohibet in fine li.

*Aphor. 24* 11. Methodi. Ob id etiam in magnis flu-  
*lib. 1.* xionibus corpore multũ pleno purgatio-  
*Lib. 8. me* nes veremur, ne purgantium medicamento  
*lib. 1.* rum (quæ omnia sunt potestate calida) calo-  
*Aphor. 14* re liquatum tenuatumq; excrementum, lar-  
*lib. 5. li. 2.* gius in partem affluat, & in diaria à frigore  
*loc. affect.* cum catarrho vel coryza, interdicitur bal-  
 neum ante horum coctionem.

Idem fundendo semen, ac tumefaciendo  
 venerem excitat, fundendo sanguinem &  
 meatus dilatando sudores, vrinas, menses, hæ-  
 morrhoidas ciet. Eadem ratione laxat ten-  
 sa & rigida concretione, & quia vacuat, la-  
 xat etiam tensa plenitudine. Mobiles enim

magis

magis non spiritus solos, sed reliquas quoque materias faciat calidum, hinc calido sicco cerebro & spiritu animali natura aut reperatur, acquirunt, aut febribus homines sunt vigiles, insomnes, deliri, precipites.

Eadem vi fons ex aqua tepida nervis notius lib. 6. methodi. quia eorum substantia, ut aliarum partium nervosarum à frigido concretam dissolvit. Venter item ratione eadē tepida evertit, vomitumque ciet, & usu multo calidus facit nervorum incontinentiam, seu tremorem, & mentis torporem, & carniū effeminationem.

Idem calor fusa tenuataque, si diutius exercet, digerendo aut aliter vacuando, tandem siccatur: quod ostendunt liquores, succi, gummi, & resina omnis aut vetusta, aut vsta. Eadē ratione medicamenta omnia purgantia, & causæ reliquæ caloricæ emaciant, tum quia vacuant, tum quia calorem nostrum vel angunt, vel intendunt: qui maiorem substantiæ nostræ facit dissipationē. Ob id biliosi sunt graciles, & quos calor emaciat, pallidos facit aut nigros, si verò corpus ut cunq; succulentum est, coloratos sanguine & spiritu cum calore per corpus sparso.

Idem praeproperè siccando una est causa nostri & senij & interitus acerbi, aut etiā naturalis, quando paulatim lēta morte

Apho. 16.  
lib. 5.

Aph. 8. li.  
4. & lib.  
8. Metho.

nostrum consumit humidum substantificum: sed calidi effectum hoc per accidens non primo, pòst dicetur.

3. Calidum rarefecit densa, & poros ac meatus omnes, & capacitates, & ora ipsa tā vasorum quàm aliarum cauitatū aperit, fistulat spiritu calido, & dilatat in prima formatione, & quoties corpus incalescit. Quæ ex re fit, vt viris nempe calidioribus omnia hæc sint maiora & latiora quàm fœminis: et quò viri aut fœminæ sunt calidiores, eò sunt meatibus capacioribus: quò minùs calent, astrictioribus. Hinc arteriarū latitudo cordis caliditatem, venarum, hepatis sequitur. Hinc viam facturi calculo vel fœtui calorigica damus sumenda, & apponimus. Hinc sudores æstiuī quamplurimi & balnearum, & calida sunt quæ vrinas, sudores, & menses mouent, & quæ digerunt per rarefacta corpora inter humorem vacuandum & medicamentū digerens constituta. Hæc quidem præstat calor temperatus, aut non ita vehemens. Ardēs verò ac igneus, vt à balneo feruente, cuti incidēs eā claudit & dēfat, quod ille occurſu blādo naturæ est iucundus, eāque ad se suscipiendum inuitat: contrā verò hic acrior, & naturæ grauis est, ob id ab eo fugiens intrò, poros contrahit, ne se hostilis ille calor sequatur: quomodò tātūmp̄ accidens.

*Gal. in ar  
te medi-  
ca.*

*Li. 3. sani-  
ta. tuepd.  
& libr. 7.  
meth.*

cidens densat, vti calore multo ficcatur, vt paulò antè dixi, etiā densum redditur. Hinc clibanus calidior panē vndiq; adurit, intus non coquit, initio alimentorum, & ouum aquæ feruenti immissum vix duratur.

4 Calidum trahit & foras si admotum est, intrò si sumptum est euocat materiam à se tenuatā per meatus à se apertos. Quapropter admotū resoluit ac digerit, sumptum obstrueta reſerat, vacuat, purgat humorem omnem, sed primū sequi paratiorem, deinde alium: nisi etiam substantiæ totius similitudine ac proprietate sibi familiarē non calore solo trahat, qua sola quēdā etiā frigida trahunt ex corpore spicula. Dolores eadem ratione sedat à materiæ qualitate vel quantitate factos, hac materia dolorifica per resolutionē vacuata, ac proinde tumores dissipat. Apophlegmatismis & errhinis eadem vi tractrice calidum est aptum, & quia concreta in cerebro, excrementa liquat. Sic suffitus aromatum muliebria ducit: sic radix cyclamini, & alia nō pauca, vmbilico admota alium subducunt: ventriculo autē ad vomitum trahunt. Sic trahendo calor immoderatio fluxionis vna est causa: sic partes corporis omnes alimentum sibi familiare trahunt, calore scilicet, sed etiā substantiæ totius similitudine. Sic succinū attritu calfa-

Lib. 2. feb.  
cap. 15. &  
lib. meth.  
11. & 13.



ctum citius & potentiùs trahit paleā, papyrum, & alia leuia & minuta. Sic sol, & alia corpora cœlestia in mediam regionem aëris trahunt halitus, vapores, & alia quēdam corpora. Sic partes nostræ nimis tectæ ob calorem inde collectum immodicē replentur, & caput in æstu cucurbitulæ ritu attrahit: vnde coryzæ, & catarrhi, & fomenta oculorum, & viscerum partes replent. Quid quod sumpta calida non tantum trahūt, sed etiam prorsus propellūt, vt quæ flatu dissi-  
 pāt per ructus aut crepitus: quæ sudores, vrinæ, menses, hæmorrhoidas promouent: quæ foetus mortuos & secundas depellunt, quæ partes adiuvant. Id autem præstant, quod meatibus interclusa dū magno impetu ad dicta loca feruntur, vnā secum propellunt, aut si vis, rapiunt dictas prius materias: aut quomodo fortasse ignis in bellicarum machinarum meatu derepentē excitatus pulvere ignipotente, ac loco carens idoneo & capaci, aut fistulam æream frangit ac dissipat, aut glandem metallicam longissimē iaculat, ne corpora duo locum vnum occupēt.

Calore quoque cucurbitula corpori admota cum flamma multa, si magna est: pauca, si parua, è profundo potenter attrahit fuga vacui multum adiuvante, quando si aër vel ore parum probè commissio, vel exiguo  
 fora

*Li. 11. metho. & Apb. 33. li. 6*

foramine ( quod attracti vaporis emissarium quædam magnæ habent ) ingreditur, nihil aut minimum attrahunt. Et vitri fundum cucurbitulæ æmulum palmæ parum humectatæ paulatim & velut tranando, sed firmiter affixum sine flamma cucurbitulæ modo firmiter palmæ adhereret, & attrahit. Neque enim tam paucò tempore calor magnus à flammula excitatur: neque calor alius multò maior tam validè attrahit quàm cucurbitula.

5. Calor natiuus coquit alimenta & humores coqui habiles, partiq; nutriendè perfectè assimilât: impactos autè nec difflatos vertit in pus, aut puri respondentē substantiam, quæ in febrium coctarum vrinis apparet, nisi tam sit praua, vt nullum à calore natiuo cultum recipere queat. Quò autem copiosior fuerit hic calor, eò valètiùs alimenta coquit: ob id pueri plurimo egēt alimento, quia plurimum habent calidi innati, Apho. 14. libr. 1. Eadem ratione adolescentes & pueri præsertim viuidiore*s* ieiunium non ferūt, Aphorif. eodem: & per hyemem pluribus alimētis opus est, quia ventres hyeme & vere natura calidissimi sunt, Aphorif. 13. libr. 1. Idem calor lac ex sanguine pituitoso coquit, & semen ex sanguine perficit, cap. 16. libr. 4. simplic. & cap. 20. 22. lib. 5.

*Lib. 5. simplic.  
pli. cap. 5.  
& 8.*

*Cap. 85.  
artis med.*

*Cap. 5. li. 5. simp.* simplic. Calor natiuus moderatus coquit quantum appetit: remissior autē plura appetit quā possit coquere, nisi manus palma vētriculo admota, vel pueri carnosī non facile sudātis venter, aut catellus pinguis, calorem illum foueat & augeat: at vehementior & acrior idem, & velut igneus ac febriculosus coctu facilia, vt pisces saxatiles, cor rumpit: coctu difficilia, vt bubulam, chondrum coquit. Idem calor natiuus si moderatus est, primum ac principalissimum est naturæ instrumentum ad generandum, augendum, nutriendum. Idem calor dulcorat: nam sapor dulcis à calore fit moderato, vt in melle, chylo, sanguine, fructibus apparet, & lacte, quod coquendo quantum sibi de sapore dulci deest, assequitur.

6. Calor præter naturam & parti externus ac alienus corrumpit, vt victa partis natura à fluxione in magnis phlegmonis fit gāgrena, aut etiam sphacelos. Eius caloris externi causæ quinque docentur libro de causis morborum, & cap. 4. lib. 1. febrium. Hic corrumpit, minuit, emaciat, atrophiam inuehit, graueolentiam, substantiam alienam, odores, colores, sapes in nobis præter naturā excitat, malorū nobis omnium & mortis est autor: vt natiuus ille per se etiā vitalis est, ac quicquid in rebus subsistit, id auge-  
tur,

tur, roboratur, sanum est, ac viuit dum proprio calore regitur, licet per accidens interitum tãdem quoq; afferat, summa scilicet in partibus siccitate excitata. Vterq; tam natiuus scilicet quàm externus simul mixtus partim coquit, partim corrumpit olida putredine, vt in phlegmone suppurata, & febribus putridis salubribus, si æquè ambo pollēt. Si verò inæqualiter, pro vincente calore fit alteratio, coctio quidem magis natiuo: putredo autem potius externo dominante. Idem vehementior tam internus quàm externus mordet, rodit, rubrificat, carnē deterrit, vrit, escharam inducit, quod declarant herpes exedentes, carbunculi, & caustica cuti & potius carni admota. His autē externis tam sumptis quàm admotis, si substantiæ cōtrarietas cum nostra accesserit, corpus nostrum eo modo mutant, quo à corpore mutatur alimentum: sunt enim deleteria nocentissima, præcipuè si sumantur.

Li. II. method.

Lib. 3. temperamēt.

7. Calidum internum & externū moderatū partibus natura frigidis, vt cerebro, spinali, medullæ, ossibus, dentibus est amicū vsu moderato, Aph. 18. lib. 5. nō autē immoderato, Aph. 16. lib. 5. Nā pars omnis intēperata à similibus suæ intemperaturæ causis promptè offenditur: iuuatur autem modico contrariorum vsu. Moderatum autē cuique

Cap. 23. artis med.

intemperaturarum magnitudini suum est, ut si parum perfrigerata est, modice calido opus est: si plurimum, ipsum elementum ignem requirit. Idem rebus splendorem inducit, ostendit color viuidus adolescentium, sanorum, potorum, iratorum, hilarium, & melancholia humor ob adustionem splendida, cum humor melancholicus nigredinem habeat obscuram, Aph. 21. lib. 4. ut sanguis extincto calore natiuo nigrescat. Externus autem calor nunc qui foris corpus tangit, intelligitur, interdum alienus ob vehementiam à nostro & insito, siue is ab aëre sit ambiente, siue balneo, siue in corpore nostro non transpirante, vel alia de causa excitatus sauiat.

8. Calor homogenea cogit, heterogenea separat, parvus & parum diuturnus imperfectè, vehemens & diuturnus perfectè, ut Aristote. cap. 4. lib. 4. Meteor. Quod an sit propria & perfectissima caloris actio, ut frigoris, tam homogenea quam heterogenea cogere, an potius caloris calfactio, frigoris refrigeratio, abundè docuimus nostro commentario de tota quatuor elementorum natura.

9. Calor tam internus quam externus per accidens refrigerat, vacuata ex corpore vel parte, materia calida. Ob id Venus Hippocrati calfacit, humectat agitato corpore, & fusis à calore humoribus, refrigerat, siccatur



Galenò lib.3. sanit. tuend. non modò semine calida & humida, & spiritu vitali plena, re excreta. sed per cutim multo calore nativo & spiritu cū humore & vapore excreto. Sudor item accessionibus superueniens, aut febribus cōtinuis & ardentibus, Aph. 58. li. 4. Aut etiam solum exhalatio putrium succorum aut vaporum per cutem insensilis, Gal. lib. 8. 9. meth. Sic medicamenta quavis potestate calida materiā febriū putrem vacuando refrigerant, licet per se calfaciāt: sic phlegmone fotu mitescit, quòd calore repido tenuata sanguinis eius parte, & per cutim ab eodē rarefactā vacuata tensio minuatur, & aliquid calide materiæ foras trahatur, & sanguis minus iam impactus, liberius trāspiret. Sed si corpus est impurum, noua fluxione excitata dolor repetit vehemēti-  
or, Aph. 31. lib. 6. Sic balneum aquæ dulcis fuliginosa per cutem excremēta vacuās sine febre, & in accessionum declinatione refrigerat, & laconicū calidum refrigerat, & ignis modicus refrigerat calfactos, quibus intus calida sunt excrementa, & aer æstius sudātes, aut saltem vaporoso halitu madidos refrigerat, & frictio mollis multa, & exercitatio, & cataplasinata, linimēta, emplastra, & calida alia admota. Que oīa vacuātia si immodica sūt, etiam calore nativo & nostr

nostra triplici substantia calēte multū vacua-  
ta, frigida & sicca corpora nostra relinquūt:  
vt mox audies, & prius leuiter attigimus.

*Initio sa-  
nit. tuend.*

10 Calor per accidens siccatur resoluta, &  
in vaporem versa substantia vel excremen-  
tosa, vt in dictis exēplis, vel etiā partis pro-  
pria, si diu perseueret focus, balneum, aer ca-  
lidus, praesertim si paulò valentior sit calor:  
nā vehemētissimus externus adusta super-  
ficie & dēfata humidum intrò cogit, nec fi-  
nit expirare, vt antè dictum est. Hinc ani-  
malibus omnibus, atq; adeò plātis ipsīs cor-  
ruptelē ac interitus est cōnata necessitas, im-  
modicē videlicet siccatis à suo calore nati-  
uo humidū substantificum depascente citius,  
si acrior & vehementior, & humiditas illa  
pauca, parum lenta & crassa: tardius, si con-  
traria adsint. Idem ostendunt digerentia  
omnia, exercitatio vehemens & diuturna,  
frictio multa non dura, febres ardētes & a-  
cutae, venus immodica, intempestiua: hæc  
enim & sudore, aut madore, & feminis va-  
cuatione siccatur: refrigerat, vt prius diximus,  
longa in sole aestiuo mora animalium, & rerū  
aliarum humidarum. Siccatur eadem ratione  
omnis immodica vacuatio, quacūq; parte  
fiat, etiam si per accidens fiat, vt per inediā.  
Ob calorem etiam nō solam siccitatem se-  
men agni & rātæ, & quę similiter immodi-  
cē

cē calēt, virorum genituram absumunt:  
sic & ignis ipse res genitas nō sola siccitate  
per se, sed etiam calore per accidens siccatur.

II Calor per accidēs humectat fufis his  
quæ à frigido concreuerūt: ostendūt id ca-  
tarrhi per febres ac solis æstus, vti per frigus  
cōprimens. Sic scirrhus concretione durus.  
calorificis mollescit & humescit, nix, gran-  
do, glacies, calore quouis humida & liquida  
fiunt, & butyrum, oleum, adeps, resinae, &  
quæ alia frigore concreuerunt, calore sol-  
uūtur: Sic venus calfacit & humectat Hippo-  
crati, vt antè diximus, dum feruet scilicet  
ac exercetur, vti labore alio corpus sudore  
madescit. Galeno autē refrigerat, siccatur va-  
cuata per virgam & poros calidā & humida  
substantia. Sic panis durus modicē assatus te-  
nerefcit, quod humiditas aquosa non modò  
à farina absorpta ab igni extrahitur, sed à  
frigido etiam concreta calore colliquatur.

I Refrigerationē sequuntur contraria.  
Nam frigus crassat, & crassiorē reddit sub-  
stantiam, vt indicant sapor acerbus & auste-  
rus à frigido crudo in substantia crassa & ter-  
rea: sic terrea omnia ob frigiditatē sunt sub-  
stantie crassioris: & quò frigiditas maior, &  
diuturnior adest, eò crassiorē reddit materi-  
am: quod ostendūt lapides & metalla, piritia  
in nobis vitrea, humor melancholicus, ossa

& pa

& partes aliæ in nobis multum terrenæ facis habentes. Sic medicamenta & alimenta crassæ essentia ægrè penetrantia, si liquida sūt, ægrè comminabilia, si sicca sūt.

2. Frigidum gelat & glaciāt, ac durum cōcretionē facit, vt glaciēm, niuem, grādinem, crySTALLUM, succinum, & gummi reliqua, ac resinas, butyrum, adipē, sanguinem extravasa præsertim (hinc à frigido liuores, Aph. 17. & 20. li. 5.) pituitam, metalla, & cætera id genus. Sic scirrhum tam per se natū ex affluxu aut cōgestionē pituitæ, crassæ aut humoris melancholici, quàm succedentem phlegmonis, & erysipelatibus immodicè refrigeratis coagulauit frigidum. Pigros facit spiritus, & tanquam congelat. Hinc senibus & moribundis sensus omnis & motus imbecillus & tardus, & actiones reliquæ animales, vt vitales, naturales adiuuāt tamen imbecillitatem hāc corūdem spirituum inopia. Ob id etiam frigus somnolētos facit, stupefacit spiritus à frigido congelatos, & spiraculis in neruosa substantia contractis à frigido & densatis, per quæ spiritui via erat ad partes sentientes & motas: semen supprimit, & omnem hæmorrhagiam contractis etiam ab eodem meatibus, per quos & spiritus ferri & aliæ materiæ debent. Id ostendunt frigore torpētes partes ac stupefactæ.

aut

Aut narcoticorum contactu, animalia hyeme latētia mortuis similia, hypnotica sumpta, & fronti ac temporibus admota, noctes hybernæ somnificæ, Aph. 15. lib. 1. Vſus frequens caſei mollis, & lactucæ, & cæterorum ſomnificorum, quæ etiam ſemen gigni prohibent, & genitum ſupprimunt. Quod lami na plumbi lumbis admota etiam præſtat, & radix nimphææ & alia omnia frigida. Pituita item multa toto in corpore præſertim capite redundās, quo largior & frigidior, eò ſomnolētos magis & propè ſtupidos reddit.

*Lib. 2. loc. affect.*

*Cap. 22.*

*Li. 5. ſim.*

Frigus etiam glaciādo impinguat: nam à frigiditate partium neruoſarum ex aërea ſanguinis ſubſtantia per vaſorum tunicas exudante & exhalante fit adeps. Oſtendūt mulieres & caſtrata animalia ob frigus obefiora. Tenſa & rigida durat & glaciāt, maximè ſi erāt humida, vt ligna made facta, funes nautici ſub gelu hyberno declarant. Quid quòd vaſa ſamia, aſciæ, dolabræ, & alia id genus ferramēta in gelu mox rūpuntur: illa ſi liquorem habent, hæc ſi ligno adigas non præcaſta. Hinc à frigido diſtentiones & cōuulſiones, Aph. 17. & 20. lib. 5.

*Li. 2. tem.*

3 Frigilū denſat poros cutis & meatus omnes corporis internos, tñ occultos quān manifestos: ob id caſacti, ſi derepētē refrigerētur ſive potu largo frigida internis po-

*rit.*



Li. 9. met

ris, siue relictis vestibus, aut aliis calorificis, externis densatis, omnino febricitant: ob id febricitantibus noxius est aëris frigidi ad cutim occurfus, & frigida potus, nisi dicta ibi conditiones adsint. Mulieres item & spadodones, quia viris frigidiores, meatibus his omnibus sunt angustioribus. Adhæc hybernæ aëris, & aliorum frigidorum cōtactu pori nobis contrahuntur: & venarum angustia, hepatis arteriarum, & sæpe thoracis, cor frigidius declarant.

4 Frigidum repellit & intrò protrudit admotum: foras, sumptum: ob in fluentibus materiis opponitur. In ventriculum enim fluente sanguine refrigerantia & astringentia damus, sed minùs, quàm si sanguinis in eo coagulationem non timeremus. Idem frigidum admotum, aut foris incidens ex alto: tum cōtrahendo meatum, tum materiam velut glaciando, & sanguinis feruorem extinguendo fluxiones sistit. Hinc ferrum, ebur, frigida alia contusionibus recentibus applicamus, affluxurum sanguinem repulsuri: & eadem interscapulio è regione magnorum vasorum, vertici, fronti, naribus applicamus, fluere per eas sanguine immoderatiùs. Sic in artus fluxiones incipientes regerimus: si verò in partem penitiorē fluat materia, vt ischion, tunicā co-

Apho.  
23 lib. 5.

stas.

stas succingentem : aut si à parte principe  
 fluat materia , vt in parotidibus à cerebro  
 transmittente : aut si venenosa , pestilens,  
 crassior, impactior sit materia , nec frigida  
 nec astringentia adhibemus, sed digerentia  
 magis , minus pro variis indicationibus  
 hanc in rem necessariis : fluxionem verò in  
 hepar, ventriculum, lienem etiam ad motis  
 repellimus, in thoracem & pulmonem sum  
 ptis, libro II. methodi. Frigidum eadem  
 ratione catarrhos excitat compresso cere-  
 bro, & contenta in eo materia ad partes sub  
 iectas compulsas: si ante etiam Aquilone fri-  
 gido & sicco vento, alui duræ Hippocrati  
 Aphorif. 5. lib. 3. Quòd autem vulgus vespe-  
 re nudis pedibus super frigidam aream ali-  
 quantisper ambulando aluum sibi cõcitât,  
 sed etiam colicos dolores vehemētissimos,  
 vt in duobus vidi hoc mense Maio: id acci-  
 dit à frigido resoluta vi retentrice vētricu-  
 li, ac intestinorum. Facile enim penetrabile  
 frigus, vt calidum, per continētes sibi partes  
 permeat, vt etiam cerebrum tandem attingat.  
 Quod indicat torpor per calamum tre-  
 mentem, & lineam à torpedine pisce ad pi-  
 scatoris manus transiens, vt in libro loc. aff.  
 docet Galenus. Eadem vi succos biliosos  
 ventriculo innatātes absinthium, aloë, rha  
 barbarum, tamar Indi, prima subacerba de-

*Cap. vlti.  
 Lib. I. fo.  
 & libr. 8.  
 meth.*

orumpellunt: quos tria prima etiā clemēter ex partibus vicinis attrahunt. Qui autē partibus affixi sunt humores, astringēti sua qualitate prædicta omnia tenaciū affigūt, nisi amaro sapore anteuertant tergere, vt li. 11. method. de absinthio: sed vix passæ, præfertim nostrates, acidę magis, clibano siccatae, bacculæ, oxyacāthes, & similia pituitam multā in os alliciunt ex cerebro, quod partes oris ab his fugentibus, siccantibus, contrahentibus inanitæ attrahunt, iuuāte in id situ partis permittentis sublimi & liquidioris pituitæ prompto ad inferiora decubitu.

§ Frigidum coctioni tum alimentorum tum humorum in tumoribus tam cum febribus, quā sine febribus, & in venis, ac rotius corporis habitu aduersatur & resistit. Nam vlcera & tumores omnes reddit insuppurabiles, Aph. 20. libro 5.

Hinc frigidorum ventriculorum coctio tardissīma, sed appetentia plurima. Hinc etiam hydrops omnis frustrata & abolita sanguificatione, hepatis actione, refrigerati per se aut consensu aliarum partium. Frigidum etiam rem coqui coeptam, vt sic dicam, recrudat: ob id leguminibus coqui coeptis affusa, deinde frigida percoqui prohibet. Eadem ratione aqua puteana coqui promptē nequeunt legumina, nisi hæc  
antē

antè cocta sit: nam ob crassitiem glaciata  
 intro permeare ad coquendum non potest,  
 vti calore aliquo iam tenuata: qualis est flu-  
 uialis, præsertim si lōgiusculè absit à fontib-  
 us, hique orientē potius quàm septentrio-  
 nem spectent. Sic fructus omnes ac semina  
 autūni frigus intempestiuum & immo-  
 deratius percoqui prohibet. Quod verò  
 frigori tribuimus, idem calori imbecillo  
 (quem ferè frigus vocamus)tribuendum  
 est plantarum & animalium interno, atque  
 etiam externo.

6 Frigidum est inimicum cerebro, spiri-  
 tali medullæ, neruis, atque adeò neruosis  
 omnibus, & natura frigidis partibus, quibus  
 calidum est amicum, Aphorif. 18. libro 5.  
 Nam pars omnis intemperata, sed adhuc  
 intra fines sanitatis, à similibus suæ intem-  
 peraturæ causis promptè offenditur, transi-  
 itque in morbosam intemperiem. Modi-  
 co autem contrariorum vsu ad mediocritate-  
 rem transmutatur. Frigidum eadem ra-  
 tione calidis partibus amicum ostendit in-  
 spiratio: & si febris est, aut citra febrē in-  
 temperies cordis calida, quò calor est ma-  
 ior, eò frigidiorē aërē expetit: sic & arte-  
 riarum diastole, expiratio quoque & systo-  
 le distas partes refrigerant, quanquam per  
 accidens vacuantes calida & fuliginosa ex-

crementa, si tamen frigidior aër, nec antè fractus gargareone, & alios oris partibus in cor trahitur, lædit, vt docet Galen. in vsu gargareonis. Item in vulneribus thoracis aut capitis penetrantibus chirurgiam exercere oportet in aëre calido.

Sic frigidum, qualis est nix, glacies, thoraci nocet, tusses mouet, à quarum violentia ruptis vasīs, sreatū sāguinis excitat: cui nisi citò & tutò prospiciatur, phthisis, & hætica, & mors tandem superuenit. Cerebro item per refrigerantia compresso, destillationes, vt paulò antè dixi, fiant, Aph. 24. lib. 5. & ipsum à sudore, pluuia, vel alio refrigeratum nec recalfactum, largam gignit pituitā tum ex suo alimento, tum ex susceptis à corpore toto vaporibus, quos crassando promptè, affatim vertit in aquā: vt nostra capitella terrea, plumbea, vel alia materia, si linteo aqua frigida merso circundētur, largiorem aquā per capitellæ nasum mox profundunt. Mulieres refrigerato capite ab oleo Heræ ex nubicibus viridibus facto in raucitatem, grauedinem, destillationem inciderunt, lib. 1. cōp. ph. part. Multæ puellæ ablato saepe per lixiuium capillo, vt flauescat, nec siccato, in morbos à capite frigidos & graues saepe incidunt: præsertim quibus id erat frigidius vel natura, vel post natiuitatem.



7 Frigidum præter naturam & vehementius, tã internum quàm externum corrumpit, & enecat non animalia modò, sed plantas quoq; permultas, & (quod semel vidimus miserabili hominum calamitate) inter ipsas triticum ipsum. Vites enim frequenter penetrabile frigus adurit, sic vt quadam moriantur. Hinc multi iter agendo per niuosa loca mortui riguerunt, & quibusdam partes mortuæ deciderũt, extincto in his calore natiuo à frigore valentiore. Sic cor aut cerebrum frigere, mors est, vt paulò antè dicebamus. Cor enim caloris natiui fontem semper feruere oportet, cerebrũ frigere nõquam oportet, vt lib. de vsu pulsuum & partium. Ob id Hippocrati lib. 1. prognosticorum expiratio per morbos acutos frigida maximè est lethalis: minùs lethale est in eisdem morbis extremas partes frigere: magis genitalia, & nares, & aures, & partes alias capitis, quòd genitalia etiam inter principes partes referat Galenus cap. 9. artis medicæ hæ autem frigidum cerebrum declarãt. Sic interna frigiditas eodem calore vel extincto (vt Aph. 21. lib. 5.) vel foras expulso (vt cap. 5. lib. 4. Meteororum Aristo.) corrumpit.

Idem frigidum denigrat & obscurat. Indicat sanguis refrigeratus in parte aliqua per ecchymomata, aut aliter effusus, vel ex-

tra corpus aperto vase emissus: ostendit idē sanguis melācholicus. Mortuis quoq; timidis, tristibus, vigilibus, lōgo carcere clausis, decolorationem quandam & pallorē inducit, colorēq; plumbeū, vt initio lib. 12. meth.

*Aph. 21* Frigidū per accidens calefacit, carnosum  
*li. 5. & li.* enim estate media, in meridie affusa frigida  
*3. temp.* calefacit calore, primū intrò cōpulso, deinde  
*Aph. 15.* eiusdem intus aucti ad cutim reuocatio-  
*& 18. li.* ne. Quæ reuocatio si non fiat, sed paulatim  
*1.* calorem intus colligat, coctionē iuuat: ob  
*Libro 9.* id ventres hyeme & vere natura calidissi-  
*method.* mi: si verò imbecillus est calor, eum extin-  
 guit. Ob id cuti febricitantium occurrens  
 frigus eāque densans, calore febrili trans-  
 pirare prohibito, & inde intus aucto, febres  
 auget. Hinc diariæ, & interdum putridæ à  
 cute per frigus densata, & prohibitis ob id  
 excremētis diffilari, vt in febribus, & 8. & 9.  
 methodi, abundè docet Gale.

Frigidum etiam siccatur non ex prima fa-  
 cultate, sed per accidens, humectante mate-  
 ria quæ fluit, & quadantenus quæ fluxit in  
 vicinas partes per frigus ad motum expulsa,  
 siccatur quoque per accidēs, dum calorem ex-  
 pellit, quod is multam simul humiditatem  
 sibi pabulum educit, Galenus, lib. 5. simpli.  
*Cap. 4. li.* cap. 4. & Arist. cap. 5. libr. 4. meteororum: &  
*5. simpl.* Gal. lib. 1. comp. ph. gener.

· Frigidum per accidens humectat, compressam à se humiditatem in vicinas partes regerens: eandem à cerebro in partes subiectas depresses, ac in corpore defato humiditatem intus multā cōcludēs. Quo fit, vt nobis hyeme interna nō modò calidiora sint, sed etiā humidiora ob aëris nos ambientis frigus, effluuium nostræ substantiæ largiùs prohibens. Frigidum etiam per accidens nos humectat, non consumpta ab eo humiditate superflua aut etiā naturali. Quæ res quosdam impulit, vt negarent temperamentum frigidum simul & siccum posse consistere: quod tamen reuera aliquandiu consistit, semper non consistit, vt libro primo tempera. docet Galenus.

Has calidi & frigidi actiones ferè auget essentia tenuitas, moratur crassities: vtrūque enim cū tenui essentia prōptius in profundū subit, citius mordet ac vlcerat, in minima friatur, nisi lentor aut durities iuncta repugnet, cū crassa contra: hinc caustica crassæ essentia sunt dolorifica magis.

· Horum effectuum calidi & frigidi singulorum testimonia adscribere potui, sed non visum est, quòd illa nimis multa essent, & quòd sint testibus fidem facientibus, etiam puero perspicua. Ex problematis omnibus, & libris Hippocratis & Galeni

proferre nō fuerit difficile: cū in has qualitates primas & reliquas duas omniū propè effectorum causæ reducantur vel primo vel secundo & aliarum qualitatum interuentu.

*Libr. 7.  
metho.*

Siccitas & humiditas magis materiales sunt qualitates, minúsq; effīcaces, ob id earū actiones minus latè patēt, quā calidi frigiditamen otiosæ nō sunt, sed aliquid etiam agunt (vt in quatuor elementorum actionibus primariis & secundis probauimus) & actiones aliæ quædam primas has siccationem scilicet & humectationem sequuntur.

*Lib. 2. tē.  
peramēt.*

Siccatio enim durat: quādoquidē omne siccum si modicè calens siccum permanet, durum est. Id ostendit lutum æstiuo sole duratum, lateres etiam igne ficcati. Ossa item, cartilagines, ligamenta, & reliquæ corporis nostri partes solidæ, id est, crassæ & duræ, & animalium cæterorum, atque adeò plantarum omnium: maioris tamē & minoris ratione in singulis horū generibus latissimè fusa: ac etiā in vno alicuius corpore, in quo sunt ossa siccissima, ob id durissima, & quò sicciora sunt, eò etiam sunt duriora: caro & adeps & nerui sensifici minimum sicca & dura: in medio horum reliqua est latitudo magis & minús siccarum partium. Omnes verò tandē adeò siccantur: vt rigidæ ac inflexiles, duræq; fiant à calore nostro humidum

dum depascēte, & à ficcitate in nobis ignea.  
 sed multò largiore terrea. Vnde sanitatis  
 tuēdæ scopus est nō mediocris, ficcitatē illā  
 præproperam frangere, ac ne tam citò fiat  
 prohibere humectante victu. Idem ostendit  
 conuulsio ex inanitione omnis seu ficcita-  
 te, qualis plurima & periculosissima mor-  
 bis acutis superuenit. Item lapides, metalla, *Li. 1. pro-*  
 terrea denique omnia ob id dura, quòd sint *gnost. Hi.*  
 ficca, & quanto duriora, tanto ficciora & *Galen.*  
 contrà: dum vt dixi, modice calentia, talem *in libr. de*  
 retineant duritiem, cū terra ipsa elemen- *nat. hu.*  
 tum si vsquam inueniatur, sit adamante du-  
 rior ob ficcitatem summam.

Siccum autem quia bifariam siccat, duo-  
 bus etiā modis durat. Primo, humorē in po-  
 ris & spatiis contentum ebibendo. Deinde  
 alterando & ficciozem reddendo partium  
 essentiam, consumendo scilicet ipsarum hu-  
 miditatem. Possis alias ficcationes duas ad-  
 dere dictas libr. 7. methodi, sed remotiores  
 sunt, & quæ possint sub harū priore cōtine-  
 ri. Quod autē ficcās secundo loco diximus, *Ibidem.*  
 id est, quod etiam propriè durum efficit. Nā *Lib. 1. cō.*  
 durum repletionē est renitens: durū concre- *ph. gen.*  
 tione est congelatum & coagulātū. Siccanti-  
 a enim propriè & primariò nominantur,  
 quæ digerunt, & temperamentū ad ficciorē  
 statū perducunt, qualia sunt omnia vacuan-



ut præsertim insigniter, siue per se vacuent,  
ac nostram substantiam dissipent, ut medi-  
camenta purgantia, hæmorrhagiæ omnes  
tam spontinæ quàm medicæ, urinæ largio-  
res, ut in diabete: sudor profusior, ut in car-  
diaca affectione: semen largius, in venere: si-  
ue per accidens, ut inedia, aut vi stus tenuior,  
& quæ calorem acriorem reddunt, ut labo-  
res immodici, usus acrium, salforum, & reli-  
quorum immodicè calidorum. Adde omnes  
animi affectus, aërem calidum, siccum, &  
cætera, quæ corpus per se aut per accidens  
quouis modo vacuant.

*Lib. II. simpl.* Humectationem sequitur mollitio. O-  
mnia enim humida sunt mollia, si cū calo-  
re tantum modico humida perseveret. Ob  
id sanguis, pituita, & reliqui humores, quia  
liquidi consistentia sunt (licet horum quidam  
siccent) etiam molles sunt, & adeps mollis,  
magis quidem humidiorum animalium, qui  
proprie pinguedo dicitur: minus verò mol-  
lis & crassior terrosiorum, qui proprie adeps  
vocatur. Caro item mollis eunuchorum,  
puerorum, mulierum, utpote humidiorum:  
duriuscula, fossorum, nautarum, agricola-  
rum. Sic lutum & terra imbre irrigata mol-  
lescit, rubigo ferramentorum, oleo rubigo  
détium, aqua diacalciteos: adamas & calcu-  
lus in nobis, sanguine hirci calido: vnio &  
testa

testa oui, aceto; ebur zytho vel oxycrato, id est, posca mollicum fit tractabile: metalla quoq; singula suū habent emolliēdi genus, quod tractabilia magis ea sine igne reddat: quāquam ea etiā tū humida vere non sint.

Humectatio & ab ea mollitio fit vel penitissimē in totam partem nostrā, idq; per solam nutritionē, vel superficie tenus & per spatia rerum humectatarum inania nō autem per totum, qualis ea quæ fit a balneo vel foru aquæ dulcis, vel olei maturi. Hæc em spatia quidē inania humore suo replēt, & madorem quēdā solidis partibus addūt: earum autem substantiam totam nō reddūt humidiorē, seu humidum earum substantificum non verē instaurāt. Quāquā est credibile, tenuiore eius madoris parte humidū ipsum quadatenus recreari. Vera autem partium humectatio per solū fit nutritionem, hoc est, vacuatæ triplicis nostræ substantiæ repletionem, lib. 4. simpli. cap. 9.

Harum autem facultatū quasdā ratione prima & sola inuenimus, alias sensu interdū vnico: est quando etiā duobus & tribus & quatuor. Neq; enim calcem & niuem, quod candida sint, rosam quod rubra, vt calidam aut frigidā dicas, sufficit: sed tactus visui additus calcē calore causticā, niuē frigore glaciāntem inuenit, & nobis id firmiter persuad

*Ca. in the  
riaca ad  
Pisonem.*

suadet: ac inde saporem alium esse falsum, alium acrem, alium amarū, aut dulcem gustatus iudicat, vt calidum, frigidum, humidum, siccum tactus. Multorū item probationem ex odore molimur, & facultatis eorum robur ex vehementi exhalatione deprehendimus, vt virtutis imbecillitatem ex odore remisso. Propterea quæ in odoratorum genere sunt odoratissima, illa in eodem præstantissima putantur, vt post audies. Alia, calidi, frigidi, humidi, sicci significata, & singulorum exempla non protuli fuga sermonis prolixioris.

Coniugatas inuicē actiones primas calfactionē aut refrigerationem cū humectatione vel siccatione, quæ sequantur, secundæ vel tertiæ actiones, ex prædictis simplicibus colligere non erit difficile. Sunt autē facultates & actiones tertiæ, quæ vltcrius procedendo propè particulatim appellātur: vt sarcotica, colletica, epulotica, vretica, vomitoria, eccoproptica, errhinos, apophlegmatica, menses ciendi aut sistendi facultas, seminis generatrix, extinctrix, prouocandi, reprimendi. Quales magna ex parte primas simul & secundas sequuntur: vt sarcoticum siccū ad primum gradum: detergens, colleticum siccans & astringens: epuloticum siccans, ad secundum gradum valenter astringens.

Est

*Libr. 3.  
method.*

Est quādo in neutram possis apertè reii-  
tere hanc tertiam: vomitorium enim est  
hoc, illud vt bulbus vomitorius, nux vo-  
mica, agaricus, elleborus albus, non ob ali-  
quam qualitatem primam vel secundam,  
sed quia vel substantiæ suę raritate innatāt,  
vel stomacho sua substantia sunt contraria.

Sed quæ ex secundis desiderari possunt,  
& quæ ad tertias pertinent tum facultates  
tum actiones, sic accipe ex libr. 5. simpl. Gal.  
quorum exempla ex libris simplicium se-  
quentibus collocupletare possis.

Tenuātia sunt calida, tenuium partiū, vt  
cinnamomum, piper, zingiber, casia, aristo-  
lochia. Crassantia frigidā, crassarum par-  
tium, vt malicorium, balaustium, galla.

Durum est, cui caro nostra temperata  
cedit.

Molle, quod cedit carni eidē, id est, cuti.

Absolutè seu in summo, terra  
dura, aer, & aqua mollis.

In victoria seu excessu, os du-  
rum, caro mollis.

In collatione ad symmetrum,  
vel quoduis obuium, vel sei-  
psum dum habebat secundū  
naturam, id est, durius mol-  
lius, quo significato hic au-  
diendum est.

Corpus  
durum  
molle

*Plato in  
Timæo,  
& libr. 1.  
vsus par.  
Cap. 3. li.  
5. simpl.*

Valid

Corpus du-  
rum, id est  
seipso dum  
sanū erat,  
durius

Siccitate,  
quod pro-  
priè siccum  
dicitur, à

Cōcretionē,  
quod propriè  
durum dici-  
tur, à

Repletionē,  
quod propriè  
remittens di-  
citur, à

Valido et longo motu, solis assu,  
medicamentis siccantibus sum-  
ptis vel ad motum, inedia per ac-  
cidens siccante febre ardēte aut  
longa affectibus animi, vigi-  
liis, &c. causis siccantibus.

Vehementer frigido humore  
in partem affluente, vel in ea  
ob frigidam intemperiem na-  
to, vel à frigida ad motum ea  
congelato.

Latius superflui humo-  
ris aut vaporis in par-  
tem aliquam affluxu.

Humectatione.

Calactio-  
ne

Vacuatio-  
ne per fri-  
gidam, cali-  
dam, siccā

Laxa-  
tur.

Est  
mole

Tensio ar-  
ticuli vel al-  
terius

Siccitati plusculum humectatione  
Refrigerati immodicè, calfactione  
Inflammati, vacuatione humoris  
Scirrhum patientis emollientium, ut & ipsi usque



Cutis etiā tēditur à subiectis ei musculis tumētib<sup>9</sup>, vel à carnis copia. Partes etiā aliq<sup>ue</sup> tēdūtur repletioē quauis, laxātur à causis cōtrariis. Articuli verò ferè laxant<sup>ur</sup> humectatis ipsos ambiētib<sup>9</sup> ligamentis & tendonibus. Cap. 10.

Rarefaciēs est, quod poros cutis dilatat, calidum modicè, siccum minimum, tenuiū partium: vt chamæmelum, althæa, oleū vetus, chamæmelinum, ricininum. Cap. 13.

Debsans huic contrariū, poros cōtrahit, frigidum aqueū nō terreum, non aëreum, non astringēs: vt aqua frigida, semperuiuū, portulaca, tribulus viridis, lens palustris.

Anastomaticum, id est, ora venarum & arteriarum aperiens, est calidum, acre, mordax, crassarum partium, & terrenum: vt cyclaminus, allium, porrum, cæpa, fel taurinū. Cap. 13.

Stenoticum, id est, eadem ora constipans & contrahens, est frigidum, astringēs, crassarum partium, nō acre: vt bolus Armenia, & terrenorum corporum magna portio.

Attrahens, succos ex alto vehementiū euocat, calidum, tenuiū partiu: vt dictamnus, thapsia, sagapenum, fermētum, simus columborum & anserum, fex vini vsta, calx viua, sandaracha, quæ etiam incidunt, digerunt, rodunt: attrahens similitudine totius substantiæ medicamentum purgans & alexiterium post dicetur. Cap. 16.

Reper

Repercutiens, succos occurrētes in altum repellit, frigidum est, crassarum partium: quod si etiam astringit, multò magis repellit, vt acerba, austera.

*Initio li.* Modicè repellunt rosarum folia, flores,

*4. c. ph. p.* succus, ericę fructus, palmulę, capreoli vitis,

*lib. 6.* germina & folia rubi, canirubi, aspalathi,

cyperus, malobathri foliũ, radix spice nardi,

crocus, lycium, hypocisthis, magis acacia,

omphacium: maximè malicorium, balau-

stium, galla omphacitis, rhus vterq;, fructus

myricę, spina Aegyptia. Succus tamen ex

nucum vigentium corticibus expressus ma-

ximè astringens, tenuissimæ esse substantiæ

ostenditur, quòd lanarum substantiã totam

*Lib. 6. c.* & manus contrectantium penitus tingat &

*ph. part.* contumacissimè, ita vt generosissimis ab-

sterfionibus elui nequeat. Astrictionē enim

substantiæ tenuitas iuuat maximè, quòd

astringentia ob substantiæ crassitiem in al-

tum corpus penetrare non possunt, & den-

sata astrictaq; ab his superficie corporis cui

admoventur, viam sibi ad interiora præclu-

dunt, ob id partes inflāmatas minùs iuuāt.

*Cap. 10.* Emplasticum, id est, illinens, quod poris

corporis illitum tenaciter hæret, est glutin-

osum, terrenum nō acre, vt butyrum, adi-

pes, oleũ, resinę, gummi: sic aloë, bolus Ar-

menia, gypsum, farinę addito liquore em-

plast

plastica euadunt. Eadem sunt emphractica, id est, obstruentia poros suo lentore, quos tamē aloë sumpta amarore terget & aperit.

Eccatharticum, id est, poros omnes expurgans, est acre, partium per adustionē tenuium, non glutinosum, ut nitrum, aphroditrum, abrotanum, orobus, lupini amari, amygdalæ amaræ, & cætera nitrosa & amara, etiam si parum astringāt, ut absinthium: sed hæc & similia poros cutis non purgant, internos latiores purgant. Cap. II.

Hæc eadē sunt ecphractica id est, obstructionem tollentia pororum, tum internorum, ut hepatis, lienis, venarū: tū cutis. Præter ea (ut nuper dixi) quæ etiam astringunt. Hæc etiam sunt rhyptica generatim dicta.

Rhyptica speciatim sordem à cute & ulceribus tantum tergent, non etiam obstructa liberant, quia sunt amaris imbecilliora, falsa scilicet & dulcia: ut sal, mel, hordeum, faba, amygdala dulcia.

His cōtraria sunt emphractica, id est, obstructia multitudine, crassitie, lentore. Dulcia quoque hepar & lienem promptè obstruunt, quia ceu iucunda citò ab his rapiuntur ante coctionem.

Tergentia etiam pilos tenuāt, ut nitrum Lib. I. cō.  
ustum, nitri spuma, fistiles teste, pumex, bucinorum & purpurarū & cæterorū ostreo- phar. p.

rum testæ vstæ, tritæ, tenui cribro cretæ: sic ossa sepiæ etiam non vsta, alcyonium, struthij, bryoniæ, dracontij, aristolochiæ radix, veratrum, furfur, beta, lixiuium.

*Initio lib.* Tergēt modicè, farina fabarum, hordei,  
*7.c.ph.p.* ciceris, semen lini torrefactum: magis tere-  
*Libr. 2.c.* binthina, thus, mel despumatum, amygdala  
*ph.gen.* amaræ: valentiùserui farina, semen hormini, radix ireos, & panacis. Valèter tergentia omnino etiam digerunt, ob id valde ficcant.

*Cap. 18. li* Anodynum, id est, sedans dolorem, vacuata doloris causa, calidum primo gradu, tenuium partium: vt chamæmelû, panis calidus, lac, adeps anseris, gallinæ, suillus, .i. lib. *pharm.gen.* Narcoticum autem frigidum, crassum, vt opium, mandragora, papauer, hyoscyamus nomine tantùm abusiue anodynum dicitur, quia tactum stupefacit, sine quo non est dolor.

Odyneron verò, id est dolorificum, quicquid affatim alterat, aut continuum soluit.

*Cap. 2. 5.* Suppurantia in pus vertunt humorem tu-  
*6. 7. 8. lib.* mefacientem & carnem confusam: sunt calida quantum pars suppuranda, ita vt essentiam caloris augeant, qualitatem non intendunt, nec obtundant. Sunt & humida, sic tamen vt nec augeant, nec minuant humiditatem partis naturalem, quod saltē sit manifeste

nifestum & sentiri queat, sed aliquid excrementi in spaciis vacuis contēti per halitum digerant. Sunt denique emplastica, porisque obstructis essentiam caloris augment: ut hydrelæum, panis cum oleo, pix, adipēs, medullæ, gummi, radix althææ. Agunt igitur caloris quantitate: emollientia autē caloris qualitate: sunt enim calidiora nobis, & humiditatē excrementitiam, & naturalē partium humorem modicē desiccāt, phlegmonas, & alias dispositiones coquit myrrha, crocus, castoriū, thus, fœnigraci cocti succus, quæ & digerunt, præsertim myrrha.

Escharoticum, id est crustificum, ignis modo & cauterij corpus colliquat, & sæpe escharam facit, est calidum siccum quarto gradu, crassæ essentiæ, dolorificum: ut calx viua, sæx vini vsta: quanuis enim vrendo tenuiora seipsis euaserint, crassa tamen adhuc sunt essentia.

Septicum, id est putrefaciens, etiam causticum & vrens, sed parum vehementer, est calidum siccū minūs, essentiæ tamē tenuioris, exiguo morfu, & dolore aut nullo: ut arsenicum, sandaracha, chrysocolla, aconitū.

Cathæreticum, id est superficiem solam detrahens, & hyperсарcosin absumēs, vnde & sarcophagon quoq; dicitur, est calidum siccū minus quā septicum: ut flos Asiæ pe-

Cap. 14.

In fine li-  
br. 5.

Cap. 14. li  
br. 5. sim.

Ibidem.



træ, æris squamma, æs vstum non lotum.

*Cap. 15. li* Sarcoticum, id est carnem gignens in vl-  
*br. 5. simp.* cere cauo, est siccum ad primum gradum,  
*& libr. 3.* detergens modicè & sine morfu, non astringens: vt hordei farina, thus, & quæ plurima  
*Meth.* lib. 3, Methodi describuntur.

*Ibidem.* Colleticum, id est glutinans carnem in vlcere, est siccus sarcotico, astringit, nō terget: vt omnia acerba & austerà.

*Ibidem.* Epuloticum vel sinuloticum, id est cicatricem vlceri inducēs, siccatur & astringit magis quàm colleticum, non terget, vt æs vstū in dura carne: in molli autē lotum, malicorium siccum largiūs inspersum, & puluis tenuissimus cathæreticorū paucus, vlceri inspersus, cuspidē specilli.

*Cap. 21.* Vreticum seu diureticū, id est vrinas mouens, mediocres quidem eccatharticū, plurimas verò acrius, calidius, siccus medicamentum: vt semē apij, petroselini, fœniculi, dauci, & quæ lac augent, ac menses cient.

*Cap. 20.* Lac gignunt  
*& 22.* ex sanguine

Pauco, victus calidus, humidus, plenior.

Pituitoso, calida primo vel secūdo gradu, non siccātia, vt eruca, anethū, fœniculus, virētia.

Biliofo, purgātia bilē, victus calidus, humidus.

Mens

Mēses mouētia calida sunt magis,quā  
lac gignentia,& sicca modicè:vt sabina,ca-  
laminthe,pulegium,daucus,& alia permul-  
ta:quorum catalogus exprimeretur in syrupo  
arthemisiæ.

Semen gignentia & prouocantia calida  
flatuosa,bene nutrientia,vt bulbi,fabæ,scin-  
cus,satyriion,eruca.

Semen extinguentia & corrūpentia, re-  
frigerantia,desiccantia,totis substātiis con-  
traria:vt nymphæa.Sic ruta,agnus,suo calo-  
re seminis substantiam consumunt.

Semen supprimunt frigida alimenta, &  
medicamēta sumpta & admota,vt lactuca,  
blicum,atriplex,cucurbita: quæ ipsum co-  
gunt,incrassant, stabile reddunt.

Cathartica,id est purgatoria,vel commu-  
niter quæ excrementa quouis modo va-  
cuant(vt bechica,errhina, apophlegmatif-  
mata,vretica,menses mouentia)vel per ex-  
cellentiam,quæ vomitu aut vētris deiectione  
humorem sibi familiarem trahunt,non  
solo calore sed qualitatū quæ in substan-  
tiis sunt,proprietate,seu totius substātiæ si-  
militudine,& simili elementorum quatuor  
mixture. Quæ res sola expertētia cogno-  
scitur,quamuis in quibusdam calor aliquid  
eius insinuet,id tamē nō certò,vt aloë rha-  
barbarum,flaua & amara bilē flauū & ama-

*Cap.19.li  
br.5.et 23.  
24. & se  
quentibus  
libr.3.sim.*

ram trahunt: & myrobalanus, citrina. Cnicus autem & elleborus albus, & turbith album, & agaricus albus, pituitam: elleborus niger, myrobalanus Inda & nigra, humorē melancholicum. Trahit autem medicamentum humorē, non trahitur ab humore, quia ob calorem suum est potentius in attrahendo: sunt enim omnia sic purgātia potestate calida. Eadem si non purgant, cocta in humorem transeunt, qualem attrahunt: nisi quod horum quaedam in nobis corrupta in venenum abeunt.

*Apho. 24.  
lib. I.*

*Cap. 26.  
27. libr. 3.  
simplic.* Hypercathartica, id est superpurgātia, sunt ex his valentiora viribus aut quantitate, & quæ vacuato humore sibi familiari, eū deinde trahūt, qui ob tenuitatem, calorem, liquiditatem, est ad sequendum paratior: postremò sanguinem naturæ maximè familiarem. Morfu enim suo venarum ad ventrem pertinentium ora laxant & aperiunt, vasaq; ipsa reddunt imbecilla ob fatigationem & intemperiem. Hæc aliis sunt vacuanda vel obtundenda, ut cesset hypercatharsis.

Bechica sunt tam quæ tussim excitant, ut cap. 17. libr. 2. quàm quæ eā sedant, ut cap. 1. lib. 5. & bechicæ hypoglottides in compositione medi. part.

Ecstatica, id est mētem alienantia, ut croci magna copia, solanum manicum.

Euchy

Euchyma sanguinē bonū gignētia, hoc est, rubentem, crassi & tenuis medium.

Cacochyma, quæ biliosum, vel pituitosum, vel me. ancholicum, vel aquosum gignunt.

Epicrastica, quæ paulatim bonū succū sufficiunt in locum mali paulatim vacuati, vnde epicrasis, Gal. libr. 9. meth. Sunt etiam quæ obtundunt aliorū malignitatē vel morsum, vt vua passa mordētes mediocriter stomachū, humores obtundit, lib. 2. alimento.

Exasperantia, quod lenius vel mediocre in cavitatibus fuit, & excremētis, vt acerba, austera, cruditate parientia.

Leniētia asperatas cavitates, vt oua mollia & recentia: item dulcia asperam arteriā lenē faciunt, & cancani herbæ radix, gummi, tragacantha, glycyrrhiza, vina dulcia.

*Ga. inf. m  
pli. & lib.  
7. c. ph. p.*

Quæ ex dictis facultatibus qualitates primas, vel simplices, vel cōiugatas nullius alterius interuentu sequuntur, vt molliens caliditatem, humiditatem: durans frigiditatem, humiditatem: laxans, humiditatem: tendens, siccitatem: hypnotica frigiditatem, secundæ sunt: etiam si adsit substantiæ tenuitas vel crassities adiutrix, vt crassans, repellens, astringens, stipās, frigidam, crassam: rarefaciens, digerēs, attrahens. anodyna, hydrotica, vretica, calidam, tenuem

Substantiam sequuntur:aperiens,detergens,expurgās,caustica,calidam crassam. Præter quæ multis etiam adest substantiæ similitudo,vt in purgantibus,lac & semen generantibus facultatibus,quæ rectius in tertias reiciuntur,vt quæ primas simul & secundas sequuntur:qualis etiam sarcotica calida attrahens,detergens,siccans:epulotica siccans,astringens:colletica siccans,cogens,& cætera,quæ suprâ retulimus. In quibus exëpla plura si requiris,ex libris simplicium sequentibus quintum sufficere possis.

*Facultates quartæ.*

*Capit. I. lib. 12. simp. lib. 15. simpli.*

Magis etiam procedendo,ad particulares peruenitur facultates,quæ à partibus vocantur cephalica,cardiaca, stomatica, stomachica,hepatica,splenica,vel à morbis partiū ischiadica,nephritica,podagrica,colica,pleuritica:vel ab effectis,bechica,λίθωντρον, id est, calculos cōminuens,sarcotica,colletica,epulotica,cathartica,cathartica,carnem super ossa nuda creans,foetum corrumpeus,foetum extrahens,ad chœradas discutiendas,ad epilepsiam,spasimū,& alia propè infinita similiter dicuntur. Tamē sarcotica,colletica,epulotica,tertiæ dicuntur,lib. 6. comp. ph. gen. & aliæ ex tertiis inter quartas recenferi eadem ratione possunt:vt lac,semen,menses,vrinas,sudores respicientia. Reuerà enim quædā horū ambigunt,& vtri



utriq; generi vicina sunt. Ob id Auerrois. v. col. cap. vltim. tertiam & quartā in vnā miscet. Alij quatuor hæc facultatū genera aliter distinguunt, vt primæ sint calfactrix, refrigeratrix, humectatrix, siccatrix: secundæ, quæ primos effectus primarū sequuntur, vt vis aperiēdi, claudendi, erodens, glutinatoria: tertię, quibus medicamenta vnā partē magis, quā aliam respiciūt: quartæ sunt à virtute & forma occulta seu specifica, vt purgatrix, venena expellens. Quibus vreticam & hydroticam mirum est per hos adiungi. In quorum multis sufficit dicere hoc hæc tenus calidum, frigidum, humidum, siccū tenuium partiū, vel crassarum, amarū, vel alio sapore præditum. Hic enim certius medicamentorum tēperiem & facultatem declarat.

Sapor enim acerbusterreus, ob id frigidus, crassæ substācię, refrigerat, crassat, densat, constringit, repellit in superficie potius.

Austerus illi temperamento & facultate in ipso sita, proximus est & insipidus.

Acidus, aquosus, frigidus, tenuis citra calorem, incidit, tenuat, mordet, obstructions liberat, repurgat.

Dulcis, calidus modicē, coquit, maturat, laxat, rarefacit.

Oleosus, aqueus & aëreus, humectat, laxat, mollit.

dit, tenuat, vacuat ex æquo in omnibus corporis partibus: cum præonia verò aut bethonica coctum id valentiùs in capite præstat: cum capparibus aut tamarice in liene: cum eupatorio in hepate. Quæ igitur capiti tota sua substantia sunt familiaria, vñu maiorum probata, & practìcorum, quos vocant, sunt ferè hæc.

## C E P H A L I C A.

## C A L I D A S I M P L I C I A.

Bethonica  
Maiorana  
Salvia vtraque  
Ruta vtraque  
Calaminthe vtraque  
Satureia  
Hyssopus  
Pulegium  
Melilotus  
Chamæmelum  
Stæchas vtraque  
Lauri folia & bacca  
Acorus verus  
Præonia vtraque: sed  
mas potior fœmina  
Aristolochia omnis  
Cubebæ  
Nux moschata

Moschus.

Ambra

Colocynthis

Castorium.

## F R I G I D A S I M P L I C I A.

Rosa

Viola

Myrthi folia, flores  
bacca

Salicis folia, flores

Nymphææ vtriusque  
flores

Caphura

Quæ verò his sunt frigidi-  
ora & narcotica, sunt vñu pericu-  
losa.

Hyoscyami folia &  
flores & semen

Man

Mandragoræ radicis	Diambra
'cortex	Pliris duplex
Cicuta præsertim ma	Aromaticum, rosatū
ior & cruda	Tinnitui auriū oleū
Papauer, præsertim ni	balaninum, philo-
grum, & ex eo opiū	sophorum, euphor-
Nymphææ folia re-	bij, laurinum pro-
centia.	sunt.

FRIGIDA COM-  
POSITA.

Electarium de gem-	Saccharum & mel
mis	Rosatū,
Aurea Alexandrina	Violatū,
Elect. <i>Si ἀρωματῶν</i>	Nymphæatum.
Dia castoriū	Dia morōn verò, &
	dia caryōn Phleg-
	mōis oris cōueniūt.

PNEVMONICA, THORA-

CICA, PLEVRITICA.

CALIDA SIM-	Saccharum & mel
PLICIA.	Hysopus, Prasium
Glycyrrhiza	Iris, Calaminthe
Vuæ passæ	Origanum
Amygdalæ dulces, &	Bralsica
ex his oleum	Enula, Squilla
Strobyli, id est, nuclei	Radix maluæ & al-
pinei	thææ
Pistacia recentia	Crocus, Myrrha
Dactyli	Spica, Pulmo vulpis.
Auellanæ	Agaricus.

FRIGIDA SIM- PLICIA.	Dia penidion
Hordeum	Dia hyssopi
Lac vaccinum	Dia prafij
Amylum	Dia diuæ
Semen bombacis & papaueris	Dia calaminthe
Viola	Dia iris
Iuiubæ	Linctus de pino, de squilla, de brassica.
Sebesten	
Psyllum	FRIGIDA COM- POSITA.
Adiantum omne	Dia penidiõ sine spe- ciebus.
Mora	Saccharum violatum
Santala	Dia tragacathum fri- gidum.
Gummi acaciæ	Electarium resum- ptium.
Tragacantha.	
CALIDA COM- POSITA.	C A R D I A C A.
	CALIDA SIM- PLICIA.
Amomum	Buglossum vtrunque
Cardamomum	Ozimum
Cinnamomum	Polium
Xylaloë	Rosmaris
Cubebæ	Mentha
Caryophyllum	Melissophyllon
Doronicum	Cortex citri
Enula Campana	Crocus
	Moschus
	Ambra

FRIGIDA SIM-

PLICIA.

Rosa

Viola

Nymphæa

Aurum

Argentum

Sapphyrus

Hyacinthus

Smaragdus

Uniones

Corallium

Ebur

Santala

Succinum, Caphura

Terra sigillata

Belletzicæ myrob.

Os à corde cerui

Semen oxalidis

Sericum crudum

CALIDA COM-

POSITA.

STOMACHICA, GA-

STRICA.

CALIDA SIM-

PLICIA.

Amomum

Cardamomum

Cinamomum

Diambra

Dia margaritum ca-  
lidumExhilarans Galeno  
adscriptum

Electariū de gemmis

Confectio alkermes

Aromaticū rosatum.

FRIGIDA COM-  
POSITA.Diarhodum sine spe-  
ciebusSaccharum rosatum  
& violatumSyrupus rosatus &  
violatusDia margaritum fri-  
gidum

Electariū triū fantal.

Frigidi fruct<sup>9</sup> conditi

Trochisci de bolo

Trochisci de caphur.

Zingiber

Piper omne

Nux moschata

Macis

Caryophyllum

Xylaloē



Xylaloë

Spica, Cassia

Cortex citri

Saluia

Mentha

Absinthium

Maiorana

Anisum

Cuminum

Mastiche.

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Rosa, Viola

Malum granatum tri-  
plex

Cucumer

Cucurbita

Melones

Pyra

Cydonia & cæteri  
austeri fructus

Portulaca

Lactuca.

H E P A T I C A.

CALIDA SIM-  
PLICIA.Absinthium præci-  
pue PonticumCALIDA COM-  
POSITA.

Diacydonium Gal.

Diagalanga

Diacuminum

Dianisum

Dia trion pepereon

Oleum cnici & pipe-  
rum

Zingiber conditum

Cepulae myrob. con-  
ditæ

Cortex citri cōditus

Aromaticū rosatum

Elect. stomachicum.

FRIGIDA COM-  
POSITA.Saccharum & syrup.  
rosatus, violatusCydonia, aut persi-  
ca, aut fructus alij

austeri conditi

Diasantalon.

Schoenu anthos

Spica nardi

Cinnamomum

Calamus Aromati-  
cus

Mala

Malabathrum	Lactuca
Asarum, Apium	Viola
Fœniculus, Anisum	Solanum
Ammi, Daucus,	Semina quatuor fri-
Squilla	gida, maiora & mi-
Cicerum decoctum	nora quæ vocant.
Eupatoriū, id est agri-	Santala
monia	Caphura
Chamædrys	Ebur
Fumaria	Adiantum omne
Cassutha	Ruscus & asparagus
Amygdalæ amaræ &	media esse possunt:
dulces, & cætera pro-	tenuitate tamen ef-
pè amara & dulcia,	sentia obstructio-
quæ ipsum tamen	nes liberant.
promptè obstruunt	
pæter saccharum &	CALIDA COM-
vuas passas.	POSITA.
FRIGIDA SIM-	Rosata nouella
PLICIA.	Antid. de aromati-
Lichen, id est, hepa-	bus.
tica.	Diarhodon abb. cum
Intybus vterque	speciebus
Cichorium omne, vt	Dianisum
scariola, cicerbita,	Diacyminum
hieracium, chon-	Diacalaminthe
drilla	Diospoliticum
Oxyacantha	Trochisci de rha bar-
Portulaca	baro.

FRIGIDA COM-	ne speciebus
POSITA.	Saccharum rosatum
Diasantalon	& violatum
Ceratum santalinum	Trochisci de caphu-
Diarhodum abb. si-	ra.

## S P L E N I C A.

CALIDA SIM-	FRIGIDA SIM-
PLICIA.	PLICIA.
Thymus, Epithy-	Cortex radicis Ta-
mus Græcorum &	maricis, & folia &
Arabum	fructus
Genistæ flos	Asplenum, id est, ce-
Cortex radicis eiuf-	terach
dem & capparis	Adiantum omne
Cortex medius fra-	Intyba & Serides
xini, & Sambuci	Semina quatuor fri-
Scordium	gida, magna & par-
Chamædrys	ua.

Chamæpitys	Lacrymavitis et folia.
------------	------------------------

Buglossum vtrum-	CALIDA COM-
que	POSITA.

Rubia, Nasturtium	Diacalamithe
-------------------	--------------

Afarum, Calamithe	Diacyminum
-------------------	------------

Acorus	Acetum scillites
--------	------------------

Agnus	Dia hammoniacu
-------	----------------

Hammoniacum	emplastrum.
-------------	-------------

Bdellium	FRIGIDA COM-
----------	--------------

Castorium, & fere	POSITA.
-------------------	---------

quæ hepar respiciunt.	Diasantalon
-----------------------	-------------

Ceratum santalinum id est, de ben, & de  
 Acetum, præsertim hammoniaco, & si-  
 album, atque adeò milibus: ad scirrhus  
 destillatum, sed id lienis, vt ipsa bala-  
 calidius est. nus myreplica, apta,  
 calidis addi potest.

Oleum balaninum,

**N E P H R I T I C A, C Y-**

**S T I C A.**

**C A L I D A S I M-**

**P L I C I A.**

Abrnotanum

Eryngium

Eruca

Vrtica

Saxiphagum

Lichospermum

Iuniperi baccæ

Radix Appij,

Rufci

Asparagi, Fœniculi

Dauci, & horum se-  
 mina

Cubebæ, & propè  
 quæ hepatis & lieni  
 calida conducunt,  
 & vretica.

**F R I G I D A S I M-**

**P L I C I A.**

Plantago vtraque

Nymphæa vtraque

Hordeum

Semen psilij

Lactucæ, Portulacæ

Intyborum & Seri-  
 dum

Papaueris albi,

Frigida semina ma-

gna, id est, Peponū,

& Melopeponū, Cu-

cumeris, Cucubita,

Citreoli quæ vocant.

**C A L I D A C O M-**  
**P O S I T A.**

Zingiber conditum

Oleum scorpionum

Emplastrum de bac-

cis lauri.

Syrup. de duabus &

quinque radicibus.

Oxymeli scilites.

**F R I G**

FRIGIDA COM-  
POSITA.

Ceratum santalinum  
Syrup. nymphææ,

Violarum, & cæte-  
ra propè quæ hepar  
& lienem refrige-  
rant.

## H Y S T E R I C A.

CALIDA SIM-  
PLICIA.

Arthemisia

Sabina

Calaminthe

Origanum

Pulegium

Parthenium

Melissophyllum

Aristolochia vtraque

Gentiana

Valeriana

Rubia

Ruta

Cinnamomum

Calamus Aromati-  
cus

tia, & menses mo-  
uentia.

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Corallium vtrunque

Nymphæa vtraque

Bilauſtium

Galla

Polygonium vtrunq;

Semperuiuū vtrūque

Portulaca, & propè a-

lia, quæ renes refri-

gerant, & menses

ſupprimunt.

CALIDA COM-  
POSITA.

Diacalaminthe

Dianisum

Diambræ

Diaſatyrium

Tryphera magna ſi-  
ne opio.

Oleum amygdalinū  
vtrūque, nardinum

Schœnu anthos

Spica

Myrrha

Opopanax

Mofchus

Ambra, & cætera pro-  
pè renes calfacien-



Aromaticū moschatum FRIGIDA COM-  
POSITA.

Oleum rutæ, croci, Diasantalum  
philosophorum. Ceratum santalinū.

# ARTHRITICA.

CALIDA SIM-  
PLICIA.

Nasturtium, Sinapi

Chamædrys

Chamæpitys

Hermodactylus

Herba paralysis phlo-

midum species

Scilla

Rhaphanus

Enulla Campana

Origanum

Pulegium

Calaminthe

Porrum, Asarum

Ruta, Acorus

Terebinthina

Myrrha

Oopanax

Bdellium, Hammo-

niacum

Sagapenum

Syrax, Galbanum

Euphorbium

Castorium

Cassiani-

gra

Stercus

vaccinū

Panis ca-

lidus

Sapa

Oesyphus

admo-  
ta em  
sunt  
ano-  
dyna.

FRIGIDA SIM-  
PLICIA.

Acetum

Aqua rosarum

Myrti partes

Psyllium

Bolus Armenia

Intyba & Serides

Lactuca

Semperuium vtrū-

que

Solanum

Opium

Hord

Hordei cremor	Oxycroceum
Folia hyoscyami pa-	Ceroneum
rum calfacta	Diachylon
Folia cicuta parua	Diameliloron
torrefacta.	Oxymeli scillites, &
CALIDA COM-	catera quæ cerebrū
POSITA.	& nervosas partes
Oleum auellandarum	calfaciunt.
& seminis arariorū	FRIGIDA COM-
Oleum vulpinum	POSITA.
Oleum balaninum,	Oleum rosarum &
id est de ben.	deranis.
Oleum ex lapide ga-	Vnguentum popule-
gate, & styrace, & eu-	um
phorbio.	Syrup. limonum, &
Oleum laurinum, &	catera renes refrige-
ex nucleis cerasorū	rantia.
Oleū Philosophorū	Oxycratum. i. posca.

Quoniam purgatrix facultas inter quar-  
tas quoque continetur, vt dictum est, paucā  
de purgationis ratione, & singulos humo-  
res purgantibus medicamentis etiam hic  
adscribenda sunt.

Purgatio est humorū sua qualitate mole *Ga. Ap.*  
storum vacuatio: siue enim hi calidiores, fri *2. lib. 1.*  
gidiores, humidiores, sicciore, aut per cōiu-  
gationem harū qualitatum à sibi mediocri  
temperamēto recesserint idoneo ad sagui-

nis probi constitutionem, siue aucti immodice iustam sibi proportionem sanguini inculcato componendo necessariam supergressi sint, semper qualitate ipsa molesti videntur, ergo vacuandi: sed prius ad expulsionem apparati. Corpora enim cum quispiam purgare velit, oportet fluida facere, hoc est, humores crassos tenuare, lētos incidere, & tergere, & fluxiles reddere, ac meatus aperire, per quos faciēda est vacuatio. Tūc autē concocta medicari, atq; mouere oportet nō cruda: quanquā verò hæc propriè coctionem à natura in morbis salubribus factam loquātur: abusu uē tamen humorū expellendorum apparationem pēdictam Medici etiam coctionem appellant, fortè quòd crassum dum est tenuatum, habile magis est, ut à natura coquēte vertatur in alimentum, si quid in eo relictum erat benignū, reliquū ad expulsionem promptiorem secernatur. similiter dū lentū est incisum, & detersum, & fluxile. Eadem ratione practici addūt bilem flauam esse coquendam, ut quanuis ad vacuandū sit maximè habilis ob caliditatē, tenuitatem, leuitatem: tamen ne eius vis tā furiosa partibus noceat cōtinentibus, aut in quas trahit, aut per quas excernitur refrigerantibus obtundēda eis videtur: quòd etiam hoc modo si quid in ea benignum super sit, à nat

à natura separetur felicius, ac coquatur, ac minus putrendo, quod prauum est mitescat: suam fortè sententiam ex his Galeni atque Hippoc. locis tuentes. Tertianæ exquisita quæ lōgissima est, septenis circuitibus finitur, & ardētes die septimo per crises finiri solēt, cocta à natura materia biliosa, & expulsa. Chamæmelum sanat febres biliosas, & ex curis densitate natas, easq; percoctas. *Ap. 59. libro 5.*

Signa coctionis prauorum humorum in pleuricide per sputum, in affectibus ventris inferioris per deiectiones, in febribus putridis & affectibus venosi generis per vrinas colligit Hippocr. Galenus, in Aph. progno. crisis, libris therapeuticis.

Humorem crassum & lētum & flatulentum, & saniem acrem & mordacē in oculū affluentē, & fluxionem à capite in pulmones, & lassitudinem tensiuam, & phlegmonē, in libris de compositione pharmac. particular. coquit Galenus. Crocus & Myrrha ibidem coquere dicuntur humores prauos & præter naturam in pulmone & stomacho. Ergo morbi omnes, & materiæ omnes prauæ coqui à Medicis interdū dicuntur abusive: nā propriè à calore moderato in benignū rei coquētis alimentū versio est coctio: quæ etiā in morbis sanguineis fieri videtur, dum pus ex sanguine in phlegmo-

*Li. 3. simplici. ca. 9.*

ne fit à calore etiam natiuo, & hypostasis in vrinis per febres: sed ea est imperfecta, cum à solo calore natiuo non fiat, verum etiam ab eo qui præter naturam est, putrefactio addatur.

*Li. 6. sim  
pli. in an-  
chusa.*

Quid quod bilis flaua seipsa interdum multo crassior efficitur, dum vitellina, ærugino-fa, isatodes euadit? An non tunc apparanda expulsionem est? Aut cur Galenus extenuandis & tergendis humoribus biliosis anchusam onocleam subamarā sufficere affirmat? Afferrem Actuarium bilem coquere zulapils quibusdam in purgantibus bilem, nisi facere Arabicam resipere ipsum velle mox audire.

Medicamenta igitur purgantia humorem sibi familiarem tota sua substantia trahunt sumpta, & quod magis mireris, admota horum quædam. Bilem enim flauam vacuant.

## CHOLAGOGA.

Aloë	men
Abfinthium	Sambuci & Ebuli fo-
Scammonium	lia, & semina
Fumaria Dioscorid.	Colocynthis fru-
Thlaspis semen	ctus siccus
Sesamoïdes vtrunq;	Empetrum & Poly-
Cucumer agrestis	podium eadem.
Pepli & Peplidos se-	Addunt cum Arabi-
	bus



bus recentiores,	Cassiam fistulam
Mannam, seu mel aë-	Rha barbarum
rium	Rosas, p̄cipuè dictas
Tamar Indos	vulgò incarnatas
Myrobalanos, præ-	Violas nigras seu pur
fertim flauas	pureas.

## B I L E M A T R A M.

Epithymum	Addunt iidem,
Pulegium	Lapidem Armenium
Tragoriganum	lotum Alex. Trall.
Parthenium	Lapidem stellatum
Armenius lapis	seu Cyaneum vul-
Centarium minus	gò lapidem laxu-
Elleborus niger, sed	li
hic deiectione, vt al	Sennam
bus vomitu.	Efulam.

Cap. 5.  
Libr. 2.  
simpl.

## P H L E G M A G O G A.

## P I T V I T A M.

Cnici semen	Ricinus
Coccum gnidium	Scammonium,
Hypophaes, Galenus	Chamælæa
libro 1. fac. nat.	Thymelæa,
Lathyrus & Tithy-	Sambucus
-mallus omnis	Ebulus,
Cucumeris syluestris	Colocynthis
radicis cortex	Elleborus vterque
Styrax pinguis & fla-	Polipodium Diosco-
uus	rid.
Daphnoïdes,	Addunt cum Arabi-

bus recentiores,	Sagapenum
Turbith	Opopanax
Hermodactylos	Euphorbium,
Sarcocollam	

### HYDRAGOGA, AQUAS DVCENTIA.

Granum gnidium e-	i. facul. natur.
tiā phlegmagugum	Ricinus,
Galeno	Lactuca syluestris

*Libr. the.* Aes vstum, & lotum, Tripolij, & Hemero-  
*ad Piso.* æris flos, æris squa- callis radix  
 ma. Sambucus

Chamædrys,	Ebulus
Chamæleon, Gal. lib.	Tithymallorū gña.

### PITVITAM ET AQUAS.

Squama æris	Chamælea, etiam bi-
Euphorbium	lem.

Ex his patet, quædam etiam plures humores trahere, vel ob actionis vehementiam, vel ob diuersas in toto ipso substantias diuersas, Nam trahunt.

### FLAVAM ET ATRAM

BILEM.

Veratrum nigrum, quod etiā phlegmagugum quibusdam est.  
 Fumaria.

### BILEM VTRANQVE ET PITVITAM.

Peplium	Polypodium.
---------	-------------

Bilem

BILEM ET PITVITAM.

Colocynthis	cus.
Elleborus albus	Thymus
Tithymallus	Ciclamini radix
Elaterium	Chamapitys
Agaricus	Empetron eadem, &
Aristolochiæ, Cle-	præter hæc aquas
matidis fructus sic-	Diosc. & Galen.

Sanguinem purgari tradunt porrorû capitatorû succo mercuriali, viola alba, sylvestri malua, salvia, veratro albo, quod & bilẽ vacuat: nō quod illa sanguinẽ foras trahāt, sed quod vel ipsum ab humoribus corruptis expurgāt (qua ratiōe omnia propè purgātia medicamēta dici queūt sanguinẽ purgare) vel quod actionis vehementia ipsum trahūt in hypercatharsi: vel quod ipsum tenuatum calfactū ad venarū exitus promoueāt: qualia quæ sumpta hæmorrhoidas promouēt, menses cient, vrinas cruētas excitāt: hama-gogum inde dictū medicamentū, vt cicer, præsertim agreste, & alia multa Galeno in simplicibus. Quæ enim herba corpori ad-mota per poros sanguine educto homines *Li. 1. fac.* necabat, cognosci desiit magno mortalium *nat. & li.* commodo. Recipimus ergo medicamenta *theriacæ* facultate quadā natiua cōuenientē sibi suc- *ad Pison.* cum trahere, quomodo partes tam anima- *& lib. de* lium quàm plantarū singulæ alimentū tota *nat. hu.* subst

substantia sibi familiare, & amicum, & conueniens trahunt: & magnes ferrum, & electrum, id est, succinum, palea, & alia huiusmodi à natua quadam facultate conuenientis attractrice.

*Galen. in  
theriaca  
ad Piso.*

Admiratione eadē dignum est, feras venenosas cum corporibus suis nostro sint inimicæ, & tam subito nos perimant, moribus à se factis succurrere & solas hominem à tali periculo vindicare: quod scilicet simile retrahat ad se sibi simile, suamq; substantiam in se reuocet. Quapropter à crocodillo lesis, ipsius adeps vulneri impositus, summo est præsidio.

Morsus muris aranei etiā lethalis sanatio, citra dolorem fit mure ipso trito & imposito. Morsus viperæ ipsa vipera trita & imposita sanat: & theriaca ipsa imposita, atque etiam sumpta, aliarum etiam ferarum omnium venenatorum moribus efficax.

Huc pertinet nonnullorum natua quadam totius substantiæ societas, ex qua si iungantur, & iuncta seruetur, vis quadam mira consurget. id quod maiorum experientia longa probatum pro experto & certo recipimus. Ob id composita medicamenta usurpamus, quæ à prioribus Medicis iisq; insignibus vehementer commendata fuerunt: neq; negligimus, quæ recentiores experientia longa comprobarunt.

*Quid*

Quid quòd alexipharmaca quædam sic *Libr. 5. c.*  
venena trahunt sumpta, si fumantur, aut ad- *ph. p.*  
moucantur ictui vel morsui venenoso, ut  
venenum ipsis insidens videas.

Nec solùm venena trahunt, sed plurima  
etiam aculeos & spicula indolenter è cor-  
poribus nostris extrahunt, quæ nulla vi no-  
stra educere antè licebat.

Vt autem rebus quibusdam magna inter  
se est cognatio, naturarumque similitudo  
(quod præter dicta generationes quoque ani-  
malium, & insitiones plantarum ostendunt,  
ut Hippocrates docet lib. de natura homi-  
nis) ob quam hoc illud trahit, hoc illud non  
lædit: ut euphorbium ventrem ouium so-  
lùm non erodit, ut in eo seruari possit, qua-  
liter in folliculo suo bilis: ita aliis odium  
est manifestum non modò animalibus in-  
ter se, sed etiam plantis inter se, & plantis &  
animalibus in homines, & in certas quasdam  
hominum partes, aut partium affectus.

*Libr. 9.  
c. ph. a. p.*

Brassica & hederæ, vitæ & ebrietati ad-  
uersantur.

Allium magneti affrictum, & oleum suc-  
cino, attractionem horum peruertunt, &  
ille ferrum abigit, hoc paleas etiam oleo  
imbutas.

*Libr. the.  
ad Pison.*

Cantharides vesicam peculiariter & so-  
lam afficiunt.

*et initio  
c. ph. g.*

Lepus



Lepus marinus pulmones solos ex omnibus animalis partibus vlcerat.

Cicuta homines occidit, sturnos nutrit, nec vim lethalem in his exercet.

Veratrum homines corrumpit, coturnicum cibus est.

Amphisbanam animal biceps si grauida fuerit supergressa, male abortit.

Stellio scorpiones vivos substringit, & ita perimit.

Basiliscus belua subflaua triplici frontis apice munita, visus etiam solum, aut sibilo auditus, homines necat: ipsam autem beluam mortuam si quod animal attigerit, subito moritur. Ob id omne aliorum animalium genus propinquitatem ipsius deuitat.

Vsta murium capita, & ex melle illita alopeciam curare possunt. Capita apum & muscarum vsta alij similiter adhibent eodem successu. Stercus murium cum aceto illitum idem potest.

Viperæ pellis in puluerem redacta, imposita alopeciis, pilos mirifice regenerat.

Caput leporis vstu cum adipe vrsino illitum.

Hedera, brassica, raphan<sup>9</sup> naturali facultate ebrietati resistunt, & vitibus, ut dixi, sunt inimica, ut si circum se serantur, diffugiant.

Palmule proprietate quadam capitis dolorem faciunt.

Pxon

*Libr. the.  
ad Piso.*

*Ibidem.*

*Ibidem.*

*Li. II. sim  
plic.*

*Libr. I. cō.*

*ph. p. &*

*Plin.*

*Ibidem.*

*Li. 6. sim*

*pli.*

Præoniæ præsertim maris radix recens collo appensa, cōtactu carnis calfacta, olfacta, continuo epilepsiam sanat: huius tamen rationem reddit Gal. *ibidem.*

Cameli aut mustellæ cerebrum siccum *Libr. th.*  
ex aceto potum epilepticis medetur. *ad Piso.*

Castoris testiculi poti, conuulsioni remedio sunt. *Ibidem.*

Hirundinis cerebrum ex melle illitum *Libr. th.*  
ad suffusiones facit. *ad Piso.*

Fel hyænx illitum suffusionem discutit, *Ibidem.*  
visum acuit.

Aspidis exuium tritum & illitū ex melle, visum facit acutissimum. *Ibidem.*

Accipiter in vnguento fusino coctus heri visui medetur. *Ibidem.*

Cantharus, id est, scarabeus oleo incotus, auri instillatus eius dolores sanat. *Ibidem.*

Stercus canū solis ossibus biduo pastorū, *Lib. 10.*  
ob id durum, albū, neq; grauiter olēs, optimum est in crustis oris, & anginis: strenuē enim iuuat, nec vllam habet insuauitatem. *simpl.*  
Eoq; siccato, leuigato p cribrū medicinale creto, Musa Medicus plurimū vsus est, cuius testimonia maximi facit Galenus: additq; hoc medicamento se nullum nouisse valentius, neque in anginis, neque in paristhiorum phlegmone, aut tonsillarum magna adeo, vt suffocationis sit periculum.

Item

Item in dysenteriis, & summè inueteratis  
vulneribus & summè malignis. Idem dige-  
rit & deficcatur alios affectus. Quod experi-  
tia longa & ipse, & eo priores Medici pro-  
bauerunt ad anginam quidem mistum aliis  
huic affectui cōuenientibus: ad dysenterias  
verò cum lacte probè cocto postea per cal-  
culos ignitos vel ferrum candens vstulato.

*Libr. 10.  
Simpli.*

Stercus pueri triduo nutriti lupinis dulci-  
bus, aut gallinis, perdicibus ex aqua, aut te-  
nui iure probè coctis, pane bene cocto cum  
sale pauco, & fermento, & vino vetere tan-  
to, quantum perfectè possit coquere, ipso  
die tertio primum acceptum, siccatum, leui-  
gatum, cum melle attico illitum (insufflatū  
Gatinaria) statim sanat gutturis phlegmo-  
nas sine venæ sectione: cuius experientiam  
certissimam sæpe vidit Gal.

*Alexā-  
der Ap.  
initio pro  
ble.*

Hæmodiam, id est, dentium stuporem  
ab acidis & acerbis & austeris natum, vt lib.  
de optima secta, portulaca esu sanat, causa  
eius effecti nobis incognita: huius tamen  
causam reddit Galen. libr. 6. simpl. & Arist.  
prob. 38. sect. primæ.

*Libr. the.  
ad Pison.*

Ceruinum cornu, aut bouis astragalus  
vsta, cum vino trita, denti vacillanti circun-  
lita eum confirmant.

*Ibidem.*

Veruecis cerebrum ex melle illitum in-  
fantium dentitioni vtilissimum. Idem præ-  
stat

stat mel & butyrum, gingiuas tamē tenuādo, Gal. lib. 10. simp. . Item & cerebrum leporis cum capite toto elixum, lib. 11. simpli.

Cocctionem ventriculi iuuare, & stomachicum esse ventrem mergi, vel elixum, vel ficcatum & sumptum, & tunicam interiorem ventriculi gallinarum ficcata & potā, falsum est expertus Galenus: tamen in ea promissione vana etiam hodie perseverant, qui principes Medici habentur. *Li. 11. simplic.*

Iaspis virens os ventriculi adhæsu re vera iuuat proprietate quadam. *Lib. 9. simplic.*

Astragalus bouis vstus cum lacte potus lumbricos rotundos educit. *Lib. 14. ad Pis.*

Vaccini lactis potus dysentericos iuuat. *Ibidem.*

Hepar lupi hepaticos tota substantia iuuare sufficienter se expertum dicit Gal. libr. 8. comp. ph. part. & hodie hepatis eius ficcati puluerem cum vino albo dant hydropicis, tanquā secretum aliquod remedium. Id tamen hepar lupi mistum medicamento hepatico (quod ex eupatorio fit) minimo id efficacius reddidit. Dabat autē Galenus læuigati hepatis lupini drachmam vnam cum vino dulci, vt thereo Cretico, vel mulso protropo, id est, quod defluit antequā vuæ calcentur. Nam id gratū hepati, quia ipsum nutrire potest, ac medium est inter calidum & frigidum. Si verò febris adsit, datur cum

*Li. 11. simplic.*

*Lib. 8. cō. ph. part.*

aqua calida, aut succo fereos, vel simili.

*Asclepi. a-  
pud Gale.* Caro trium *νοχλίων*, id est, cochlearum,  
*lib. 8. cōp.* multum tusa cum vini nigri cyathis tribus  
*ph. part.* calfacta, pota, hydropicos tota substantia  
non vna aut altera qualitate inuat.

*Lib. th. ad  
Pison.* Affecto iecori eupatorios herba strenue  
auxiliatur: id autem quia astringendo hepar  
roborat, & tenuitate essentia, ac incidendo  
& tergendo citra calorem manifestum ob-  
structiones eius liberat. Pistacia hepatis ob-  
structo conferunt.

*Lib. 2. ali  
ment.* Vva passa tota substantia est familiaris he-  
pati, ut alimenta omnia cum nutriendo cor-  
*Lib. 8. cō.* pore habent proprietatem quandam secun-  
*ph. part.* dum totam ipsorum substantiam.

*Lib. th. ad  
Pison.* Stercus bubulum aridum vstu tribus co-  
chlearibus potum hydropicos iuuat.

*Ibidem.* Lumbrici terræ, quæ γῆς ἐν ἱερῇ, id est, ter-  
ræ intestina vocat, Gale. ex melicrato poti  
icterum purgatione mox liberant.

#### COLICA.

*Libr. 10.  
simplic.* Stercus lupi ossibus pasti, ob id albidius,  
supra frutices, vepres, herbas altiores pri-  
ma æstate repertum non in terra: potum cum  
paucō sale aut pipere, aut alio simili, ex vi-  
no albo tenui, vel aqua, & (quod mireris)  
ad λυγῶνας, id est, ilia appensum dolores co-  
licos



licos citra phlegmonē perſanat, aut ſaltem plurimū mulcet, & his ita præcauet, vt non redeant: vel ſi redeant, tardiùs & mitiores multò redeunt, etiam ſi ipſum ſtercus teratur cum oſſibus deuorati animalis nō præmanſis nec concoctis. Appendendum verò vinculo & cingulo ex lana ouis à lupo mactatæ, vel ex pelle ceruina, vel quauis alia materiâ. Umbilico infantis inter telas confuto & appenſo ventri idē hodie tribuitur, & certiffimum affirmari audio.

κορύδαλ. & vel κόρυδ. & δ'ω] &, id eſt, gale-rita aſſata vel elixa, ſi aſſiduē edatur cū iure, colicos ſæpe plurimū iuuare expertus eſt Gal. Hæc auis puſilla, in capite gerit ceu galarum ex pilis erectis natum, nobis ob iter plerunq; obuia. Marcellus Empiricus hupapā accipit, quòd apicem in capite gerat, pa- uonum modo, vt Dioſcorides ait in corydalo, cui κοιλιακὸς opinor mendosè pro κοιλιακὸς iuuare ſcribitur: ſed hupupa οὐκ ἐστὶν ἀρνιθίου μικρὸν, id eſt, auicula parua, quātam Dioſc. & Gal. corydalon affirmāt. Vires eaſdē ad colicos dolores & nephriticos tribuūt periti, & probatiſſimas pulueri auiculæ nobis frequētis (quā vulgus meſenguā vocat.)

Stercus gallinæ cum œnomelite vel ace-  
ro, vel vino aqua diluto, colicum dolorem  
diuturnum ſanat.

*Galen. in  
ther. ad  
Piſ. et lib.  
II. ſimpli.*

*Libr. 10.  
ſimplic.*

## S P L E N I C A.

*Lib. th. ad* Astragalus bouis vstus ex oxymelite potus  
*Piso.* lienem absumit.

*Ibidem.* Myrobalanus ipsa splenem iuuat.

Asplenium, capparis, tamarix tota substantia familiares lieni plātæ ipsum iuuant, & liquant, & absumunt tumentē: quin vsu multo asplenium ipsum consumit omniuo.

## N E P H R I T I C A.

*Ibidem.* Sarxiphagō & betonica renes iuuant, vt alia aliarum partium propria medicamenta.

## C Y S T I C A.

*Ibidem.* Scorpius assus cum pane comestus, vesicæ calculos conterit: & lumbrici terræ ex vino sumpti, & murium stercus potum.

*Ibidem.* Vesica caprina aut ouilla cremata, ex posca pota: aut leporis testiculus ex vino odore coctus, potus his qui vrinam inuiti reddunt, benefacit.

## V E N E R E A.

*Lib. th. ad* Renes scincorum poti, pudenda intedere  
*Piso.* creduntur.

*Lib. II. simplic.* Bouis astragalus vstus, tritus, potus mediocriter venereus est.

## A R T H R I T I C A.

Caput milui sine plumis vstum cū aqua, *Lib. ih. ad*  
quantum tribus digitis capi potest, podagri *Pis.*  
cis auxiliatur.

Lumbrici terræ cū rosaceo cerato illiti,  
podagricorum inflammationibus conue-  
niunt.

Erinacei terrestris caro siccata, pota ele- *Libr. II.*  
phanticis, cachectis, conuulsioni obnoxiiis, *simplic.*  
nephriticis, anasarcicis auxiliatur: quia va-  
lenter digerit, & siccatur.

Mustelæ caro siccata, pota, epilepticos *Ibidem.*  
iuuat eadem ratione.

Elurorum salitorum caro trita palos &  
spicula extrahit, tūquā trahēdi vim habeat.

Myacum, id est mutulorum caro morfi-  
bus canum medetur.

Cochlearum caro pertrita valēter siccatur  
etiam hydropicos: & muccus ex ipsis haud  
ita pridem captis stylo confixis emanās cū  
thure vel myrrha, vel aloë, vel quibusdam  
horum, vel omnibus ad ceratū crassitiē coa-  
ctus aures purulentas desiccatur: & fronti affi-  
xus, oculorum fluxiones.

Cochleæ cum testis tusæ palos extrahūt,  
& menses sistunt. Caro ipsius sola vulne-  
ri etiam neruorum imposita sola pulchrè  
glutinat, & sine phlegmone in homine etiā  
duro & agresti addita farina volatili, & si

vis, thure, myrrha, resina fricta: hec initio libri vndecimi simplicium. Horum tamen causa quædam reddi potest, quod scilicet digerant, siccent, trahant calore.

Lignum Gaiaci (quod vocant) scabiem Hispanam tota sua substantia sanare quibusdam videtur, cum tamen in eo sapor sit amarus. & acer, non inualidus: vnde vim habet incidendi, tenuandi, tergend, & purgandi, per quas facultates vacuat vrinis, sudore, vomitu, deiectione, insensibili trãspiratu, putrem ex contagione materiam: sæpe tantum spirituofam, cum recens est contagio, nec vehemens, & spiritus affici conrumaces: sæpe simul etiam humidam, cum in vasa ipsa & corpus mali labes iam grassatur. Cui corruptelæ nisi occurratur per alterantia & vacuantia, etiam in partes solidas impetus fit, easque putredo occupat, ferro sæpe & cauterio tantum curabilis: quomodo ex diariis in affici promptis transitus fit in putridas, ac interdum in hæcticas febres, nunquam si absolutæ sint, curabiles. Neque victus tenuis & tenuans, catapotia Aegidiana, aut illitus ex argento viuo, suffitus ex cinnabarifacititia, vel herbarum digerentium & tenuantium decocto (quæ sunt alia hodie consuetissima mali huius remedia) ratione alia quàm corruptæ

ruptæ huius, materiæ totius vacuatione  
luem istam perfanant.

*Lib. 3. ad*

Taurini cornu rasura cum aqua pota san-  
guinis eruptionem cohibet.

*Pison.*

Mugol, id est, femora vsta idem præstant,  
& aluum solutam sæpe sistunt.

*Ibidem.*

*Ibidem.*

*Ibidem.*

Hippopotami cutis vsta, laeuigata, ex a-  
qua corpori adnota panos digerit.

*Lib. 11.*

*simpli.*

Adeps anseris & cerui medulla ex rosa-  
ceophlegmonæ medetur, & dolorem mi-  
tigat.

Cinis cancri fluuiatilis substantiæ pro-  
prietate mirabilis in morfu canis rabidi: &  
alysson herba antè dicta, libro sexto sim-  
plicium.

Ex his patet à partibus animalium qui-  
busdam morbos quosdam curari: quin ipsa  
etiam tota eorum corpora affectibus qui-  
busdam auxiliantur. Cancer enim flu-  
uiatilis tritus illitusque spicula & fureu-  
los extrahit, quod etiam carni siluri piscis  
saliti tribuit Dioscorides & capiti saura-  
rum trito Galenus libro vndecimo sim-  
plicium, & aliis præterea multis hanc tra-  
hendi facultatem vterque certam adscri-  
bit. Sunt enim medicamenta parti-  
bus quibusdam amica, alia iisdem inimi-  
ca, alia his atque illis affectibus idonea,  
vt abundè docuimus. Ne raireris igi-

*Lib. 1. c. 6.*

*ph. gen.*

*Lib. 3. ad*

*Pison.*



tur, partes viperæ medias theriacæ imposi-  
tas, vim illi efficacem tribuere ad resistendū  
morsibus viperæ, & elephantia, & aliis per-  
multis affectibus. Adde quòd quædā sim-  
plicia medicamenta ex tota ipsorum sub-  
stantia vnā quandam & simplicem habent  
virtutem, cuiusmodi ferè sunt prædicta. Alia  
mixtam in tota sua substantia facultatem ha-  
bent, & duplici actione funguntur, tam ma-  
nifestè sæpe, vt etiam quàm maximè con-  
traria ab eis in corpore fieri videamus: atq;  
id miraculum esse vidētibus apparet, & in-  
opinabile quibusdā audientibus ac impos-  
sibile putatur, nisi viderint.

Lapathi enim folia ventrem ciēt, semen  
assumptum stringit.

*Ibidem.* Brassicæ, lentium, ostreorū, ostracoder-  
*Ibidē.* & morum omnium, & gallorum vetulorum  
*li. 1. alim.* ius & decoctum sumptum, aluum soluit:  
ipsum autem singulorum corpus sumptum  
ventrem comprimit.

*Libr. 11.* Gallinarum ius simplex aluum sistit: gal-  
*simpl.* lorum ius cum sale prolixissimè coctorum  
*Lib. 11. ad* subducit.

*Pison.* Aloë & squammæ aris supercrescētes vl-  
*Li. 3. tēpe-* cerū carnes astringūt, & humores sub his na-  
*rament.* tos subinde siccant: assumpta autem per os,  
corpus totum purgant: quia nihil est, quod  
sumptum & admotū vires habeat easdem.

Serum

Serum lactis potum aluum soluit, caseus sumptus ipsam cohibet.

Proximum autē miraculo est trifolium herba hyacintho similis, quando vere flores emittit, & semen habet *κρίνον αἴγλης* simile, hæc enim decocta multū, & moribus phalangij aut viperę ex aquę fotu ad mora ipsis medetur, & dolores statim sedat. Eodē verò fotu in alio non morfo parti sanæ sensum similem, & dolores similes his quos morsus inuehit, omnes excitat: morsus itaq; sanat, & ferarum modo partem affligit.

Quis omnia hæc non modo cognoscenda Medico, sed etiam admiranda non iudicat? Neque solum animalibus ipsis inter se, & ipsorum partibus quibusdam & plātis & metallicis quibusdam secum, aut cum aliis magna est naturę societas aut contrarietas: sed quod etiā saxeus admiretur, sonis ipsis aut corporibus sonoris inter se tanta est cognatio, ut sibi similibus delectari videatur: fide enim testudinis quavis, quo voles modo attemperata, si correspondentē ei in testudine altera ipse attemperas, intendendo & remittendo, cū sonum edet similem sono alterius tibi antea non audito, altera illa velut exultans concutitur, tanquam simili suæ attemperaturæ sono gaudens harmoniaq;. Eam verò ipsius concussionem festu-

ca tenuis illi antè imposita apertè declarabit. Multò maiora his miracula Deus optimus maximus etiã in hac rerum mundanarum face excitauit, quorum fidem certissimã experientia quotidiana perficit, qua sola percipiuntur, quæ totius substantiæ similitudine aliquid perficiunt, nullaq; methodo planè constant, nec ratione actio illa inuestigari potest, quãuis in quibusdam reddere conetur Galenus: vt in præonia & alyssø vim siccandi & digerendi insignem tribuit, quibus ad curandam spumam opus est, sed sumptum alyssum etiam agit & sanat rabidum ipsum canem & hominem.

Hec fusius tractare poteram, & collocupletare remediis propè infinitis tota substantia operantibus, quæ partim ab aliis scribuntur veteribus, partim à neotericis & practiceis, partim hodie in vñ sunt frequentissimo rusticorum, nisi libri magnitudinẽ immodicam fuissẽ veritus. Adde quòd non statueram librum substituere de his quæ proprietate substantiæ totius quid agunt, quem Galenus aliquoties est pollicitus: an verò eum præstiterit, ignoratur: nondum tamen inter eius opera comparet. Id aliquãdo aut mihi aut alteri latius fundere licebit & elegantius maximo mortalium emolumento. Nam illa & celerius & multò certius quod possunt

*Lib. 6. sim  
pli. in alyss  
fo et alibi.*

*Libr. II.  
Simplic. in  
cancro flu  
uiali.*

possunt præstant, quàm quæ qualitatibus manifestis agunt, neque tanta egent aliorum simplicium mistione, per quæ melius agant, aut sine quibus non agant, aut per quæ conferuentur. Licet eorum quædam *Libr. 12.*  
 aliqua ex his postulent, vt cancrorum flu- *simpli.*  
 uialium cinis morsum canis rabidi cū thure & gentiana præstātius multò curat, quàm perse & solus: ne putes cum quibusdam ea si miscentur, vim suam perdere.

Medicamenta hæc, quæ secundum aliquam totius substantiæ proprietatem agūt aliquid, siue sumpta, siue admota, siue etiam appensa, experiētia sola sunt inuenta, & eadem probanda, an id præstent, quod ipsis tribuitur.

Horum tamē non paucorum ratio quædam reddi possit, vt quòd omnia facultate *Libr. 10.*  
 incidenti prædita olfactu vel potu iuuant *simpli. in*  
 epilepticos: qua ratiōe pæonia his salubris, *sang. re-*  
 quæ tota substantia id facere aliis dicitur: *spertilio-*  
 item portulacæ hæmodiam ab acidis, acer- *nis.*  
 bis, austeris natam curātis, causa incognita  
 Aphrodisæo initio problematū, declaratur,  
 Aristot. sect. 1. probl. 38. & Galen. libr. 6. simpli-  
 c. & lib. de opt. secta. His probatis fides *Li. 1. sim.*  
 est habenda: non autē incantationibus verbosis, nec vocibus barbaris, quas præstigitores usurpare consueuerunt.

M E T

# METHODVS COMPO- NENDI IN QVATVOR CONSISTIT.

*Qualitas,  
quãtitas,  
tẽpus cau-  
sarum sa-  
lubriũ, ca-  
85. artis  
medicæ,  
& alibi  
passim.*

**P**Artem operis hoc libro secũdo instituti tertiam aggrediamur, & doceamus, in quibus componendi medicamenta ratio consistit. Ea verò vt reliquorum componendorũ in tribus potissimũ versatur, rerum scilicet miscendarum delectu, earundẽ quantitate, & forma compfiri futura. Quæ tria etiam in quouis medicamento tã composito quàm simplici sumendo, aut admo- uendo obseruanda sunt. Deligitur enim hoc vel illud medicamentum, verbi gratia, purgatorium, & datur hac vel illa quãtitate, & forma vel catapotiorum, vel potionis, vel alia, quæ agro gratior, & fini proposito aptior fuerit.

Porro miscendæ res composito medicamento deligendæ sunt, quæ plurimæ quatuor. Hæ quæ affectũ præter naturam, hoc est morbũ, morbi causam, symptomata abigant, aliæ, sine quibus priores affectum abigere nequeant: aliæ tertio, per quas melius primæ affectum tollat: postremo etiam miscendæ, quæ dictas tres miscendorum differentias foueant, & diu integras seruent. Ad hæc quatuor referendi sunt scopi omnes componendorum medicamentorum, siue ipsa  
vnic



unicum habent effectum, siue multiplex, vt  
theriaca, in qua multe sunt particulares cō-  
positiones, singulæ affectibus quibusdam  
peculiariter efficaces. Quæ quatuor, omni-  
bus insunt aliquid efficiētibz: ob id in sin-  
gulis corporis instrumentis, id est, partibus  
actionem aliquam edentibus, à Galeno in-  
quiruntur in lib. de vsu partium, vt in oculo  
visionis instrumento, humor crySTALLINUS  
est primaria visionis causa, cæteræ oculi par-  
ticulæ sunt, aut sine quibus visio non fiat,  
aut per quas melius fiat, aut à quibus cæte-  
ra conferuntur. Pretiosiora verò diuiti-  
bus, viliora pauperibus deligenda, vt pōst  
multis ex Galeno exemplis cognosces.

Veruntamen vt in nostri corporis instru-  
mentis particulæ multæ vsum eundem sæpe  
præbēt generalem, vt oculum vena, arteria,  
neruus, & quæ ipsum ambiunt ossa, conser-  
uant, alia tamen atq; alia ratione (Nā vena  
ipsum nutrit sanguine, quem defert, arteria  
etiam caloris in eo natiui tēperiem seruat:  
neruus motum dat voluntarium musculis:  
& tactus sensum, etiam oculi tunicis ad di-  
gnotionem tristatium: ossa ipsa supercilio-  
rum, pomorum, zygomatis, nasi à foris oc-  
cursantibus tuētur) vt libr. de vsu partium  
docetur. Sic in medicamentis compositis  
multa sæpe simplicia idem, vt videri potest  
cuius

cuipia, pollentia miscentur: sed tamen quæ particulatim nonnihil differant viribus, vel saltem maioris & minoris ratione diuersa sunt. Adhæc vt idem polleant, hoc vni parti est familiare, illud alteri. Sed de his postea fusius. Contra in nostris organis pars vna interdum subit vsuum duorū, vel triū, vel etiam quatuor simul rationem, vt linguae tunica per se sapes discernit, sensus in ea gustatorius. aut potius animalis in ea spiritus est, sine quo non discerneret, nisi etiam ab ipso potissimum discerni contendas.

Eius tunica raritas est, per quam melius humores sapore præditi in ipsam tunicam recipiuntur. Eodem pertinet tunicae huius puritas, vt nec bile, ne pituita multa crassa, nec alio humore præsertim saporem aliquem insignem (qualis est salus, amarus) sortito imbuta & recta occursum & penetrationem rei gustandæ prohibeat. Sensus autem gustatus & tactus eadem tunica seruatur, quo vitat calidiora, frigidiora & cetera noxia, excipit dulcia & sibi familiaria.

Eodem plerunque modo in medicamentis vno simplici hi quatuor scopi inueniuntur, vt in casia per se data: interdum in duobus, vt in rha barbaro cum terebinthina: nonnunquam in tribus, vt cum prædicto panis azymus additur: est quando in quatuor simul

simul mistis, verbi gratia, in tetrapharmaco, vt singula vnicum habeant scopum.

Cum igitur medicamenta composita fiant omnino præstantissima, tum ob simplicium quæ iniiciuntur probitatē, tum ob mistorum virtutis proportionē, magna vtriusque habēda est ratio: non neglecta interim forma compositi, quæ quātam vim habeat, postea dicemus. Vnūquodque autē est præstantissimum, quod proprium generis sui odorem & saporem habet valentissimum, vt de croco, casia, cinnamomo, styrace, & ceteris in theriace, & passim in aliis compositis obiter admonebimus. Proinde optima quæque à medicinalis materiæ peritis vno consensu commēdata, sæpe & diu tibi spectāda sunt, vt noscas, & ab aliis deterioribus secernas, odore præsertim ac sapore: quāuis & color in nonnullis rectē deligendis non parum conferat Dioscoridī & Galeno, sed etiam & locus. Ob id postquā traditas ab utroq; in singulis simplicibus notas obseruaris, maximum est inspicere, in qua regione vnumquodq; ipsorū gignatur præstantissimum, in eāmq; tibi est proficiscendum, vbi optima sunt singula: vt Galenus in Cyprus vectus, cadmiā largā, diphryges, spodiū, pompholygē, calcitin, misy, sory, chalcanthum retulit: ex Syria verò Palæstina, opob

*Ga. initio  
lib. de ant.*

*Li. 9. sim.  
et de ant.*

*Lib. 2. cō. ph. gen.* opobalsamum: ex Lemno, terrā seu sphragidem Lemniam (cuius solius gratia in Lemnū nauigarat) tanta copia attulit, vt tota vita illi sufficerent. Quod si ad regiones eas proficisci vel nauigare nō detur, saltem per amicos fideles indidem accipe, vti Galēno ex omni natione, prætātissima quotānis afferebātur amicorum fidelium cura & industria. Nam perditī horū coēemptores omnia vitiant, & variis modis contaminant.

Quæ autem in singulis regionibus præstantissima gignantur, Dioscorides libris 5. & alij celebres viri descripserunt: vt,

<i>Irim</i>	} <i>Illyricam.</i>	<i>Chamedryn</i>	} <i>Creticum.</i>
<i>Ami</i>		<i>Chamapityn</i>	
<i>Phu</i>	} <i>Ponticum.</i>	<i>Hypericum</i>	
<i>Castorium</i>		<i>Daucum</i>	
<i>Agaricum</i>		<i>Gentianam</i>	
<i>Bitumen</i>	} <i>Iudaicum.</i>	<i>Ansum</i>	
<i>Opobalsamum</i>		<i>Thymum</i>	
<i>Petroselinum</i>	} <i>Macedonicum.</i>	<i>Thlapsi</i>	
<i>Men Hispanū</i>		<i>Aristolochiā</i>	
<i>Cuminum</i>	<i>Aethiopicum.</i>	<i>Veratrū nig.</i>	
<i>Elenium</i>	} <i>Ex editis &amp; fœcis locis.</i>	<i>Glycyrrhizā</i>	
<i>Elleborum</i>		<i>&amp; succū eius</i>	
<i>propè cetera calida, tenuiū partium.</i>		<i>Scordiū, &amp;</i>	
		<i>alia per multa, de quibus paulo post, &amp; libr. 3. &amp; 4. in theriace dicam.</i>	

Hyssopum, } Montana hortens. &  
 Calaminthe, } campes. melior.  
 Amomum, } Scythicum, ibidem.

Hyssopum. Cilicium, Dioscor. Creticum  
 Archigenes, lib. 8. comp. phar. part.

Sic medicamentum purgans bonum discernit Mesues tota sua substantia per longā experientiam cognita: quę etiā mala quādam iudicauit, aut toto genere, qualia sunt daphnoides, lathyrus, euphorbium, sagapennū, & alia violētiora: aut specie accidentali, ut turbitus nigrum, agaricū nigrum, colocynthidem vnicam in planta, scāmonium de regione Scenitarum. Bonum quoq; deligit sapore nobis iucūdo & odore familiari, & colore nō ingrato. Contrariū reiecit, ceu naturę nostrę aduersum, aut parum proprium, vel mistis aliis corrigit. Item in proprię purgatoriis attrahendo scilicet ea pręfert, quę rariora, leuiora, & igni propiora: ut agaricū, scāmonium, colocynthidē, aloē, turbitus, polypodium, pręter pauca quędā, ut cassiā fistulosam, cnicum, ricinum, irim, hermodactilos, lapidem cyaneum & Armenium, quorū bonitas pręcipua in grauitate spectatur, eorum plenitudinem aut naturalem substantiæ compactionem declarante. Quę dos rha barbaro, absinthio, myrobalanis comprimendo etiam purgātibus



adeſt. Nec parum illi ad delectum con-  
ducunt tempus collectionis & cuſtodiz, ac  
locus natalis, & conſervationis.

Dulcia, inſipida, ſtiptica, vomitoria, rara,  
virtutem naſta aut ſuperficiariã, aut imbe-  
cillam: vt violas, roſas, fumariam, adiãtum,  
lupinos, recentia præfert veteratis. Contrà  
autem acria, denſa, virtutem validam aut  
penitiorẽ fortita, quò vetuſtiora eò va-  
lentiora putat, modò ætate longa non ſint  
exanimata. Dulciã verò & falſa ætatis me-  
diã commendat.

Sic cœlum pluuium plantis calidis ſiccis  
vires minuit, frigidis humidis auget: calidũ  
verò ſiccum contrà. Quapropter & Gale-  
nus in antidotis plantas Creticas plurimas  
cæteris præfert, vt paulò antè dixi: quibus ta-  
men, inquit, non cedant Italicæ, præfertim  
ex locis editis, & dum cœli conſtitutio hu-  
mida non fuit. Ob hæc plantæ humidiores  
in locis humidioribus humidiffimè euadũt:  
in ſiccioribus tẽperatiorẽs, vt & animalia.

*Aphor. 2.* Quod Hippocrates dicebat, naturarum hæ-  
*li. 3.* quidem ad æſtatem, hæc verò ad hyemem

*Li. 9. met.* bene malè ſe habent. Sub cœlo regio-  
nem & flutem vëtorum comprehendimus.  
Neque omittenda eſt alimenti cuiuſq; pro-  
prietas, quam plerunque vitiat ſoli natura,  
aut cœli, aut aliarum rerum, vt fimi, ſterco-

ris, plantarum odio dissidentium: vt contra quædam perficiunt: sic thaphanus aut scilla hermodactilum meliorem facit, & hyssopus epithymum, & quercus polypodium: contra, lathyris scammonium vitiat, & brassaica vitem.

Purgantia cum his reponantur & vsurpentur, quæ vim eorum meliorem & tutiorem efficiunt, non augent verò acrimoniam. Ne iunge igitur scammonio lathyrin, vel tithymalli genus aliquod, sed mastichin & spicam, quæ omnia acria medicamenta corrigunt. Purgantia ex herbis ante triennium ferè læguent, præter utrunq; elleborum. Virtus igitur simplicium à regione proficiscens non est negligenda: quâvis calidæ tenues ex Creta plantæ, si sint Italicæ aut similes sunt, aut non multò Creticis inferiores, si ver totum ætatis modo sicum fuerit, nec plantæ ipsæ multo imbre irroratæ.

Medicamenta itē deligantur omnia in suo vigore, & eadē bene habitæ: fugiēda autem cœu ignobiliora quæ in suo genere sunt tenuiora & graciliora, aut enormiter procera: quòd illa viribus, alimentī penuria careant: hæc verò vires alimenti copia obrutas habeant. In quolibet enim genere præstant, quæ nec rugosa, nec exilia, neq; modum excedentia,

*Li. I. ant.*

sed quæ bene nutritâ & constrictâ habent substantiâ. Ob id nec crocû nec scillas, nec viperas vel emaciatas vel immodicè magnas ad theriacè Galenus expetit, sed mediocres.

Eadem verò proprium generis sui odorem habebunt valentissimum, & in gustus qualitate proprietas cuiq; generi sua, si præpolleat, optimum declarat medicamentum, præsertim ex plantis sumptum, nec his omnibus, cum quædam sint, quas citra periculum, gustare non liceat. Vipera verò & alia quædam medicamentorum genera notis aliis suo loco partim dictis: partim dicendis præstantissima deligentur.

Sic primæ notæ virtutis propriæ mellis ex sapore dulci & acri sumuntur, quæ utrūque si habet valentissimum, quatenus melli datum est, optimū est mel, modò adsint aliæ quoq; notæ ab odore, colore, consistētia, & partium coalitu: ut videlicet sit etiam pallidum, aut subflauum, odore iucundo in thymum inclinante, non improbè thymum referēte, quia id thymo minutim inciso adulteratum est: substantia item neque crassum sit & grumosum, neque nimis liquidum, sitq; vnitum per totum & glutinosum, ut si digito attollatur, visci modo longissimè continuitatem seruet, nec abruptum à se diuellatur. Hęc enim mellis optimi ex peculiari

*Li. the. ad  
Pisonem.*

liari eius natura sunt perpetua accidētia. Sic cætera compositionē faciētia medicamenta singulatim & accuratè explora, quia vnus cuiusdam vitium sæpe omnia corrumpit.

Ob id in cæteris simplicibus medicamētis saporem & qualitates cæteras sensibiles re ipsa nō lectione sola explora: nam experientia longa cuiusq; medicamenti facultatem indicat. Sic mellis quoddam genus est inuentum, quod largius coctum & despumatum, aut etiam citra hanc coctionem sola vetustate in vinosam qualitatem transiit, à quo theriaca vinum odore & sapore mētitur, quæ minùs proba est: quemadmodum etiā improbatur, quæ acido est sapore, aut ex vino nec optimo nec vetere, aut ex pane malè cōfecto & largiore copia misto cum carnibus viperinis. Sed de his suo loco.

Fructus item plantarum deligantur non modò, vt diximus, bene habiti, sæcūdiore, substantia cōpactiore, ex regione legitima, & lecti in suo vigore, sed qui furculis adhuc hæreant, ex quibus alimenti adhuc non nihil trahentes aliquandiu minùs minuuntur, & ob continuitatem cum furculis, calor illorum natius in aërem ambientem minùs expirat. Ob id nec rugosi immodicè sunt, quales sunt fugiēdi, vt leues. rari, exusti, tempore longo tabidi. Quando nāq;

*Li. i. ab.  
tid.*

in compositis medicamentis scribitur euphorbium, thapsia, succus aliquis aut liquor, flores, folia, fructus, radices, semina, vigentia semper accipe, fuge vetustate languescencia. Vetustas autem cuique sua est. Thapsia enim recens vehementior, annua mediocris, bima minus efficax, trima inutilis.

Metallicorum facultates diu videntur, tamen longo temporis spatio etiam languescunt: quædam namque ex his anno vicesimo aut tricesimo adhuc sunt utilia, quia non elanguerunt, nec omnino declinaverunt. Cuique enim suus vigor est & sua declinatio, atque senium. Vigor odore & sapore, interim colore & consistentiæ crassamento his qui sæpe videntur nescitur.

Cortices item radicum in totum multo sunt utiliores ipsis earum medullis, lib. 2. ant.

Chamæpitys & chamædrys campestris est generosior: alia tamen herbarum plurimarum in capis genitæ sunt imbecilliores: in montibus & locis editis valentiores.

*Li. 4. fa-  
wt. tuend.*

Rutæ folia modicè siccata diospolitico miscenda: nam plusculum siccata, acris, amara, iusto calidiora redduntur: non siccata excrementosum quendam humorem retinet, nondum ex toto concoctum, cuius vitio flatum discutere minus possunt.

Thy



Thymum sit Atticum, aut planè ex editis *Ibidem.*  
locis & ficcis: coma autem eius cum flori-  
bus est miscenda medicamentis: lignosum  
verò quicquid est, abiiciatur.

Piper longum & zingiber, ambo inte- *Ibidem.*  
gra & minimè perforata: nam ambo per-  
forari ob humiditatem excrementosam ce-  
lerrimè solent.

Piper longum qualitatem piperis planè *Lib. 4. sa*  
habeat, nec maceratum solvatur, nec sit fo- *nit. tuē dē.*  
raminulentum. *in diatri-*

Piper nigrum nec sit exile, nec rugosum, *on. pip.*  
nec crassi corticis, sed graue, maximum,  
plenissimum. Album maximum sit, simi-  
liter & plenissimum.

Seseli sit Mafsiliense. Petroselinum  
Macedonicum, & præcipuè Estreaticum.

Calaminthe, Thymum, Pulegium potif- *Ibidem in*  
finum ex Creta: sin minus, certè ex regio- *diacala-*  
nibus editis & ficcis. *minthe.*

Ex herbis abiecto lignoso & duro ad *Ibidem.*  
medicamenta accipiantur folia, & ea maxi-  
mè, quæ subtilissima & virentissima, & in  
summis herbis nata, adhæc flores, & cum  
his festuæ minutissimæ tenuissimæ. Hæc  
mediocriter siccata tunduntur, cribrantur  
tenui vel crasso cribro pro vario scopo, vt  
dicitur in his quæ melius reddunt compo-  
situm.

*Li. II. sim  
pl. in can  
cris.*

Sidera etiam quorundam vigorem augere nonnullis est persuasum, ob id Aesculapion cáncros fluuiatiles ad morsum canis rabidi per cynocaumata frequētissimi, vrebant post ortum canis, quando sol in Leonem transisset, nō nisi luna decima octaua.

*Libro 3.  
antid.*

Alyssos ad morsum canis rabidi efficacissima herba, ex totius substantiæ similitudine, legenda sub æstu Caniculæ: & ficcata contundi, cribrari, seruariq; debet, ne diffiletur.

Scalpturas, vt draconis radios habentis in iaspide viridi damnat Gal. lib. 9. simpl.

Efficacissima item sunt remedia, quæ affectui partis, vt intemperiei medentur, & simul partem ipsam nutriunt substantiæ totius similitudine, vt vua passa in affectibus hepatis & vinum saluberrimum, si ægrorent sine phlegmone, erysipellate, abscessu, calida intemperie ipsius vel aliarū partium principum, vel totius. Nam alit, coquit, roborat, putredinibus resistit, intemperie frigidā, humidam, si qua adsit, tutò persanat.

Eadem melli adsunt, nisi quod substantiam non cogit corporum, quibus adhibetur: ob id nec ea roborat, sed eius loco terget, orificia aperit, transitus purgat, vrinas mouet ac nutrit: illa non despumatum, hoc despumatum potentius præstat. His verò  
nutrit

nutritoriis medicamentis si affectus non cedit, ad ea quæ solum sunt medicamenta, transeundum est.

Medicamenta probatissima & vigentia deliguntur ad compositionem, à natura morbi, & ægri, & medicamenti: vt enim curatoria indicatio prima est à natura morbi, secunda à natura totius vel partis: sic medicamēti componendi ratio additur & natura medicamenti: vt sanguini ex pulmone educto per vas apertum conueniunt astringentia, vt acacia, rosa, balaustium, malicorium: per vas ruptum, etiam astringentia, sed simul glutinantia, & sine morfu siccantia, vt gummi hederæ. Sed cum tam astringentia quam glutinosa & emplastica vias sibi præcludant, calida & tenuium partium: vt cinnamomum, casia, amomū, costus, piper, myrrha, eis sunt miscenda, quæ illis vias præparent, & ea in corpus deducant: licet alioqui vasorum apertioni & rupturæ, & præterea erosioni curandæ maximè aduersentur. Ob id ea non miscentur sanguinis reiectioni ex gula, ventriculo, intestinis, vti nec frigida, & narcotica, sputo sanguinis maximè salubria, dum frigiditate sistunt sanguinem ad vas affectum ruentem, propter dictā prius causam, quòd scilicet viam sibi præcludant.

*Libr. i. the.  
ad Pison.*

*Initio lib.  
c. ph. par.  
Libr. 7. c.  
ph. part.*

*Scopi cō-  
positionis  
medica-  
menti in  
sputo san-  
guinis.*

*Libr. 4.  
metho.*

Præterea omnium internarum partium communis deligendorum medicamento- rum indicatio est, ut ea eligantur, quæ animalis naturæ sunt maxime familiaria: fugiantur & respuantur contraria, ut ærugo, æris squama, æs vstum, cadmia, pompholyx, lithargyros, cerussa, vlceribus quidem externis sunt innoxia, interioribus verò non adhibenda.

## Q V O M O D O B A S I S

### DELIGATUR.

*Lib. 5. fa-  
nit. tuen-  
de in fine  
quod præ  
ceptum o-  
mnibus  
causis sa-  
lubribus  
est cõmu-  
ne.*

Medicamentum itaq; primū est deligē- dum, quod facultatem habeat curando affe- ctui contrariam: ut in frigido affectu calfa- ciens, in calido refrigerans: intenso laxās, & contrā: in raro densans, & cōtrā: & in cæte- ris similiter deliges. Neq; tamen sufficit in- uenisse & delegisse facultatem affectui cō- trariam, sed æquipollentem etiam, & quæ a medio in diuersum æquè recedat, ut in mor- bo calido, id est, per quē pars est calidior suo temperamēto ordinibus, verbi gratia, duo- bus, refrigerās duobus gradibus inuenien- dum. Eadem ratione in multum tenso, va- lenter laxans: in parum denso, modicè rare-

*Libr. 9.  
metho. ad  
finem.*

faciens: & in cæteris ad portionem. Affe- ctus curandi ob id tota natura tibi notissi- ma, tibi ob oculos saepe ponenda, ut reme- dium inuenias illi profligando idoneum, & quod

quod nec ei<sup>9</sup> reliquias in corpore dimittat:  
 nec etiā vltra quā opus est agēdo, affectū  
 in corpus inuehat priori contrarium: quod  
 accidet, si affectui, verbi gratia, calido nu-  
 meris duobus adhibeas refrigerās medica-  
 mentū numeris tribus. Nam victa calidita-  
 te, frigiditatis vnū gradū in corpus impri-  
 mer. Id verò medicamentū à quibusdam  
 & radix & basis totius compositi vocatur,  
 sicq; clarioris doctrinæ gratia passim appel-  
 labimus. Est autē id, à quo primaria & præ-  
 cipua medicamēti toti<sup>9</sup> actio proficiscitur,  
 & cuius causa cætera adhibētur, per quē sci-  
 licet hoc melius agat, vel sine quibus hoc  
 non agat, vel quæ etiam totū conseruant.  
 Vt enim fundamēti firmitas reliquū probè  
 sustinet ædificiū, & linea cui appictæ aliæ fi-  
 guram constituunt, eandem velut erigit, sic  
 basis hæc: ob id fundamentorū & basium in  
 architectura est semp habita magna ratio:  
 vti radicū in agricultura, quòd ab his tota  
 plantæ vita procedat, & in cōponendis me-  
 dicamentis basium, & in corporis nostri in-  
 strumentis anxie querenda pars est actionis  
 causa, princeps & primaria. Cū igitur tā-  
 tarum sit virium ea basis & radix cōponen-  
 di medicamenti, multa cura, præcipuūmque  
 studium in ea probè deligenda ponendum  
 est. Quam in rem nosse omnino debes, vt  
 prædi



prædiximus, omnium simplicium facultates, & totam morborum omnium essentiam: deinde inire tecum rationem, an cum hoc vel illo medicamento his viribus prædito, talis & tantus affectus poterit exacte profligari, & pars ad naturalem habitum restitui.

Cum autem plerunque ad manum nobis non sint simplicia sic affectui contraria, ut eius naturam attingant & æquent, sed magna ex parte vel supergrediantur, vel sint multo inferiora: tunc ex multis simplicibus in vnum mistis basim molimur, ut ex calido ad tertium gradum & altero calido ad primum gradum æquali portione mistis, medicamento basim calidam secundo gradus efficiamus, si talem medicamento scopus, & curandus ab eo affectus requirit: quomodo si columna hæc abacum ex lapide simplici & tam crasso & tam lato requirit, hic autem desideratur: ex multis in vnum glutinatis abacum idoneum molior. Quomodo item si columna basim quadratam postulet, habeo autem tantum lapides duos exacte triangulos & æquilateros, quorum neuter per se columnam tutum sustinere possit: iis duobus lithocolia idonea tanquam ferruminatis basim efficio quadratam, compositam quidem, sed nihil aut minimum simpliciori inferiorem. Sic plerunque usu venit, ut  
simpl

simplicia habeamus duo aut inter se contraria solum, aut etiam quorum vtrumque per se, & seorsum est affectui curando aduersissimum & nocentissimum: ambobus tamen certa quantitate mistis efficitur medicamentum longè præstantissimum, eaq; componendi ex cōtrariis ratio in tota medicina frequentissima est, & methodo constat exactissima.

In omnibus enim affectibus generosa medicamenta ex contrariis componuntur: vt stomaticum, diamoron & diacaryon, & alia permulta succo mororū aut viridium corticum nucum, & interdum galla, aceto, rhoë & similiter astringentibus, & vehementer repellentibus constant: adhæc myrrha, melle, & aliis permultis digerentibus, & prætereà lenientibus, coquentibus. Quædam autem non modò ex contrariis inter se constant, vt digerentibus repellentibus, vt diabesasa Andromachi, sed validis vtrisque: alia valentioribus digerentibus quàm astringentibus: alia contrà, aucto scilicet alterutro aut diminuto, pro affectus præsentis natura, & ægri, & aëris.

Ex contrariis autem non modò inter se, verùm etiam ipsi affectui per se nocentibus efficacissima fiunt medicamenta, vt oleum per se omni vlceri est nocentissimum, quia

*In fine li.  
6.c.ph.p.  
& li.1.c.  
ph.pa. &  
initio lib.  
3.meth.  
Ibidem.*

hum

humectat, & sordes parit: omne autem vlcus siccantia & tergetia requirit. Chalcitis autem quia vehementer rodit, & ærugo, vlceribus maximè nocent: ex ambobus autem mistum optimum fit remedium: sic ceratum & ærugo per se carni generatè in vlcere cauo sunt contraria: mista verò idonea mensura (quæ cuiq; vlceri & naturæ sua esse debet) sarcoticum efficiunt laudatissimum.

Contraria autem hîc intellige nō modò propriè dicta, vt calidum frigidum tensum laxum, repellens, attrahēs: sed etiā quæ eiusdem sunt speciei, sed maioris & minoris ratione sunt diuersissimæ, vt summè & minimū astringēs: item summè & minimū laxans, vel tîgerēs, vel calfaciens. Composita igitur ex cōtrariis tã cōgeneribus quàm diuersi generis sunt multiplicia. (Cōtraria autē cōgeneria voco, vt summè astringens, minimū astringens, & similia. Cōtraria autem diuersi generis, vt astringens seu dēsans & laxās, frigidum calidūm.) Primò, cū in cōgeneribus vehementi misceo mite alterum quòd medio indigeam vt rosarū florē, vel rosas ipsas, vel aliud ex clemēter astringētibus cū galla, vel alumine, vel alio valenti: sic cū calido frigidum misceo, si amborū medio egeo, quod nec refrigerat, nec calfacit: si autem portione inæquali ambo

misc

*Libr. 8. c.  
ph. part.*

miscueris, ex hac variatione cōpositorum  
medicamentorum numerus erit maximus:  
quineriam duobus quibusdam diuerso pō-  
dere mistis, magna compositorum multitu-  
do efficitur: vt si rosarū flos & alumē aqua-  
li portione miscentur, tunc medium erit ex-  
tremorum medicamētū vel flos duplus, tri-  
plus, quadruplus ad alumen, tunc mitissimū  
fuerit medicamētū: aut cōtrā, alumen du-  
plum, triplum, quadruplum ad florem rosa-  
rum, tunc vehemētissimum fuerit medica-  
mentū, ratione maioris & minoris in vtro-  
que diuersissima pro portione alterutrius  
maiori aut minori. In quibus ne quare  
quod praestantissimū, omnia enim respectu  
ad aliquid iuuant vel nocēt. Iuuant enim,  
cū tempestiue talia & tāta corpori adhi-  
bentur, quando talia & tanta corporis affe-  
ctus praeter naturam postulat: nocēt, si quid  
horum desit. Quod saepe accidit vires re-  
mediorum & naturas affectuum ignoran-  
tibus, ob id saepe coactis sine methodo ad  
alia atq; alia remedia transire.

Sic si in pulmonibus apertū est vas, reme-  
dia tibi inuenienda astringētia, quae cōtra-  
hant: si ruptū, quae siccēt sine morfu, astring-  
gāt & glutinēt: si exesum, sarcotica, additis  
boni succi alimentis & renutrientibus. Ne-  
que solū basim facimus mistis pluribus

CONT

contrariis, sed etiam sæpe idem pollentibus: quia vnus larga satis quantitas nobis non suppetit: vt si anodynnon volo, id decocto chamæmeli paro: quod quia parcius mihi adest, quàm opus est, quod deest, refarcio per melilotum.

Miscentur ergo medicamenta vel congeneria, id est, eiusdē generis & facultatis, vt astringentia omnia, sed alterum summè, alterum minimum, vel diuersi generis. Cōgeneria quidem, vt multa horum extremorum media habeamus, maioris & minoris ratione diuersa ex mensura mistionis huius vel illius extremi, quod in omni affectu est optimum, & ad remediorum copiam præstantissimum. Quæ larga remediorum supellex etiam nobis adest, si duo affectui per se noxia miscemus: vt oleum & æruginem vel chalcitim in medicamento sarco-tico, vt aliquoties diximus.

Diuersi verò generis medicamenta miscemus non ad ipsorum copiam solum, sed quia rari sunt affectus, qui sola vel astringentia vel digerentia requirant. Si enim paruus est affectus, per se definit: si maior est futurus, per sola repellentia non per sanatur, præsertim corpore multis humoribus pleno: aut si pars affecta natura est imbecilla. Ob id cogimur sæpe vel statim ab initio vel paul



paulò post aliquid digerens miscere, & si dolor vehemens vnà affligit, etiam mitigatorium. Si complicati sint multi affectus, scopi plures erunt inuentionis & compositionis remediorum: vt si simplex vulnus est cum contusione, vnus à vulnere est medicamentorum glutinantium, alter à contusione digerentium aut coquentium, tertius à dolore vel in parte icta, vel etiam illi continua, & is scopus anodynorum: vel si hæc non sufficiunt, narcoticorum: vbi videlicet victis omnibus, horum maxima est necessitas. His enim temerè non vtendum est, ob noxam corpori & sæpe affectui ab his impendentem.

Basibus præterea diuersis sæpe opus est, quòd medicamentum sit polychrestum, id est, multis simul affectibus salubre, vt theriaca, mithridatios, & alia permulta: tuncq; tot bases deligere oportet, quot actiones à medicamento exigimus, nisi fortè in vno simplici pluriũ vsuum vis claudatur: vt in rhabbaro, aloë, absinthio, facultas cholagoga inest, & styptica, quibus duabus virtutibus si affectus eget, vt cum bilis flaua os ventriculi obsidet, simplicia hæc duarum basium loco fuerint. Eadem ratione si ex pulmone crassum & lentum humorem sim educturus, miscenda sunt incidètia, tenuantia, tergentia, expulsiõni parantia, purgãtia, & le-

*Lib. x. cō.  
ph. part.*

nientia, ne exasperatio dolorifica his succedat: sic omni vlceri cōueniunt siccantia, tergētia, quia ei perpetuò adsunt sanies & sordes, maior vtraq; valentioribus, minor mitioribus remediis siccātibus & tergentibus indigens. Eodem habet modo in affectibus omnibus complicatis, nisi qui naturam habent eandem: vt si tertiana febris est, ipsa enim affectus calidus siccus à bile flaua calida sicca, quo casu refrigerātia & humectantia intendere solum opus, quia febris ipsa & eius causa bilis flaua putrens eadem genere remedia postulant: sic ladanum per se capilli defluuium sistit, quia raritatem cutis astrictione sua densat, & sanguinem benignum per caliditatem suam attrahendo, substantiæ pilos generantis inopiam corrigit. Quæ raritas cutis & alimēti penuria duæ sunt pilorum fluentium causæ, quarum priorem astringentia tantum corrigunt quidem: posteriorem verò augent, nam sanguinem à parte repellunt, & ob id etiam pilorum defluuium augent, si ambæ hæ causæ illos deturbent: sed calore ladani vehemētia repulsionis lenitur.

*Lib. 2. cō.  
ph. part.*

Quòd si medicamentum ipsum simplex est imbecillum, eius duplum est miscēdum, vt in hemicrania veteri ponendum est duplum euphorbij bimi aut trimi loco recentis.

ris. Sic epithymo ad purgandam melan-  
choliā imbecillo adduntur elleborus ni-  
ger, senna: cneco pblegmagugo, scammo-  
nium, agaricus, turbith: rha barbaro chola-  
gugo scammoniatū aliquid, nisi simpliciū  
horum quātitatem multum augere mauis.  
Ratione eadem pro cinnamomo duplum  
optime casie vel carpesij, & in aliis similiter.

Si verò est valentius, vires eius aliis sunt *Lib. I. cō.*  
remittēde, vt in alopecia euphorbij & thap- *ph. part.*  
fiæ vim valentē frangit Gal. oleo, cera, thu- *Ibidem.*  
re, melle, adipe, vel humiditate quauis oleo-  
sa. Sic psilothrorum, id est, pilos aufe-  
rentium medicamentorum ex sandaracha,  
arsenico, calce viua, virtus vehemens mistu-  
ra imbecillorum medicamētōrū, vel liqui-  
dorū, vt vini, mellis: vel aridorum, vt ami-  
li, terræ selenusiæ, frangenda. Sic scammo-  
nium quarto ordine calidū, essentiæ tenuis,  
virium omnium substantiam maximè dis-  
sipans frangitur per contraria tota substan-  
tia, & qualitate: & vires roborantia, vt per  
dactylos in diaphœnico, per pruna in dia-  
pruno, per succum rosarum in cathartico  
diarrhodo, per carnem cydoniorum in dia-  
cy lonio purgatorio, cuius meminit Gal. li.  
I. alimento. Quæ frigida sunt, crassæ essen-  
tiæ, astringentia partium substantiam & co-  
gētia. Quibus alia addūtur, vel his admini-

culantia, vel partes principes iuuantia totius substantia proprietate, vt post in compositorum enarratione patebit.

Item si qua in eo est substantia aut qualitas corpori vel affectui nocitura, aut etiam medicamenti actioni, ea ante vitione, lotione, vel alia quauis ratione tollatur, aut mistis aliis corrigatur & frangatur. Ob id metalla ea saepe urimus, vt tenuiora fiat: & lauamus, vt mordacem acrimoniam vlceribus noxiam tollamus. (Nam mordacia in vlceribus vitamus, vt exasperantia in phlegmonis praesertim dolorificis) scammonij & aliorum valentium vires corrigimus & obtundimus aliorum mistione, vt in antidotis cathartici patebit. Sic errhina valentia mitigat Galenus lacte muliebri, vel aqua, vel alio.

Sic succus iereos per se calidus est, cum aceto autem non calfacit, lib. 2. comp. ph. part.

*Lih. 4. me  
rhod.*

*Li. 13. me  
rhod.*

Eadem ratione in vlcere gulae medicamenta deligit Galenus non modo vlceri curando idonea, sed quae nullam vlceribus propinquis, vel deglutiendo contactis, noxam inferant. Ob id etiam stomaticis non vult misceri chalcanthum, sory, misy, chalcitim, diphryges, as vstum, squamam aeris, aeris florem, quia noxia haec sunt deuorata gulae, ventriculo, & ceteris partibus ventris inferioris.

Ab effectus præterea magnitudine variatur medicamenti non genus, sed vehementia, ut achoribus paruis & adhuc incipientibus sufficiunt mediocria digerentia vino mersa: diuturnioribus autem & maioribus valida debetur: curatu verò difficillimis & longissimis valentissima. Sic alopecie incipienti sufficiunt purgationes, una quidem per catapotia ex aloë, duæ verò ex hiera diacolocynthidos, prior ex drach. eius. 4. posterior ex drach. 5. sine errhinis & apophlegmatismis & topicis remediis, quæ veteratis sunt necessaria præsidia. Validis enim medicamentis initio affectuum non est utendum, nisi sint extremi: sed mitiganda sunt eorum mistura, quæ vim illorum validam dissoluant, quod paulò antè docuimus. Sic imbecilla medicamenta superficiariis affectibus & genitis ab humore paucò, nec crasso, nec lento, nec impacto adhibenda sunt. Valenter autem digerentibus est opus, si affectus est profundior & ab humore multo, crasso, lento, valenter impacto. Sic in alopecia contumaci & inueterata validis medicamentis miscet Galenus ceratum liquidum, in parua & incipiente imbecillis medicamentis, oleum laurinum. Sic medicamentis phlegmones scirrhis quædam ex liquoribus acris miscentur, & medicamentis ad pterygium

*Lib. I. cõ.  
ph. part.*

*Lib. I. cõ.  
ph. part.*

*Lib. 4. cõ.  
phar. p.*

*Lib. 2. ad  
Glaucõ.*



& sycofin quiddam ex medicamentis exedentibus. Sic maligna & putrida vlcera postulant medicamenta acriora, & quæ ignis vires habent, quale est misy, fori, calx, sandaracha, arsenicum, cum cætera vlcera requirant medicamentum siccans & tergens. sine morfu & vehementi irritatione.

Ab affectus verò temporibus, etiam sæpe medicamēti genus mutatur, vt incipiētibz achoribus, sine totius cacochymia saltem multa, astringens & repellens remediū est parandum: increfcentibus verò repellēs quod influit, & coquens ac discutiens, quod iam influxit. Sic phlegmonæ incipienti, si moderata est, sufficiunt repellentia mediocria, qualia sunt omnia frigida: si verò violentior sit affluxus, valentioribus repellendum, austeris scilicet, ac interdum etiā acerbis. In augmēto astringētibus digerens aliquid miscendum, in statu digerentium vis intendenda, in declinatione his propè solis vtendum, nisi prope partem principem sit, & in collo, alis, inguinibus: aut materia sit pestilens, aut crassa, & valentiū impacta.

*Lib. 10. c.  
26. part.*

Nam in omni humorum in aliam partem affluxu communis auxiliorum scopus est repellendi & reperiendi: vbi verò nihil amplius influit, quod impactū est, digerendi. Sic gargareonis phlegmonæ initio adhibenda,

benda, quę materię affluxum repellant, mediocrem quidem, mediocriter astringentia scilicet aultera, vt rosa, flos rosarum, & cætera prius dicta: vehementem verò valentius astringētia, scilicet acerba, vt balauſtia, malicorium: si verò iam constitit fluxio, digerentia miscemus. Nam quouſq; aliquid *Lib. 6. cō. ph. part.* influit, repellendum: vbi constitit, coquendum: deinde digerendum. Sic diamoro nūc cum repellentibus, nūc cum coquentibus, nūc cum digerentibus rectē quis vtetur in phlegmonis oris, si eius vsum pro generalibus illis scopis mutauerit.

Initio fluxionū, vt in phlegmone, quod *Ibidem.* influit, est repellendum, cæteris tēporibus digerentia repellentibus miscenda sunt, vt in incremento repellentia præpolleāt in declinatione digerētia: in statu amborum æqualis portio. Si verò reliquię quædam inflammationis, velut in scirrhum induratę supersint, solis digerentibus agendum est corpore puro. Quā methodo qui vtetur, & simplicium medicamētorū vires nouerit, nunquā auxiliis idoneis destituetur, vbi vbi fuerit. Nam priusquā toti corpori sit prospectū, si afflictę parti medicamētum acre & calidū admoueas, trahit more cucurbitulæ ex toto corpore in afflictā partē superuacua, & ei grauatæ sic affligit, vt agrē auelli queat. *Lib. 4. method.*

*Lib. 12. method.*

Cum ab affectu præter naturam indicationem primam deligendi medicamenti ad compositionem idonei diximus, non à morbo tantum ipso, sed etiã à causa adhuc præsentente ex interna, cuius propriè est præcautio, intelligimus & à symptomatis, licet hæc primo & per se nihil curatorium indicent.

A causa enim sumitur indicatio componendi remedia, ut pityriaseos, id est, furfurationis in capite à pravis ichoribus & faniibus nascentis remedia sunt, quæ hos ichoras digerunt & tergent, vacuato prius corpore toto, si vacuationis egere videbitur. Addunt quidam roborantia partem astringentia, ut ne affluentem sibi saniem recipiat. Sic phthirias eos, id est, morbi pedicularis in alta cute excitati à colluie humorum calidorum putrescentium siccantia & valenter ex alto trahentia sunt idonea auxilia, quorum materia usu probata est sumenda (nam omnibus quæ experientia commendauit, fidentum) ut staphis agria, sinapi, cardamum.

*Lib. 1. cõ. ph. part.*

Sic achoras ex sanie tenui & mordaci ac simul ex humore crasso & lento natos curat, quæ hunc humorem incidunt & digerunt, & necessariò reprimunt humoris influxum, ut in alopecia, quæ omnia acetum acerrimum præstat cum metallicis, ut cimo lia, pompholyge, cadmia, vel charta vsta, sub

subactum, vacuato prius corpore toto & capite, nisi affectus sit exiguus: tunc enim sufficiunt topica seu metrica auxilia. Sic in putridis febribus humoris, qui putrendo febre[m] gignit, fouet, auget, rationem habendam docet Galenus per alterantia, quæ putredinem finiant: & per vacuantia, quæ materiam putrem aut putredini paratâ de corpore pellant.

*Lib. 9. &  
II. meth.*

Eadem ratione in diariis febribus, quauis externa causa defierit (à qua ut quæ non amplius sit, nihil curatorium indicatur) tamen quia in corpore dispositionem remanentem excitauit, quæ causa continens fuit febris, & eius accessione[m] prorogauit, dispositioni illi prospicit. Si enim diaria est ab æstu, per totum accessionis tempus irrigat caput partem primam, & immodicè à sole calfactam. Irrigat autem oleo rosaceo, refrigerato, ex alto effuso. In diaria à densata cute balneo refrigerante vel densante, magna illi cura est rarefaciendi corporis, frictione molli multa, cum oleo tenui & laxante. In diaria à mœrore præter dicta remedia latitiam: ab ira, animi tranquillitatem, & cætera contraria dispositioni in corpore relictæ à causis illis externis iam desitis. Sic in fluxionibus à calore vel dolore, symptomata hæc fluxionis causas pri-

*Lib. 8. me  
thod.*

num opprimenda docet. In fluxionibus vero à transmissione, partis transmittentis primam & maximam rationem habendam censet. Nullus enim affectus percurari potest, manente in corpore causa quæ ipsum excitauit.

Eam indicationem à causa morbi ad rectè basim inueniendam, pluribus docerem magnarum esse virium, nisi prolixior esse metuerem. Ob id mihi satis est visum, ipsos velut fontes quosdam rei indicasse in Methodo medendi. Ex quibus diligens lector haurire plura possit, si hæc illi non satisfaciant: satis enim nobis est componendi Methodum indicasse, nec omnia afferre particularia conamur: quando id infiniti fuerit operis, & parum necessarij. Pauca tamen in singulis particularia afferimus, ceu sensui notiora, per quæ Methodos ipsas vniuersalia maximè proderes, & rationi notiores lector possit intelligere.

A symptomatibus quoq; indicatio est deligendorum remediorum, quæ ipsa vel tollant, vel mitigent, vel saltè nō exacerbent. Virabris enim in capitis dolore ab ebrietate palmulas & myrrham: nam illæ proprietate quadam dolorē capitis faciunt. Hæc etiam sanis vapore multo & calido caput replens:  
multo



multò magis iam dolentibus auget. Eadem ratione vitabis mentham, crocum, & alia omnia, quæ papore calido caput repletia dolorem geminant. Vsurpabis autem in eodem hederam & brassicam, quæ naturali virtute ebrietati resistunt.

Stupefacientia adduntur quibusdam, quæ dolorem leniunt, non quòd dispositionibus opitulentur, sed quia vim sensoria stupefaciunt, sine qua non fit dolor. Vbi enim dolor inuictus vrget, sensum stupefacientibus vtendum est in auribus cælo, renibus, & in qualibet alia parte vehemèter dolente. Auribus autem inflammatione dolentibus opiū lacti muliebri vel albumini oui, vel castorio æquali mistum iniicitur: sed si vehemētissimus est dolor, duplicatum. Nec solum vt oppositū opio miscetur castoriū in auribus purulentis, sed etiā quia coquit & siccat.

*Lib. 3. c. 8.  
ph. par.*

Narcotica autem per se dispositiones ipsas dolorificas non iuuant, imò lædunt, & crudiores ac contumaciores reddunt: per accidens verò saepe iuuant. Vbi enim dolor per ea cessarit, & somnus sit obortus, natura dispositiones dolorificas concoquit.

*Lib. 3. c. 8.  
pha. par.*

*Ibidem.*

Narcoticis verò huiusmodi vtimur, quando à nullo anodyno potest dolor mitigari. Ob id ipsius vsum semper vitauit Galenus, nisi magna eum necessitas ad vtendum

*Ibidem.*

dum

*Ibidem.* dum cogeret. Eadem omnino ratione,  
 & ap. 31. quia meconiū insigniter stupefacit, vt tuti-  
 libr. 6. or esset eius vsus, Apollonius, & alij quidā  
*Ibidem.* insignes viri ipsum tostū castorio miscue-  
 rūt, quòd non tosto nonnullos offendi vi-  
 derint, vt dies multo post vsum caliginosē  
 viderint, & capitis grauitatem senserint, &  
 cibos malè coxerint. Sed inter torrefacien-  
 dum omnem eius efficaciam tolli saepe ex-  
 pertus est Galenus; propterea melius duxit,  
 non tostum castorio miscere, quòd refrige-  
 ratoriæ facultatis eius vehementia obtun-  
 deret. Postea verò eius malignitate tēporis  
 spatio obtusa vtendum est, quando scilicet  
 adhuc abundè efficax manet: quod in Phi-  
 lonis antidoto libro quarto audies.

Medicamento verò ex opio & lacryma  
 papaueris tantum vtimur, cū ex doloris  
 vehementia, à morbis periculum imminet:  
 quanuis horum vsu noxa quædam solidis  
 partibus accidat, post corrigēda: collyria ta-  
 men ex opio multorum oculos sic imbecil-  
 les reddiderunt, vt hebes visio euaderet: &  
 aures aliis sic infirmarunt, vt auditū grau-  
 ret. Ob id in his rarissimè eo vtēdum, in ca-  
 pitis dolore nunquam, quia nemini tam ve-  
 hemens accidit, vt animi deliquio mortuus  
 sit aliquis, aut seipsum occiderit, vt colico-  
 rum nonnulli. Quantumcunque enim quis  
 capit

capite doleat, minus dolet, quàm cui oculus, auris, dens, còlum. Nec tamen soli tactui stupefaciendo narcotica ista adhibentur, sed *Lib. 3. cò. ph. part.* etiam auditui, vbi ob eius acrimoniã fit aurium tinnitus: & oculis, quando ob videndi acrimoniam suffusorum imagines à vapore ex ore ventriculi exhalante adsunt.

Optimus autem compositionis narcoticorum scopus est, vt ad tria, qui ea componit, respiciat: primum, vt sensum tact<sup>o</sup> obtundat: secundo, vt nihil noxæ ex hac stupefactione in particula relinquatur: postremo (quod est maximũ) vt dispositioni auxilientur. Quæ tria Philo in sua antidoto seruauit. Nam hyoscyamus & omnium valētissimè opiũ facultatis sensoriæ, stuporẽ & somnum torpidũ frigiditate summa molitur. Vt autẽ horũ vehemẽtia obtundatur, nec adeò noceat, sed imminẽs ab eis noxa potius in hibeat: vtque citiũs distribuantur stupefacientia (nam per se admodum tardè permeant) & penetrent interiorum affectarum partium substantiam: calfacientia adiecit costum, pyrethrum, euphorbium, piper, quæ etiam noxios & dolorificos humores coquere, crassos tenuare, lentos incidere, & tergere, & flatulentos item spiritus tenuare, & vtrosque per halitum digerere & vacuare possunt. Ob hæc Philonium, & *Lib. 9. cò. ph. part.* quæ

que similia sunt, doloribus colicis implacabilibus salubre est: ac in vomitu, singultu, erosione stomachi aut ventriculi ab humoribus acris, & in æstu ventriculi.

*Lib. 8. cō.  
ph. par.*

Eadem ratione medicamentis ut stomachicis sic hepaticis opium, altercum, & similiter refrigerantia interdum miscentur, quæ calidas illarum partium intemperies mitigent: ea tamen mēsurā, ut totum compositum dictis partibus non sit vehementer refrigeratorium. Si enim refrigerantia in mīstione præpolleant, sensus partium affectarum magis obtundetur, & calor partis totius magis extinguetur: si calida vincunt, frigiditatis effecta minùs apparebunt, sed innoxium magis fuerit medicamētum. Nam viuis corporibus simile quid mortificationi accidit ex opio, & similiter frigidis: dum partes horum usu causas dolorificas sentire desinunt, & crebro usu frigiditatem partibus immedicabilem excitant.

Ut igitur in refrigerantium & calfacientium oppositione quantitas alterutrorum, præpollentem medicamenti actionem ostendit, sic in aliis contraria recipientibus, densantia rarefacientia, cogentia, fundentia, digerentia, repellentia, humectantia  
sicca

siccantia , vel solum diuersa astringentia, erodeantia, tenuantia, tergentia, mitigantia, digerentia, hypnotica, id est, torporem & somnum inducentia. Sic Andromachus suis confectionibus bechicis & hypnoticis ad tenues humorum influxus incrassandos, siccandos, refrigerandos, opium miscet, & mandragoræ succum, & radicis eius corticem, & alterci semen. Quædam enim eius compositiones duo ex his, quædam tria, quædam omnia continent.

*Lib. 7. c. 6.  
ph. par.*

Opium soli sapæ mistum lana exceptum, sedi, fronti, naribus, aut alteri parti vehementer dolenti impositum abundè stupefacit: vt tamen id medicamentum frigidas dispositiones valenter coquat, additur crocus, nardus Indica, myrrha, castorium. Addi etiam possunt semina anisi, ameos, apij, petroselini, seseleos, cumini, dauci, ad amari medicamenti insuauitatem corrigendam, & vt citius penetret, urinæque moueat, & succos crassos, si qui sint, magis tenuet. Eadem ratione vigilias in morbis per refrigerantia & humectantia expugnamus: syncopen quoque magna cura præcipuèque studio tum præcauet, tum præsentem abigit, libro I. ad Glauconem, & libro methodi 12. Et si qua sunt alia symptomata præsertim insignia,



gnia, & quæ causæ morbum fouentis vel  
augentis, tunc rationem obtineant, ab illis  
aliqua componendi medicamenti sumitur  
indicatio.

Quædam autem medicamenta interdum  
componimus contra nullum morbum, sed  
vt quod secundum naturam est, seruemus,  
qualia multa sunt cosmetica, id est, corpus  
ornantia & expolientia: & commotica, id  
est fucatoria: de quibus multa lib. 1. compo-  
sitio. phar. part.

Inflammatam igitur, aut aliter ægrotan-  
tem particulam aliquam curaturis, commu-  
nis omnium inflammationū alteriūve cu-  
iusuis morborum generis, sub quo sit mor-  
bus partis, scopus primus occurrit, & indi-  
catio ab affectu ipso, qua primum medica-  
mentorum genus, quibus vtendum sit, inue-  
nias. Deinde indicatio ex partis natura su-  
mitur, ex qua particulares medicamento-  
rum differentias eligimus: de qua dicere  
tempestiuum iam fuerit.

A partis natura & vsu indicatio sumitur  
deligendi medicamenti, quod parti sit blan-  
dum & innoxium, indolens, temperamen-  
tum eius non vitians, sed seruans aut resti-  
tuens, si per morbum sit mutatum. Nam cu-  
rationis genus etiam affectuum eorundem  
in qualibet parte materiis variat.

Vt ophthalmia id est, phlegmone oculi tunica adnatæ, quanuis omnium phlegmonarum curationi per vacuantia subiicitur, tamen quia ea tunica plusquàm cutis reliqua sentit ob sensus promptitudinem & substantiæ raritatem, repellentia postulat, quæ non exasperent, sed clementer astringant mista liquoribus mitigatoriis oui albumini, fœnigræci decocto, lacti mulieris inuenculæ, & euchymæ è mamilla supra cotem medicam expresso, in qua collyrium teritur, vt tepidum adhuc oculo infundatur, præsertim cum magna est ophthalmia, aut humorum affluentium acrimonia: quãdo amyllum, aster Samius, spodium lotum, pompholyx lota, cerussa lota, plumbum vstum & lotum, & id genus alia ἀνοία id est exiguam aut nullã qualitatem gustui aut olfactui repræsentãtia, qualis aqua, sunt salubria. Hæc enim quia rosionis omnino sunt expertia, & sola terrestri parte substantiæ, mediocriter siccant, his miscentur medicamentis, & aliis contra vlcera vel sola, vel cum erosione, & sanie mordacissima effluente. Qualia multa in cornea & rhagoide tunica nascuntur. Quòd si hæc primis diebus nihil iuuare videantur, longiore tamen spatio auxilium sensibile præbent, solâq; his vlceribus coueniunt. Nam adstrin-

gentia sanie effluentem retinent, & hac ratione dolorem ex saniei morfu natum intendunt: acria verò dispositionem mordacem augment, & quod affluit, corrumpunt, siue benignum erat, siue iam cœptum corrumpi à malo oculi habitu, vel capitis, vel totius corporis vitio.

Vlcera item oculorum eadē secundum genus curatione sanantur, qua cætera scilicet siccantibus & tergentibus sine morfu, & postremo adstringentibus: tamen propter partis naturam sint omnino morsus expertia & læuissimè trita, vt ex pōpholyge lota, tenuissimè trita collyrium factum misto interdum mandragoræ succo, ad vehementissimos dolores leniendos sufficit: alij succum rosarum vel polygonij, vel albumen oui addunt paulò ante vsum, quia citò illa acescunt. Omnium enim vlcerum non modò oculorum materia huc spectat, vt vlcus ipsum sit purum, natura verò parrium ipsum replet, ac cicatrice tegit. Quæ verò vlcera recipiant, & requirant mordicantia, prius dictum est.

Sic oris totius tunica cū sit cute totius corporis multò rarior & mollior, ad hæc ea sola medicamēti insinauitate infestetur, cūque faucibus subiecti sint duo meatus: guttur in pulmonem, gula in ventriculum,  
per

per quos aliqua portio medicamēti stomati-  
 ci in dictas partes potest defluere, stomati-  
 co miscere non audemus valentia, & insua-  
 uia, & quæ his partibus obesse possunt. Ob  
 id emplastro dia chalciteos & aliis quibus-  
 dam validis & vim quandam lethalem ha-  
 bentibus in vlceribus cutis vti possimus: in  
 oris verò affectibus nemo vtatur tutò, etiā  
 si vlcus ea postulet, nisi magna eorum vsus  
 sit necessitas, qui eorū aliquid in fauces, &  
 inde in guttur, aut gulam delapsum vehe-  
 menter partes recepturas lædit. Contrà in  
 reliquarum partium affectibus, saporū sua-  
 uitatem, vel insuauitatem non spectamus.

Sic phlegmone stomachi & ventriculi &  
 hepatis non solis laxantibus est curanda ob  
 harum partium actionem corpori toti ne-  
 cessariam ad viuendum, sed miscentur etiā  
 astringentia harum partium robur seruan-  
 tia, vt absinthium, aloë, mastiche, nardus, cy-  
 donium. Sic in scirrho hepatis calfacien-  
 tia & tenuantia præpolleāt magis, quàm in  
 scirrho aliarum partium, sed mollientibus  
 admodum moderatis vtendū, quia iecoris  
 corpus velut ex humoribus concretum est:  
 ob id Herophilo parenchyma dicitur.

Item in scirrho hepatis semen cucume- *Lib. 8. cō.*  
 ris & bacca iuniperi miscentur, quæ mi- *ph. part.*

te percutim ad musculos ipsi connexos perueniente ipsam discutiamus. Si autem similis lassitudo in tunica interna asperæ arteriæ, & musculis laryngis, post vociferationem multam, & præcipuè acutâ fiat, oleum & alia emollientia & digerentia per cartilagineas ad partem lassatam non peruenient, sed paulatim deglutitis est opus lenientibus: tamen balneum dulce omnibus his commune est auxilium.

Sic aquâ mulsam, oxymeli, & alia, omnibus non eadem mitione coquimus: quidam enim ea libentius bibunt aquosiora, alij dulciora, vt quidam vinum dilutius amant, & si meracius biberint, iis caput feritur: alij meraciore gaudent, qui si dilutius biberint, his ventriculus euertitur. Sic diamoroni hi dulcius volunt, quibus plus mellis miscendum: alij austerius, quibus minus. Cum igitur alicui medicamentum sumendum imperas, cõice aut interroga, quibus præcipuè saporibus secundum naturâ delectatur, & singulis quod iucundum est, para: modò ne medicamenti facultas insigniter exoluatur. Ob hæc Medici sumenda medicamenta faciunt media, quæ pluribus naturis conueniunt, & ab aliis minimùm recedunt. ob id faciliè ad propriam cuiusque naturâ paucis quibusdam additis accomodantur.

*Li. 4. san.  
tuend.*



*Lib. 3. cō.  
ph. part.*

Sic phlegmone initio repellentia materiam affluentem postulat: quæ verò est in parotidibus, trahentia, nisi interdum & raro paucum astringentium multò digereti miscendum sit, quando scilicet parotis cum paruo dolore erumpit.

Remediis item hemicranicis tam calidis quàm frigidis iubet Galenus misceri corroborans aliquid, astrictoria scilicet facultate præditum. Quod præceptum in partibus actionem aut vsum toti corpori cōmunem & necessarium habentibus est perpetuum, ventriculo inquam, & hepate, liene sæpe.

Prætereà indicatio curatrix & medicamentorum vt aliorum quoq; remediorum inuentrix sumitur à viribus, ætate, cōsuetudine, non primò sed ratione temperamēti, quòd hæc ambo immutant, & nouum sæpe faciunt: illæ temperamentum in quo consistunt, sequuntur. Item non à partis temperie solum, sed ab ipsius situ, connexionē, figura, magnitudine, sensu exacto & obtuso, aëre, id est anni parte, regione, cœli statu. Quorum singulorum exempla tantum singula prolixitatis fuga adscribemus.

Imbecilla debentur remedia omnia imbecilibus, nisi vires copia grauata falsam imbecillitatis suspensionem præbeant: tunc enim valentiora ferre possunt, vt & robustæ

Ita nec grauata insigniter.

Pueri & senes valentia remedia non ferunt, præsertim vacuantia. Illi enim calidi humidi plurimum per insensilem transpirationem vacuantur: his infirmum & frigidum corpus viribus scilicet omnibus imbecillis.

Consueta remedia minus molestare solent, sed etiam minus sunt efficacia.

Pars ab ore & stomacho remotior sumenda medicamenta valentiora indicat, quod priusquàm affectui occurrant, vires eorū obtundatur alteratione, aliorū mistione.

Eadem ratione quæ sunt profundæ partes, ad mouenda medicamenta postulât valentiora, & quibus tenue aliquid additū ad penetrandum patet, vt acetum, euphorbiū: vel etiam astringens à tergo impellat. Contra verò cū parti affectæ remedium viribus integris aut parum fractis occurrit.

Quia connexio lienis est per vas venosum cum venis mesaraicis, lienis vacuatoria remedia sumpta aut iniecta facio valentiora, quàm si ex initio mesarei vel etiam toto mesareo esset vacuandum.

Cauæ intus partes, medicamenta intrò recipere possunt: foris, foras: intus & foris, utroque versus: nec intus nec foris, nusquàm. Magna verò cavitatis largius medicamen-

tum capit, ut vomitoria sint larga quantitate, quæ vesicam vel uterū vacuant iniectiones, paræ: quæ intestina lata & parum plena aut pressa, largæ: quæ angusta, quæ stercore aut flatibus plena, aut foetu, vel ascitæ, aut tympania pressa, paræ.

*Libro 3. method.* Quæ corpora sensu tactus exquisito sunt prædita & mollia, valentia & acria & mordacia medicamenta non ferunt: quæ obtuso, ea ferunt.

Aër si temperiem habet morbo similem, quia causa est insalubris, medicamenta debent habere qualitatem aëri & morbo repugnantem, insigniorem, quàm si aër ipse morbo contrariam haberet intemperiem. Horum omnium exempla propè infinita sunt tota methodo, lib. sanit. tuendæ, & lib. 2. ad Glauconem. Quapropter non est, cur in his pluribus immoremur.

*Libr. 9. c. 5. pha. p.* Ab affectu simul & partis natura plurima, ut in dysenteria opium, galla, malicorium, cortex pini, semen alterci, myrta sicca, acacia, rosæ sicca, pyra, sicca omnia torrefacta dantur, ut dolorem obtundant, & partem aduersus causas dolorificas roborant.

*Libr. 1. c. 1. h. p.* Sic alopeciae difficili nec cedenti tribus aut pluribus totius purgationibus dictis à Galeno topicum debetur medicamentū calidum

lidum, quod digerendo vacuet, non tamen adeò calidum vt vrat, aut etiam cutim citra vſtionem immodicè ficcet: nec tamen mediocriter calidum, vt non vacuet quod volumus, ſed tenuium ſit partium, vt in altum penetret ad originem radicis pilorum: quia cutis capitis craſſior & durior, ob id efficaciore opus eſt medicamēto, quod & prauos ſuccos digerat, & ſanguinem probum trahat, qualis eſt thapſia. Quæ cum multò ſit calidior quàm affectui & parti conueniat, ſolam ne applica: nam cutim vlcerat, & tumores in ea excitat inflammatorios: ob id quædā eius vehemētiam mitigantia miſce, vt ceratum ex oleo tenuium partium (quale eſt ſabinum vetus, vel ricininum recens: non Hiſpanum, vel omotribes, vel aliud aſtringens) vel aqua miſta thapſiæ recentis: nam annuæ viſ diſſoluitur: bimæ magis, trima eſt inutilis.

Sub natura partis cōprehende naturā totius, & expende, an quod medicamento genus pars affecta idem corpus totū inſinuet, an diuerſum. Id quod ſimile vel diſſimile partis & totius temperamentum tibi planè oſtendēt, vt lib. 3. methodi fuſius leges. Præ- *Libr. 3. e.*  
ſidia etiam alia ciuilibus corporibus ſcriben *ph. par.*  
da ſunt, alia foſſoribus & meſſoribus, vt acetum feruens, aut muria acetofa in parotide.

Lib. 6. cō.  
ph. par.

Ad totius naturam, ægri quoque & Medici facultates referas. Pauperes enim Medici sumptuosa & diuitum remedia parare nequeāt, quod illis sit res domi angustior. Pauperibus etiam pauperem ex viliori materia apparatus, diuitibus dignū ipsorum diuitiis ex opulentiore præparare oportet. Ob id identifricium suum diuitibus cinnamomo, pauperibus casia vel amomo aromatizat & iucundius odore & sapore reddit Galenus, & in opulentorum ozæna medicamenti miscebat odoris gratia aliquid hedychroi in falerno veteri mersū, lib. 3. cōpositio. pharma. part.

Nequetamen ob id putes, sumptu superfluo aut parum necessario diuites onerandos, ut magna pecunia & longis itineribus conquiras remedia, quibus similia tibi sint in promptu. Nam cum ad manum sunt remedia paratu facilia affectui curando idonea, superfluum est vel exotica vel rara usu disquirere: ut cum parotidas curare possis trahentibus & digerentibus remediis propè infinitis, quorum attinet in id mustelæ sanguinem querere? citra quem si nequit curari parotis, remediorū planè inops fuerit medicina, cum præter hunc aliis permultis parotidum auxillis sit fecundissima. In paratu tamen facilibus delectus quoque est habend



habendus. Nam afini urinam & similia *Lib. 6. cō.*  
 potui dare in affectibus oris & gargareonis *ph. part.*  
 cum Apollonio, extreme est dementie, cum  
 alia sint permulta paratu facilia æquè effi-  
 cacia: adde quod permulti sint, qui mori ma-  
 lint, quam illam bibere. Absurdissimum  
 etiam est, in oris phlegmonis portiones alias  
 medicas quam purgatorias dare.

Sic diamorion & diacaryon & similia *Lib. 6. cō.*  
 pauperibus parare potes sine ullo sumptu *ph. part.*  
 aut cum minimo: diuitibus verò sumptuo-  
 siora sūt cū cassia cortice vel nardo Indica,  
 vel folio malabathri, vel omnibus simul. In-  
 de etiā sumptuosa diuitum mulierum Ro-  
 manarum vnguenta spicatum & foliatum.

Item ad potenter digerendum phlegmo- *Ibidem.*  
 nas indurescentes, diuitum compositis sto-  
 maticis additur costus, amomum, macer,  
 opus Cyrenaicus vel Medus, aut alius: pau-  
 perum verò stomaticis digerentibus addi-  
 tur acorus, meon, cardamomū, dictamnus,  
 sinapi, loco illorum sumptuosiorum dige- *Galen. in*  
 rentium. *theriaca*

Eorum etiam qui assumunt medicamē- *ad Piso.*  
 ta naturæ proprietas est inspicienda: sunt *ex li. 2. epi*  
 enim nonnulli tam facile medicamenta *demiōn*  
 capientes, ut etiam sæpe ea concoquant, *Hip. Ph*  
 & nutrimentum ab his aliquādo sentiant, *lophar-*  
 nullum autem incommodum. Alij con- *maci-*

*Miso-  
pharma-  
ci.*

*Li. 3. me-  
tho. & 1.  
alim.*

trātam sunt inepti ad medicamenta assu-  
menda, vt iis vti, nequeant, quia stomachus  
ea aduersatur, & ante vsum facillē dissolui-  
tur. Vnde veterum pręstantissimi optimas  
medicamentorū compositiones effecerunt,  
ex singulorū natura cōpositionis rationem  
inueniētes, & quę intensa erāt viribus, alio-  
rum mistura remittentes, & simili ratione  
acria hebetātes, reliquāq; pro affectuum &  
naturarū differentia obseruantes, quę scili-  
cet medicamēta, quibus morbis, & quo mor-  
borum tempore conuenirent, & quomodō  
affectis corporibus, & quali victu vtētib;,  
& quo anni tempore. Sic theriacen ex opti-  
mis & plurimis multūq; variis medicamen-  
tis composuerunt aduersus ferarum noxia-  
rum morsus & venenosa pharmaca, & alios  
affectus plurimos, quōdq; hominum natu-  
ras plurimū inuicē differre perpenderent,  
ita vt aliud alij medicamentum sit idoneū.

*Libr. 6. c.  
pha. part.*

Si diuitibus paras stomatica coquentia  
& digerentia, misce amomum quantum  
crocum, myrrham, alumen: & si vis, horum  
trium loco solum pone amomum.

In corporibus mulierum & eunuchorum  
& aliorum molli carne & alba pręditorum  
nec soli assuetorum, caput æstu calfactum  
refrigerare vehementer non audemus.

In mollibus & delicatis corporibus vlce-  
ratis

ratis vtendum est medicamentis morfu omnino carentibus: hæc enim vel sine molestia agent, vel saltem nihil nocebunt.

Prædictas indicationes propè omnes deligendis quoq; aliis simplicibus miscendis tam sine quibus basis non agat, quàm per quæ melius agit, & postremo à quibus omnia illa conseruâtur, applicare oportet, vt omnino tibi persuadeas, nihil rectè ad miscendum vti, nec ad curadum inueniri posse, nisi per indicationes seu scopos, & veluti respectus, vt appellaut. In quibus præcipuè sunt ab effectu præter naturam, ab ægri natura, & ab aëre. Has autem in sequentibus vbi minùs accuratè expressas leges, ignorantix aut negligentix ne adscripseris, sed eas de industria vel obiter perstringemus, vel etiam silentio præteribimus: quando ad viuum singulas excutere prolixius esset, quàm rei mihi propositæ conueniret.

## S I N E   Q V I B V S.

**B**Asi medicamenti inuenta & probè constituta, ei sunt addenda alia, sine quibus affectum basis ipsa profligare non potest, & pristino habitui corpus restituere. Sunt autè ea multiplicia, vt mox audies: ferè tamen omnia basim aut ad partem affectam deducunt,

cunt, aut ipsi commodè ad actionem applicant: nisi basis ipsa per se sit idonea, & multorum simplicium rationem sustineat.

Miscentur ergo quæ tota sua substantia parti sunt familiaria, & ob id dum à parte trahuntur, simul vim medicamenti eò deducunt, ut simplicia cephalica medicamenti vim ad caput secum trahunt, cardiaca ad cor, nephritica ad renes, arthritica ad articulos medicamentum deducunt, quo partis affectus indiget.

Miscentur etiam quæ basim per meatus natura, aut obstructione, aut densitate, aut cōpressionē angustissimos, in partes, si opus est, remotissimas cōuehant sua vel aerimonia, vel essentie tenuitate, vel utraq; vel accurata tritura, ob id acetū obstructionibus viscerum liberandis miscetur: euphorbium externis intrò penetraturis remediis myrrha aëria substantia multæ particeps crocū terreū intrò deducit rhabarbarū, asarum, lenissimè terūtur in pollinis modū, cū mouendū est lotiū: casia, cinnamomū & similia tenuissimè trita miscentur, ubi menses sunt mouendi: euphorbium, pyretrum & similia, ubi per sumpta medicamenta est ab articulis trahendū. Contra sine his basim exhibemus, cū parti affecta facit & mox occurrit ex partis situ & figura, ut rhabarbarum.

barum, crassum & negligenter tritum damus, cum aliud tantum mouenda est, non etiam mouenda vrina.

Hæc prædicta quatuor, familiaritas totius substantiæ, tenuitas studiosa tritura, acrimonia, ubi ipsius basis vires aut etiã substantiam ad partem affectam deduxerunt, ea ut in affectum agat, tempore eget interdum etiam diuturniore: ob id nonnunquam basisbus miscentur, quæ ipsas affectæ parti diutius affigant, ut mora saltem ipsæ id perficiant, quod non possunt obiter præstare: ut medicamenti gulæ & trachæ alteriæ miscemus crassa & læta, quæ vim medicamenti sarcoticam, colleticam, sinuloticam, si vlcus adest, in parte remorentur & affigant.

Non tamen aut in via, aut illa mora in parte volumus medicamentum coqui, & horum vim à calore nostro euinci, priusquam & partem affectam attigerint, & usum optatum præstiterint: ob id opium theriacæ miscetur, & ob alia quædam alibi dicenda.

Medicamentis verò quæ hæere parti alicui volumus siue sumantur, siue admoueantur, ceram, oleum, adipem, vel lentum aliud miscemus, memores tamen eorum quæ rectè sumendis aut admouendis miscentur.

Nam ceram sumendis nemo rectè miscetur, *Libr. 6. c.*  
ut, ut neque axungiam, quæ admouendis *ph. p.*  
*sunt*



sunt aptissima, vti ad vlcera gulæ & asperæ arteriæ syrapi, butyrum, oleum, & lentiores succorum, opportunissimi.

Si tamen vlcera sint putrida in ore, parte calida, humida, ob id ad putredinem paratiore, quia medicamenta his idonea continenter per saluam elota adherere nequeunt, validissimis in ipso sic vlcerato medicamentis vti cogimur, qualia sunt caustica, & quæ crustas ferri candentis modo efficiant. Sed in externis partibus causticis per se vtimur: deinde crustas tergentibus auferimus: at in oris vitiis propter partis naturam tutius est causticis miscere tergentia, mel, thus, eruū, irim, aristolochiā: ne ob partis naturā recidiua putredo nascatur. Misyos ergo crudi vel tosti drach. tres cum mellis cyathis sex dissoluantur, vel chalcitis tosta cum melle tanto, vt sordium habeat spissitudinem: vel chalcāthum vstum cum melle similiter mistum. Sic caninum stercus, cinis hirundinū, & humanum stercus, ana cum melle.

Sic æruginem cum aliis mistam aphthis malignis adhibet Andromachus & Crito ibidem: & arsenicum, & sandaracha, & alumen scissile, oris putredinibus applicantur ibidem.

Eadem ratione malignis vlceribus sedis, intestinorum, vteri, vesicæ, meatus vrinarij  
simil

similia adhibetur remedia, aliter atq; aliter  
missa & soluta pro variis à parte & affectus  
magnitudine, & situ indicationibus.

Sed quoniam vsus à medicamentis expe-  
ctatus præcipuè is qui calori aut frigori suc-  
cedit, non præstatur, nisi medicamenta ipsa  
actu id sint, quod dicuntur, hoc est, calida  
vel frigida, calore nostro egent, deducente  
ipsa in actû: vt medicamēta purgantia cum  
potestate calida sint omnia, vt agant, actu  
calida esse oportet caloris nostri actione.  
Eodem modo opium & alia frigida vt a-  
gant, quod agere nata sunt, in frigiditatē il-  
lam suā à calore nostro deducēda sunt: actu  
enim non magis frigida sentiuntur, quā  
aliadoco eodē cōclusa. Sed tamen vtraq;  
prius accuratè sunt terenda, vt ea calor no-  
ster propè tota citius attingat: nam piper, &  
cætera potestate calida, non fiat actu calidū  
à nobis sine contritione tenuimec rhā bar-  
barum antasarum, & vretica alia vrinas mo-  
ueant, nisi diligenter sint comminuta: aga-  
ricus item & colocynthidis citra contritio-  
nem hanc multum sunt noxia, si sumantur.  
Quam vt promptius recipiant, ille in tro-  
chiscos primū formatur: hæc cū aliis sic-  
cis teritur & friabilibus.

Nisi item facultates medicamentorum,  
sine quibus basis ociosa fuerit, in suo vigo-

*Li. I. cōp.  
ph. part.*

re consistant (quas color, odor, sapor, consistentia, non solum calor aut frigus significant) vires à composito promissas ne expecta, vt indicabit libr. 4. compositio theriaces. Est tamen quando medicamentum vires simplicium languidiores poscit, vt euphorbium veltutate ignauius idémque flauius: quando pars exactius sentit, cui est applicandum, & affectus vt punctura est clementior. Sic in rha tenuis & aërea substantia, & frigida terrea mutuò sese non impediunt, inò valentioris effecti sunt causæ: quia aërium deducit intrò crassam & terream & frigidam substantiam, alioqui per se in superficie hæsuram, nec partes internas contracturam, refrigeraturam, siccaturam.

*Li. 8. sim.*

Miscentur etiam medicamento non modo sine quibus ipsum efficere id non possit quod promittit, sed sine quibus medicamentum hoc vel illud compositi nomen non habeat: de quibus abudè post in forma medicamenti idonei constituenda.

Ea igitur omnia quæ composito miscentur, aut etiam citra misionem, in basi perficiuntur necessario, antequàm ea, quod optamus, in affectum efficiant: illa rationem eius sine quo medicamentum nō agat, obtinent, vt basis ipsius coctio, vstio, tritura, lotio

lotio, & alia permulta, quæ in singulis appa-  
rent compositionibus. Item quæ glutino-  
sius, liquidius, crassius, tenui<sup>9</sup>, acrius, mirius  
medicamentum reddunt, quando harum  
qualitatum aliqua est opus ad actionem op-  
tata. Item quæ partibus familiaria ad ear-  
um vel etiam sæpe substantiã medicamen-  
ti alterantis, roborantis, vacuantis deducūt.  
Quando medicamentum agit in propin-  
quam sibi materiam, in longinquam non  
acturum, aut tam imbecilliter, ut nullus in-  
de successus esset sperandus. Præterea, quæ  
sumptum vel admotum medicamentū tam  
iucundum faciunt omnibus suis qualitati-  
bus ægro, ut id ipse nō inuitus accipiat, ne-  
que eo assumpto nauseet, & inde vomat. Si  
enim vomat, nullus est huius medicamenti  
usus, ut neque si admota præ morbo & dolo-  
re, aut alia de causa mox æger illa abiicere  
cogatur: nisi fortè vomitu illo fiat fluxionis  
auersio, & excrementosum aliquid etiã ex  
ventriculo simul elidatur. Adhæc quæ hu-  
morum coctionem iquant, quæ excremen-  
ta vacuationi apparāt, quæ meatus aperiūt,  
per quos medicamento via est futura, atque  
etiam excremento, illa etiam rationem eius  
obtinēt, sine quo medicamentū nihil agat.

Adhæc virium robur quantū est necessa-  
rium medicamento ad actionem mutando

& sensus tactus, eodem pertinent. Quapropter apoplecticis, dissolutis, hysteris remedia quantumvis morbo & eius causæ idonea dentur vel applicentur, cassæ sunt, aut parum secura: sæpe motus, sæpe venter plenior causa est vacuationis tum celerioris, tum largioris: sæpe quies retineri in ventriculo, sæpe ventris inanitio coqui medicamentum cogit, præsertim si erat clementius: sæpe item corporis situs ac figura ex deiectione vomitorium effecit, & contra.

Cessatio quoque à vacuationibus aliis causa sæpe est per accidens huius vel huius vacuationis. Nam si in diabete des mediocriter aluum mouentia, illa etiam ad vias vreticas trahuntur: ut si in lienteria, diarrhoea, dysenteria des vretica, vel hydrotica, vel quæ viscera respiciunt, sæpe aliorum impetu illa per sedem detrahuntur. Per accidens quoque voluntas nostra sæpe rationem eius sine quo non fit medicamenti actio, habet: ut si quis aluo à medicamento irritata, naturæ impetui non seruiat, sed aluum cohibeat: fit sæpe, ut aliud postea non descendat.

Non modo autem quæ ante medicamentum sumuntur, ut ei materiam appareret, sed etiam quæ post recipiuntur, sæpe actionem medicamenti obrutam excitant, sæpe ad medicamenti expulsionem naturam irritant. Ut  
fum



sumpto purgante medicamento si quis diutius a cibo abstinere, saepe nihil mouet: si tempore post legitimo cibū sumat, hoc recreata natura medicamentum expellit.

Infinita propè alia inuenias in compositis medicamentis, sine quibus illa nihil omnino agant, aut tam parum agant, ut nihil egisse videri possint. Eadem verò, cum sint imbecilliora impedimenta, ut melius operetur medicamentū, aut etiam si omnino absint, per accidens his accēseri possunt, per quæ melior fit medicamenti actio. De quibus dicere iam tempestiuum fuerit.

#### P E R Q U A E M E L I V S.

**T**ertio loco medicamentis certa methodo componendis deligenda sunt & miscenda, quæ ipsius basis & aliorum, sine quibus basis non agat, actionem reddant meliorem, perfectiorem, efficaciorē, salubriorem, tutiorem: celeriorē, si celeritate opus est: aut tardiorē, si tarditas optanda est, qualia sunt vstiones, ablu-tiones, triturae, & quæ basis ipsius aut aliorum vim corrigūt, valentiorē minuēdo, imbecilliorē augēdo, noxiam corpori emendando. Item quæ coloris, odoris, saporis, consistentiæ gratiam agro iucundam me-

dicamentis conciliant.

De horum autem quibusdam prius est dictum, de aliis exempla aliquot proponamus non iutilia lectori. Valentiorē vim minuunt per se quidem quæ basi aut prædictis sunt contraria, vel tota substantia, aut sola qualitate manifesta, aut vtraq; , vt scimonio calido, tenui visceribus noxiæ vires dissoluenti, pruna dactyli, succus rosarum frigida, crassæ essentia, partium substantiam cogendo, roborantia, miscentur in antidoriscatharticis. Sic valenter calidis opium, semen hyoscyami, cortex radicis mandragoræ, & similia miscemus, vt illorum vehementiam obtundamus: præterea vt sensu per hæc frigida stupefacto dolorem sedemus: sic vehementer astringenti minimum astringens miscemus, cum mediocri astrictione opus est: vel vehementer digerenti minimum digerens, cum moderatè resolvendum est in aliis ad portionem. Per accidens verò vim aliorum remittunt, quæ partis naturæ sunt familiaria, eamque aut tota substantia, aut qualitate, aut vtraque contra noxam à medicamento imminentem roborant & muniunt. Vim etiam minuunt, quæ tenuibus crassitiem, celerioribus tarditatem, rarioribus densitatem, leuioribus grauitatem addūt: nisi à crassitie, tarditate, densi

densitate, grauitate vehemens actio profiscatur. Est enim quando horum actio est operator.

Sic sulphuris valenter calidi & digerentis vim pari cinolia terra frangit in achori  
*Libr. I. c. ph. pars.*

bus Apollonius, & ex ambobus compositum ad symmetriam medicamentum reducit. Addit & acetum incidens, tenuans, digerens, repellens.

Sic medicamentis ad affectus internarum partium penetraturis ea miscemus, quæ penetrare in altum faciant, etiam affectum non iuuantia, vt acetum in phrenitide, quod neque mitigat dolorem, neque laxat tensionem. Et quia medicamentorum affectui aptorum virtus in altum penetrando dissoluitur, sæpe affectus ab his præsidium non sentit, nisi mista sint medicamenta valentissima. Contrà in affectibus superficialis, vtpote quibus occurrunt medicamenta viribus integris, satius tamen fuerit miscere, quæ tum medicamenti vim intrò ad penitiora deducant, tum affectui ex sua natura auxilientur, & sint tenuium partium, vt acetum in calidis dispositionibus, euphorbium in frigidis. Cuius vtriusque virtus vehemens dissoluitur, & corpora permeando & alterius mistura, vt rosacei cum aceto in capi-

*Lib. 7. method.*

tis interno dolore, nisi vlcus adfit in finciple, cui vis applicare. Sic vstio metallicis tenuitatem essentiae, acrimoniam & vires auget, lotio acrimoniam & vires eas minuit, tenuitatem retinet. Sic aloë non lota magis purgat, minus roborat, lota minus soluit, magis roborat.

Quæ verò actionis vehemenciam remittunt, eam non aboleant, neque qualitatibus contrariis, neque tota substantia contraria: quomodo theriace sumpta medicamentum purgantis vim & actionem abolet: quomodo magnes alio cōfrictus ferrum à se abigit, non attrahit: succinum oleo maceratum paleas nō attrahit, sed eas etiam oleo imbutas à se repellit, antipathæa rerum & occulta naturarum contrarietate, vt antè diximus.

Virtutem imbecillam augment ac excitat medicamento, quæ illi imbecillo robur, tardiori celeritatem, crassiori tenuitatem, densiori raritatem, graui leuitatem, insipido acrimoniam, aut falsuginem, aut amaritudinem, adiiciunt, si qualitatibus illis est opus: si contrariis, quæ contrarias afferunt: vt vstio terreis & metallicis vires addit, & celeritatem, tenuitatem, leuitatem, raritatem, acrimoniam. Vsta enim omnia essentiae tenuitatem acquirunt & acrimoniam, excepta chalciti.

*Libr. 10. simplic.*

Ruta

Ruta & ramus falicis & cortices eius ar- *Lib. 9. cō.*  
 teriacis quibusdam inter parandum mouen *ph. parti.*  
 dis, siccatā abiiciuntur, noua substituuntur,  
 vt in diachalciteos ramus palmæ præscindi  
 tur sæpe, lib. 1. comp. ph. gen.

Quæ partem roborant, medicamentis mi  
 scentur: vt hieræ pieræ, mastiche, crocus, &  
 alia aliis plurimis. Crocus idem linteo pu  
 ro ligatus incoquitur, expressus abiicitur in  
 arteriacis, lib. 9. comp. ph. parti.

Hodie Arabum sectatores turbith iun  
 gunt zingiber, tãquam eius calcaragarico  
 salem fossitium (gemmeum vocant) & stœ  
 chadem, si ad caput ferri volunt. Stammo  
 nio cor lædenti ambram cor ipsum robo  
 rantem: crysallum, refrigerantē inflammā  
 ti: gallam astringentem aperiēti eidem ora  
 venarum: spicam item mastichen, tragacan  
 thum, caphuram vna ratione vel duabus.

Vim medicamenti noxiam corpori, &  
 etiam deleteriam emēdamus, vt cantharidi  
 bus per se & suæ naturæ contrarietate vesi  
 cam vlcerantibus miscemus alia, quæ vim  
 earum exedentem corrigūt: vretica tamen  
 si vrinam cieri affectus requirit, & ceratum *Li. II. sim.*  
 eisdem miscemus, aut emplastrū idoneum *plic.*  
 ad vngues *ψυγώδες.*

Sic elloboro nigro humanæ naturæ con *Li. I. rat.*  
 trariam vim emendat Hippocrates misto *viēt. acu.*



anisi, dauci, seseleos, cumini femine odore  
simul & esculento.

Sic mel veteres, hodie magis saccharum  
medicamentis sumendis miscemus, linguam  
& os prius vino interdum abluimus, & cya-  
thi tam fundo quam labris iucunda sapore  
& odore miscemus, & os sumpto pharma-  
co abluimus, aut delicato condimento re-  
creamus, ne tristato illi consentiens sto-  
machus subuertatur, & ad vomendum ven-  
triculum incitet. Sic catapota foliis au-  
ri interdum tegimus, interdum saccharo, &  
aliis.

*Lib. 7. me-  
thod.*

Nec omittenda est cuiusque temperamen-  
ti proprietas, quæ ut in alimentis, sic etiam  
in medicamentis vim habet magnam, ut  
non modo expendamus an hoc illud me-  
dicamentum partis & totius temperaturam  
vel eandem vel diuersam feruet, (quomo-  
do Galenus docet in medicamentis vlcerum  
lib. 3. 4. Methodi) sed quomodo se habet ad  
medicamenta hæc vel illa. Quædam enim  
naturæ clysteribus etiam malo suo necessa-  
riis omnino sunt abstinendæ, cum ab his  
sentiant sæpe mulieres mox vterinos affe-  
ctus, aliæ à portionibus medicis, quædam à  
catapotis, aliæ à bolis purgantibus, aliæ ab  
aliis omnino abhorrent, vel ob naturæ suæ  
cum his contrarietatem, vel opinionem ali-  
qua

qua id persuaser, vel quia iis vsæ malè habuerunt. Ob id rogandus quisque est, si quando purgatus est, & qua purgatorij medicamenti forma præcipuè delectetur.

Vt melior fiat medicamenti actio, miscentur quæ ipsum gratius reddât colore, odore, sapore, consistentia, siue sumendum est, siue admouendum; nisi quod in admouendo saporis minima ratio est habenda, nisi quatenus illi cum odore convenit. Sumenda autem si quatuor dictis dotibus sint iucunda, & præterea pauca, ventriculus trahit promptius, comprehenditque: acta etiam calida citius reddit, aut frigida, si talia erant potestate, & si refrigerandum est: ob id & celerius & valentius agunt. Si quo horum autem fuerint ingrata, non comprehenduntur, non retinètur, sed ventriculum evertunt, & vomuntur mox, aut deiciuntur sine actione, vti & alimèta quauis meliora: quia tamen ingrata sunt, non comprehenduntur à ventriculo, nec ob id coquantur. Cum autem suum cuique sit iucundum vel consuetudine, vel imaginatione, vel tota substantia, & horum quodque sola experientia noscatur, rogandus quisque est, quo medicamenti sumendi aut etiã admouendi crassamento, colore, odore, & in illo etiam sapore delectatur.

*Gain natura bum.*

*Aph. 38.*

*li. 2.*

COLOR

## C O L O R.

Propterea daturi medicamenta vel foliis auri tegimus, vel vase argenteo, stanneo ve, aut alia constante materia non trasparente includimus, oris angusti, idq; in tenebroso aëre propinamus: ob id etiam inuenta emplastra melina, id est, rufa, & coloris cydoniorum, ex vsta æruginē docet Galenus: quia ex æruginē cruda viridia quosdam terrent: sic cauteria maximè occultamus, præsertim meticulosi: & scalpello venas aut arterias secturi, aut hæmatophobis his faciem velamus, aut alio torquēmus.

*Lib. 2. cō.  
ph. part.*

*Lib. 1. cō.  
ph. gen.*

*Nota ad  
coctiones  
medica-  
mentorū.*

*Li. 2. rat.*

*vict. acut.*

*Hippoc.*

Vt emplastrum ex lithargyro sit albius, deligit Galenus oleum purius & lucidius, & aquam puram & candidam, quæ cū lithargyro in mortario temperat, deinde igni ex lignis peruri coeptis vel perustis antè carbonibus exactè incensis coquit in aëre syn-cero, sub dio, in sole. Oleum autem crassum, aqua turbida, aër nubilus, vmbra, fumus, medicamēto facile nigredinem conciliat. Quod si primus iste focus coctionem non absoluit, in alium similiter ardentem cacabus transferatur.

In his quæ sorbitionibus mista ventrem solvunt, nonnihil præsidij est, nisi ob amarorem, vel asperitatem, aut multi-

tudi

tudinem, aut colorem, aut suspensionem aliquam omnino fuerint ingrata. Multitudinem non sine causa adiicit, quæ etiam alimenta facit ingratoria, non ægris solis, sed etiam sanis: cum alimenta minus larga avidius deuorentur, quam largiora.

Ob id ægris cibos auersantibus alimentum parcius est offerendum, multò magis medicamentum. Quapropter cum largius purgandum efficaciora sumimus, si nihil repugnet, ne magna remedij imbecillioris copia opus sit. Sic puluerem hieræ diacolocynthidos, & alterius cuiusvis potius damus catapotis aut aliter, quam ipsam hieram mellem exceptam, nisi res alia aliud suadat. Sic cum purgatoria infundimus liquori idoneo, paruam potionem imperamus, ne copia largiore ægrum à deglutiendo deterreat, neve ea si semel sit deuorata, citius & valentius stomachum euertat.

Melina (vt paulò antè dixi) sunt vnguenta, id est, mali cotonei colore, cocta medio-criter, seu ysta æruginè: quia color hic est gratioꝛ, neq; terret ægros, vt sæpe viridis ab æruginè cruda. Cerussa quoque quibusdam vnguentis additur ad coloris albi gratiam.

Huc pertinet quòd quæ simplicia coloris propè expertia sunt, vt aqua tunica cornea, colores omnes optimè recipiunt: vt in odora

*Lib. 2. cõ,  
ph. gene.*

*Li. 6 sim.*

(qual

*Li. 2. ali.*

(qualis est balanus myrepfica) omnibus suscipiendis odoribus aptissima: & insipida, ut cucurbita, saporibus omnibus recipiendis sunt appositissima.

## O D O R.

Quantum odoris gratia in medicamentis tam sumendis quam admouendis valeat, docent abunde Medicorum omnium libri.

*Libr. 1. c. ph. part.*

Ob id enim Cleopatras Medicus ad capillos in capite gignendos succo radicis arundinis, muscis vstis, adipi vrsino, oleo cedrino, vinum aut passum affundebat, ut odor obtunderetur.

*Ibidem.*

Sic pilos tenuatibus scilicet, tergetibus, ut nitro, osi sepiæ, punici odorata miscet Galenus libro 1. composuit. phar. part. cyperum, schoenu anthos, melilotum, rosas siccas, iridem Illiricam, herbam cydonia m, melissophyllon: & si opulentis paras, spicam nardi, Indicam & Gallicam & montanam, terram Erethriadem, malabathrum, folium malabathri, amomum, myrrham, crocum, costum, mentham. Crito ibidem etiam pilothra suauem habere odorem volebat.

Nec te moneat, quod amomum, & alia quædam similia diuitum compositionibus addi legis, nonnunquam pauperum. Illis enim largius, his parcius immisceri intellige.

Vrina



Vrina licet achoribus sanandis conueniat, quia tamen est odore ingrato abominabilis non vtenda est. Ad odoris gratiam cyperrus additur capillos tenuantibus.

Sic odorum dentifricium facit Galenus miscendo casia aut amomi drachmas duas mediocribus: cinnamomi autem drachmam vnā regibus.

Bechicis adduntur semina petroselini, apij, dauci, scelos, vt aliorum medicamentorum insuauitatem suo odore grato & sapore emendent, & frigidorum vires obtundant, vt etiam vrinas prouocent.

Odorem cuique iucundum medicamentis addendum declarant emplastra *ivodia* id est, suaueolentia, vt intelligas nō sumēdis solis, sed etiam ad mouendis medicamentis odorem gratum esse conciliandum. Cū medicamenta omnia, præsertim purgantia, ventriculum, & præcipuē stomachum nervosam eius partem & maximē sensilem lædant, his odorifera sunt miscenda, quæ non eorum obtundant, actionem verò non impendant; quæ præterea tenuent crassos succos, incidant, tergeant, vias aperiant, per quas est vacuandum.

Quæ qualitates habent, odoras, misceri debent stomachicis, vt aromata & semina quædam etiam esculenta, anisum, daucum

*Ibidem.*

*Ibidem.*

*Lib. 5. cō.*

*ph. part.*

*Lib. 7. cō.*

*ph. par.*

*Gale. lib.*

*quos pur.*

*opor.*

cum, fefeli, cuminum, quæ etiam Hippocrates miscet peplo & veratro nigro, per id pleuriticidem sub diaphragmate purgaturus, ut medicamentoſum quod in eo eſt humanæ naturæ contrarium, mitigetur & obtundatur. Nam ut foetida omnia ſtomachum ſubvertere ſolêt, ſic odora roborare. Quod ſi non modo odora ſint, ſed etiam eſculenta, multipliciter iuuant ſtomachum malis humoribus ſubverſum, ut idem de vtero & vterinis remediis tibi perſuadeas.

**Zi. 8. met.**

Abſinthium aqua feruente tingerendum, quò minus odore offendat, poſtea oleo incoquendum ad ventris fluentis fomentum, ſi modo vacuatio amplius non duret.

Sic noſtra caſia tanquàm cinnamomo quæ ſumuntur omnia aromatizamus, aut alio odoroſamento naturæ ventriculi & partium aliarum principum familiari.

Odore enim iucundo fit, ut non modo iucundius fit medicamentum, ſed etiam eo odore ſpiritus animalis & vitalis reficiantur, ut alimentorum ſic medicamentorum. Quod fit, ut ſi poſthymia languentibus caryophyllum, nux moſchata, zingiber, & alia id genus animum mox reuocent, uti odor panis, aceti, vini, & ſimilium. Nam odore vires celerrime reficiuntur, ſecundo loco, poſtea tu poſtremo cibo.

**Apho. 18.**

**libr. 2.**

**Li. 11. ſim.**

Quam

Quam rem persuasi omnes graecolentia fugimus tam sani quàm ægri, ceu naturæ nostræ contraria; tametsi omnia id genus naturam nostram non lādere ostendat castorium odore abominabili, sed quod nec sumptum nec admotum cuiquam vnquam nocuit.

## S A P O R.

Saporum iucunditas cuique hominum naturæ sua magni est momenti, vt non modò alimentum sit salubre, sed etiā vt medicamentum sumptū sit efficax. Ob id rogandus quisque est medicamētū sumpturus, qua maximè saporis differentia delectetur. sunt enim qui austeris, alij acidis, alij dulcibus, sunt qui salis & amaris ducuntur, nonnullos acia delectant. Hunc igitur saporem medicamento insigniorem dabimus, quo æger præter cæteros delectatur, nisi eius vis affectum nobis curandum insigniter sit auctura. Nā sapores calidos salsum, amarum, acrem in affectibus multum calidis non probauero: vt neque frigidos acerbum, austum, acidum in frigidis. Cur autem non odore modò, sed etiam sapore suauia esse debeant alimenta, docet Galenus Aph. 38. libro 2. Paulò deterior cibus aut potus, suauior tamen, melioribus & minus saui-

*L. 6. c. 6.  
ph. par.*

bus est præferendus. Medicamenta verò iucunda esse quatenus licet, debent, ut à ventriculo comprehensi in actum reducuntur, ac ne nauseam, flatus fluctuationes ex insuauitate ipsa pariant, adeò ut citò supra aut infra ventriculus excernat. Sic qui primus stomaticum diamoron composuit, cum molle coxit, ut & gratius esset, & diutius seruari posset. Præstantior enim est succus mororum per se incipienti oris phlegmonæ, sed gratior & perseverantior cum melle coctus. Nam citra coctionem etiam cum melle repositus citò corrumpitur: coctus autem cum melle non modò diu seruat, sed etiam utilius sit sequentibus phlegmones temporibus, incremento, statui, & declinationi, ad perfectam usque curationem.

In omnibus autem oris affectibus medicamento suauitatem cuiusque palato gratam sumere non satis est, nisi ea visceribus ori per gulam & guttur communicantibus etiam innoxia sint.

Quæ considerans qui primus diamoron composuit stomaticum medicamentum, succum mororum cum melle coxit, ut scilicet gratius esset, & toto anno seruatum in proprio esset, quoties vrendi occasio incideret, non solum tempore mororum.

Opule

Opulentis itē & delicatis viris & mulieribus, & malo natura stomacho præditis, stomatica simplicia sunt gratiora medicamentosis, vt quod ex succo solorum mororum sit, quod omnium est maximè imbecillum: ex succo enim harinorum est valentius: hoc item potētius: ex succo corticis nucum viridium cocto cum melle, licet nō sit acerbis gustu, vehemētissimè tamen astringit, vt succus ex granatis acerbis cum corio tussis expressus, ex dulcibus autem sine cortice expressus est suauior sed imbecillior, cum cortice valentior sed insuauior. Ex tribus autem generibus simul tussis addito glycyrrhizæ succo, bonus est, nec immodicè exasperat. In his igitur vide, ne suauitas vires quæritas obscurer.

Eadem saporis gratia vinum phalernum acre laudatissimū mithridatio & theriacæ miscendum, vt amarorum in his antidotis multorū iniucunditatem tegat, docet Galenus lib. antidotorum. Sic Hippocrates veratro nigro daucū, vel fœfeli, vel cuminum: vel anisum: peplio silphij succū miscet, vel aliud quidpiā non solum odoris iucūdi: sed etiā saporis, quē sub olore intelligere nō est difficile, cū horum duorum sensōria sint substantia, situ, actione proxima, & in plerisque actionibus communia. His enim cōdi-

*Li. 2. rat.  
vict. acu.  
Ga. in natura.  
hum.*



mentis medicamento purgantis insuauitas corrigitur sic, vt in ventriculo diutius morari possit. Multa enim pharmaca potantia sunt insuauia, vt stomachum peruertant, & vomitum protinus cieant. Alia licet paululum in ventriculo manere possint, prauos tamen ructus mouent, & post euomuntur.

Sapor igitur cuique iucundus quoad eius fieri potest seruatis medicamenti viribus appareatur, in sumendis omnibus, vt alimentis, in quibus vt domini gulæ & palato coquus seruit: sic in sumendis omnibus per os medicamenti siue alterent tantum, siue humores apparent incidendo, tenuando, tergendo, siue humorem aliquem qualitate molestantem purgent, siue partes ipsas roborent totius substantiæ similitudine, vel astrictione, vel alia qualitate manifesta in temperaturæ partis contraria, siue ore retineantur, siue etiam deuorentur.

*Li. 4. salut. tuend.  
in oxymelle.*

*Lib. 4. salut. tuend.  
in diacalamishe.*

Cuiq; iucundus sapor nobis dicitur, quòd ne vinum quidem homini familiarissimū alimentum omnes idem iuuat, sed hunc dilutius, alterum meracius, sic nec oxymeli omnibus eadem aceti mellis & aquæ mēsurā coquendum, sed pro cuiusq; voluptate, quāquam plurimis naturis commune vnū scribi potest, quale quod à Galeno ibi describitur,

tur, non tamen omnibus: sic in diacalamin-  
the si mellis plus inieceris, pluribus iucundius  
facit: his tamen qui dulcia auersantur (sunt  
enim quædam talis naturæ) iniucundū. Fiat  
igitur medicamentum cuiusque naturæ iu-  
cundissimum, quoad eius fieri potest, sed  
tamen virium eius vtilitate seruata: hanc e-  
nim solui nolo, dum dulcedini & iucundita-  
ti studetur. Ob id rogādus quisque est æger  
ante medicamenti compositionem, quo sa-  
pore (& si vis qua forma medicamenti) ma-  
ximè delectetur.

*Lib. 6. cō.  
ph. par.*

## C O N S I S T E N T I A.

Crassa consistentia medicamenta ægrius  
& in corpus penetrant & deuorantur, quàm  
tenuia & liqda, vt cibo quàm potu impleri  
est difficilius: ob id crassa esse solent ingra-  
tiora & nauseabunda magis. Quæ causa est,  
cur bolos catharticos, vt vocamus, liquore  
aliquo suauiter dissoluere non rarò cogamur,  
qualia adhuc sunt ingratiiora, quàm quæ li-  
quidiora sunt & perspicua. Quapropter co-  
lo pāneo & albuminibus purgare solemus.  
taliam sunt nostra apozemata, zupia, sera-  
pia, & quæ in rē præsentē coquimus aut in-  
fundimus medicamenta vel purgantia, vel  
aliter corpori profutura. Ob id mel aqua  
exigua liquatur, vt poros cutis obstructos  
ingredi ad detergendum possit.

*Apho. II.  
lib. 2.*

*Lib. 8. me-  
thod.*

*Lib. 7. cō.  
ph. part.  
ad finem.*

Sic dum asthma & orthopnoea sunt ab humore crasso & lento, vel pure in asperæ arteriæ meatibus vel pulmonum cauernulis infarto, tenuantibus, tergentibus, & humiditate copiosiore, vt potu vini largiore opus est, quod crassus humor & lentus ceu liquidior redditus, sursum per tusses à tergentibus excitatas, egeratur. Si verò ab scissus adest, vino paucio opus, ob id siccantia esse incommoda reddendis ex thorace ac pulmone excreationibus docet Galenus.

*Li. 5. sim.  
cap. 21.  
Lib. 1. cō.  
ph. part.*

Est quando consistentia non ad gratiam tantum, sed ad melius agendum est. Ladani enim quia teræ consistentia est simile, humiditatem requirit, quæ liquidius ipsum faciat: vires tamen eius non minuat, imò potius augeat, cum fluentem capillum per id sistere consilium est. Liquidum igitur fiat in vase duplici, ex vino austero & oleo myrteo maceratum: vel solvatur oleo lentiscino, vel mastichino, vel myrteo, & si ætas & aer frigida sunt, nardino, vel vino veteri & austero. Quæ omnia adstringendi viribus cum ladano conueniunt, & calore alimentū pilis attrahente. Hispanum verò & omphacinum oleum solum astringunt: vetus sabinum, ricininum solum digerunt, ergo horum neutrum per se conuenit, sed priorum loco misceri ambo simul poss

possunt. Item ladanum liquidius confis-  
tantum capillis adhibemus: crassius rasis, ut  
illos penetret, his hæreat, addito quoq; po-  
lytricho fiet efficacius ad pilorum produ-  
ctionem. In his autem oleum & vinum  
etiam rationem habet eius, sine quo lada-  
num nec applicari, nec agere possit. Me-  
dicamentis quoque capillos fluentes sisten-  
tibus, nisi sint essentia tenui, adduntur alia,  
quæ tenuitate essentia intro penetrantia  
cutem quoque in alto adusque pilorum  
radices alterent, neque per summa tantum  
agant.

Consistentia mediocris qualis est mellis *Lib. 6. c.*  
Attici, aut sordium auris in stomaticis, ut in *ph. par.*  
diamoro, & similis crassitudo in stomachi-  
cis, ut in diacydonio.

Consistentia etiam parua linimentis, ma- *In fine li.*  
ior vnguentis & ceratis, durissima empla- *6. sancta.*  
stris. Quapropter his cera nunc parcior *tuend.*  
nunc largior, & lithargyros additur ad cor- *Lib. 1. c.*  
pus & materiam præbendam. Sic oleo ex *pha. p.*  
femine abietis, vel floribus populi nigrae, & *Lib. 4. sa-*  
anethino, & chamæmelino sampsychino, & *nita. tuen.*  
similibus cerâ & resinâ addit Gal. ubi diu-  
tius vult super vncto corpore manere.

Magna humoris & eius tepidi quanti-  
tas in vomitoriis est efficacior, præsertim

si oleagina addantur, & diebus aliquot sint præsumpta incidentia tergentia.

*Lib. 6. cō.*

*ph. p.*

*Lib. 8.*

*meth.*

Crassi vt metallica, terrea vrendo fiunt tenuiora, & sic aptiora ad penetrandum.

Dia *λαγύριον* ob essentia tenuitatem efficacius stomaticum quàm dia *μώριον*. Penicillus, purpura marina, præsertim optima Tyriatinctus, tenuiorem astringendi vim habet, qua altè penetrando corpora quæ sunt circa ventriculum siccet ac roboret, & calfaciat, si calida illi misceantur.

*Lib. 3. cō.*

*ph. p.*

Acetum essentia tenuitate in altum deducit medicamentorum aliorum vim, cum præsertim refrigerandū est: vt euphorbium, quando est calfaciendum.

*Lib. 8.*

*meth.*

Mastiche tusa oleo nardino mista ad for-  
dium crassitudinē sit, quo penicillus purpureus inadefactus stomacho imbecillo imponatur. Et hæc de tenui, duplici sicco & liquido. Contrà est, quando crassities optatior est, vt in vlceribus asperæ arteriæ, aut œsophagi crassa sint & lenta quæ adhibentur medicamenta oportet vlceri idonea, cum gummi tamen & tragacantha vel similibus, quæ suo lentore medicamentū affectæ parti diutiùs affigant. Crassitudine etià mediocri stomatica & stomachica esse componenda paulò antè probauimus. Sic in vlceribus intestinorum, vesicæ, vteri.

*Lib. 1. cō.*

*ph. p.*

Sic



Sic in alopecia, vbi olei laurini libræ vni Romanæ miscuisti thapsiæ, aut si valentius vis, euphorbij: si infirmius, sinapi & nasturcij partem duodecimam, hoc est, vnciam vnam: si facile à capite raso defluxurum tibi videbitur medicamentum, adde ceræ momentum, & vnciam vnam.

In nocturnis venereorum imaginibus crassioris substantiæ vnctiones seu cerata quibusdam compono, ne facile à corpore defluant.

*Li. 6. simpl.  
nit. iuen.*

Piper, zingiber, baccas iuniperi, mastichen, & alia quædã integra deuoramus, cum ventriculũ calfacere citra hepatis calidi noxam volumus. Si autẽ hepar & longinquas partes calfacere studiũ est, vel aliter medicamento tentare, nõ modò ea lauißimè trita sumimus, sed etiã liquori mista tenuißimo.

Huc pertinet, quòd quædã medicamentis inspißsands adduntur, quæ viribus eorũ nec obsunt nec profunt, sed materiæ rãtũ & corporis rationem obtinent, vt lithargyros emplasticis, & cera iisdem ac vnguẽtis, ceratis, linimentis.

Quanquã & lithargyros ceu materia *Libr. 9.*  
misceatur his quæ valentẽ habent facultatẽ *simpl.*  
mordicantem vel astringentem, & cera liquabilibus medicamentis etiã ceu materia, quia etiã ipsa quodãmodo media est

eorum, quæ valentem habent facultatem.

*Lib. 6. cõ.  
pha. part.*

Nonnūquam tenuitas & crassities actionem & suam & aliorum iuvant: ut diamor-  
ro addita crocus & myrrha, præterquàm  
quòd phlegmonas oris coquūt, & ille repel-  
lit, hæc suo calore abundè digerit eadē in al-  
tū corpus inflammatum essentia suæ te-  
nuitate subiens simul croci minūs substantia  
tenuis, & reliquorum vires secum trahit, ac  
phlegmone in altū vsq; sanat, ac citò ad  
cutim recurrendo, secum quæ in alto sunt à  
se tenuata educit. Crocus verò & succus mo-  
rorum vicissim contrahendo myrrham in-  
trò impellit, & eius ad cutim reditus celeri-  
tatem præpropriam inhibet. Ob hæc virtus  
diamori longius peruenit deductis altius à  
myrrha astringentibus: hæc autem myrrha  
ab astringentibus impulsæ mororum succo,  
croco, succo rhois, omphacio, rosis siccis, ba-  
laustio, malicorio, galla immatura, hypoci-  
sthide, & cæteris astringentibus vim dele-  
teriam non habentibus. prædicta enim mi-  
scentur, cū vis diamori validior est faciē-  
da. Quo loco tenuia & crassa tanquàm da-  
re operas mutuas videntur, & alterum alte-  
rius actionem reddere meliorem.

*Li. 5. cõ.  
ph. par.*

Præparatio item quædam per trituram,  
cribraturam, vstionem, lotionem, in pleris-  
que ut meliora sint, magni est momenti, &  
etiam

etiam ordo miscendi: vt si phlegmone induruit, medicamenta potentiùs digerentia probe trita & tenuissimè cribrata sint miscenda, vt costus, macer, amomum, cardamomum, pyrethrum, acorum, meon, dictamnus, succus Cyrenàicus vel Medicus. Sunt autem iniicienda, cum medicamentum propè omnino coctum erit, aut etiam absolute coctum.

Medicamenta componendo apta exactè sunt elaboranda, vt faciliùs corporis meatus subeant, ob quem tràsitù celerè si calida sunt sine morfu munere suo funguntur: si frigida, celerius expectatum opus præstant.

Alcyonia utraq; amygdalas amaras totas cum corricibus vstas & nitrù crematum alopecie adhibet Galen. vt tenuiorum sint partium, & ob id ad imam cutim vsque pilorum radices penetrent.

Medicamenta quæ per venarum oscula promptè subire volumus, & in omnem corporis partem digeri & ferri (qualia quæ sudores, vrinas, menses mouent, obstructiones liberant hepatis, lienis, renum, corporis habitus) illa sunt curiosè terenda, & tenuicribo cribranda, vt prorsus sint tenuissima. Sic Galenus calaminthen, pulegium, thymum, petroselinum, fesele, libypticum, semen apij, piper graue simul tusa subtili crib

Lib. I. r.  
pha. par.

Lib. 4. fa  
nit. tuen.  
in diaca-  
laminthe.

cribro creta miscet compositioni diacalaminthe, ad vacuandum humores acres in tota carne cessantes.

Sic ibidem nitrum, cuminum, rutam, pipertenuissimum & minutissimū, facere docet, cum urinas multas mouere consilium est: crassius verò id faciendū, quoties per id alius est deicienda, ac huius præcepti in omnium medicamentorum cōpositione meminisse expedit. Sic hodie nos rha barbarum negligenter terimus, cum alius per id ducenda est: curiosè verò tritū damus urinas moturi.

*Lib. 6. c.*

*ph. par.*

Aromata sunt miscēda ad finem coctionis, aut ea iā absoluta, cum vas ab igne deposueris, quòd largior ipsoꝝ coctio aromaticis medicamentis vires adimit: contra verò lithargyros, molybdæna, & alia multa metallica coquendo meliora redduntur.

*Lib. 6. c.*

*ph. par.*

Succis stomaticis crassis mel statim ab initio est miscendum, si liquidiores sint, ut succus nucum: percoqui debent antequam mel addatur. nam coctione tam longaustum amaricaret.

Multò plura de his quæ ad medicamentorum præparationē pertinent, leges libro tertio. Quæ hīc adscribere nō est visum, ne idem bis dictum quisquā calumnietur, nulla neque vtilitate neque necessitate.

Est

Est quādo acris & mordens qualitas expetitur, vt in balanis & clysteribus per mel, saccharum rubrum, hieram picram, mercurialem, sales, id genus alia.

Neq; basibus ipsis solū addenda, quæ ipsam ad partem sibi familiarem deducant, sed etiā quæ ipsam in ea parte remorentur, vt si in hepate medicamentum morari diutius volo, semen raphani stomacho grātum ei misceo, quod medicamentū distribui festinans retrahat & remoretur. Additur & multis opium, quod vires medicamenti per corpus distributi tot coctionibus resolui prohibeat, aliis ad sensus stuporem in vehementissimis doloribus.

An verò multa medicamēta eadē facultate prædita misceri debeāt, tāquā cōpositum melius redditura, ambigi potest, cū frustra fiat pluribus, quod paucioribus perfici potest: tamen causæ quædā nōnunquā incidunt, vt docuimus, quæ nos ad id faciendum compellunt, nec factum hoc nostrum caret veterum imitatione: nam Galenus in compositione medicamētorum secundum partes idē pollentia sæpe miscet, vt ad diuturnam & curatu difficilem alopeciā simplicia eiusdē facultatis euphorbiū, thapsia, sulfur viuum, elleborus alteruter cum oleo laurino, aut cicino, aut veteri miscentur.

*Libr. I.*

Opo



*Libro 2.*

Opobalsamum, peucedanum, castorium  
& simul & priuatim seorsumq; singula in  
vetericapitis dolore cum oleo & aceto mi-  
scet Archigenes apud eundem, nec repre-  
*Ibidem.* henditur. Viricem, mentham, amygdala a-  
mara, iridem, ana cum aceto & rosaceo.

*Libr. 6.*

In stomatico diuiritum costi, amomi, ma-  
ceris, opij Cyrenaiici vel Medici, vel alteri?  
pauperum verò dictamni, cardamomi, mei,  
acori, sinapi, duorum, trium, vel omnium  
quantam voles mensuram, modo sint tan-  
tum horum drach. tres, aut drac. quatuor &  
dimidia, pro libra mellis. Si autem quatuor  
aut quinque drach. miscueris, digerens ma-  
gis reddis medicamentum.

*Ibidem.*

Diamoro & aliis stomaticis diuiritum mi-  
scere potes vel corticis casia, vel nardi Indi-  
cæ, vel folij malabathri, vel omniū triū ana  
*Ibidem.* drac. vnam, vel drac. vnā & dimidiā. Pro

*Lib. 3. ad  
finem.*

omphacio succus rhois, vel æqualis vtriusq;  
portio diamoro miscetur. Chalcitio, mi-  
sy, chalcāthum simul miscet Andromachus  
*Ibidem.* apud Galenū. Adipes leonis, pardalis, hye-  
næ, anseris, vrsi propè eadē facultate prædi-  
tos, si habes, omnes simul miscere oportet,  
& ad horum partem vnā euphorbij vel  
thapsiæ partem duodecimā, vel vtriusq; ana  
partem duodecimam, tūcq; fit valentius.

Seminis erucæ, & nasturtij, & nitri ana mi-  
scet

scet Heras ibidē. Medicamento stoma- *Libr. 6. c.*  
 ticodīa gleucus miscet heminas tres rhus *ph. part.*  
 coriarij, vel culinarij, aut amborū simul ana-  
 heminam vnā & dimidiā, & etiā paulò am-  
 plius: & addit astringentia, si principium est  
 fluxionis: digerentia, si declinatio morbi  
 ex fluxione nati. Quod si vnicū habes vel  
 astringēs vel digerēs simplex medicamen-  
 tū, illius quātitatem auge, vt expleat, quod  
 ab omnibus colligebatur. Quin ipsi dia-  
 gleucus & diacaryo omnia immittere licet  
 initio quidem astringentia, vt gallā imma-  
 turā, surculos molles rubi, vel canis rubi, vel  
 corni, mespili, sorbi, & fructū eius, & myr-  
 rum: rosam, glauciū, cytinos, balausia, om-  
 phacium, rhus vtrūq; prius aqua-coctū, ta-  
 maricen, spinæ Aegyptiæ fructū, & cætera  
 astringentia, præter ea quæ pharmacæ, id  
 est venenosam & noxiā facultatē habent, si  
 deglutiantur. Digerentia verò mediocria  
 decoctū cariearū, furfuris, mulsam cui inco-  
 ctū sit origanū, hyssopū, thymū, calamin-  
 the, pulegiū, metha odorata. Fortiora sunt,  
 eāq; amplius coquenda, nitrū vstū, nitrī spu-  
 ma, valentius his sulfur vinum, pyrethrum.

Andromachus in diarrhœo miscet cinna-  
 momi & casia ana drach. vnam.

*Libr. 6.*

Crocī & crocomagmatis ana drac. duas. *Ibidem.*

Alumen rotundū, fori, misy, chalcidis ad *Ibidem.*

*oris*

oris vlcera simul miscētur apud Galenum.

Generosissimæ oris collutiones in phlegmone gargareonis, vel aliarum oris partium incipiente parātur ex prædictis astringentibus, vel singulis per se, vel decoctis in aqua cum aliis. Mirum enim quanto ipsorum mistiones subinde vtiliores fiant vsu simplicium.

*In fine li.*

*z. c. ph. g.*

Emplastro cuidā albę miscet cadmię, pōpholygis, cineris buccinorū, squamæ æris, calcis lotæ, chalcitidis vstæ & lotæ singulorum drach. quatuor, vel drachm. sex, si ex his tantum quatuor simplicia misceantur: vel drach. duodecim, si tātum duo tibi sunt ad manum, vt ex his quomodolibet iunctis drac. viginti quatuor. i. vncię tres iniiciātur.

Tamen si altiùs spectes, hæc non idem pollent nisi genere, sed ratione maioris & minoris differunt: vt euphorbium violentius est thapsia, & hæc potentior nasturtio, vt libr. i. comp. ph. par. sic in aliis discrimen aliquod inuenias.

In arteriacis iisdem casia, cinnamomum, amomum, nardus Gallica & Indica, costus, schœnuanthos, malabathrum, & magma malabathri ponūtur. Itē thus, crocus, myrrha dispositiones coquentia iisdem miscētur: sic & glycyrrhiza, gummi, & tragacantha, quæ exasperata læuigant.

In

In diœspolitico ruta, piper, cucinum, mel  
 curiosè despumatũ, nitrum, ad flatuſ discutiendos omnia efficacia. In medicamento  
 dia trion. pipereon tria piperis genera, zingiber, anisum, thymum. In dia calaminthe, calaminthe, thymum, pulëgium, apium, petroselinum, fœfeli, libyſticum, piper graue.

*Lib. 4. ſanit. tuen.*

Ex libris aliis Galeni exempla aſſerre poſſumus propè innumerabilia, in quibus idè propè pollentia medicamēta ſimul miſcentur etiam plurima. Vide tamē ne copia immodica luxuries, magno ſæpe ægri diſpendio, ſed contentus eſto ſimplicibus quàm fieri poteſt pauciſſimis. Quò enim ſimpliciora ſunt compoſita, ſi ſcopis noſtris ſatisfaciunt, eò ſunt præſtantiora, præſertim quæ mox à componendo ſunt uſurpanda. Quæ verò ex pluribus conſtant, longa omnium ſimul ceu fermentatione percoqui ferè indigent, per quam viſ perſæpe contraria prior acquiritur, & forma quædam noua à ſimplicium formis diuerſa, per ſolam experientiam cognita: vt theriace recens ſtupeſcit (niſi cinnamomi præſtantia coctionem eius accelerarit, vt in theriace audies) vetuſ calfacit, & opera præſtat maxima, quorum vix vllum in recenti inuenias. Ob id experta à veteribus & doctioribus cõpoſita medicamenta ſunt neotëricorũ compoſitis me-

liora: nisi si qua hi inuenerunt, quæ vsus iam multus optima probarit.

## C O N S E R V A N T I A.

**P**ostremò cùm satis non sit medicamentum nos habere compositum in eum affectum efficax: cuius gratia composuimus, & addita esse à nobis ea, quæ sunt actioni optatæ non modò necessaria, sed etiam vtilia: nisi idem compositum à situ & putredine seruetur non dies tantū aliquot, sed menses & annos, interdum etiam multos. Idq; ne frequenter idem componendi labor non necessarius sit sumendus, vel ne simplicium in id necessariorum nunc recentiu facultas tunc non sit, cùm medicamento erit opus: vel vt tempore vires acquirat medicamentum non solū valentiores, sed sepe etiā prioribus contrarias: quod in theriace & mithridatio accidit, quæ primis mensibus stupefaciunt, postea calfaciunt.

Porro seruare possunt omnia, quæ siccant & humiditatē excrementosam putredinis authorem absument, vel per se, vt sicca: vel per accidens, vt calida. Ob id omnia seruanda medicamēta tam simplicia quàm composita corruptioni obnoxia (quedam enim per se diutissimè integra durāt, vt metalli



tallica, terrea, semina, fructus multi) siccamus vel sole vel igni: etiam siccantibus adiectis, melle, saccharo, aceto tum per se, tum cum sale; qui solus tamen capparibus & carnibus seruandis. & oleo, & omphacio, & aliis multis sufficit, siccando & astringendo, ne calor externus vna putredinis causa eas subeat, aut internus foras exhalet, quæ quia superfusum oleum intus cohibet, etiam solum succis multis diu seruandis sufficit, vt limonum, granatorum, cydoniorum. *Ea- Initio lib. 7. cõ. ph. p.*  
 dem de causa aqua pluuiæ diacodio miscetur, vt medicamentum putredini minus sit obnoxium: habet enim hæc aqua in se aliquid astringens. Quatenus autem quodque genus medicamentorum compositorum sit siccandũ, hic audire ne expectes, sed partim imitatione & experiẽtia discas licet: partim ex his intelliges, quæ in modo præparandi singula medicamentorum compositorum genera libro quarto scribemus.

Sic hiera picra melle despumato excepta *Lib. 7. method.*  
 fit durantiũs medicamentũ, & theriaca, & diacalaminthe, &c. Sic succus mororũ coctione per se, deinde cum melle fit durantiũs diamoron.

Medicamentis compositis id iam adeptis *Lib. 6. cõ. ph. part.*  
 cura nostra vt seruari diu possint, ad vrium custodiam ne exhalent, & ipsorum

*Lib. 7. cō.  
ph. part.  
ad finem.*

Sic dum asthma & orthopnea sunt ab humore crasso & lento, vel pure in asperæ arteriæ meatibus vel pulmonum cauernulis infarto, tenuantibus, tergentibus, & humiditate copiosiore, vt potu vini largiore opus est, quod crassus humor & lentus ceu liquidior redditus, sursum per tusses à tergentibus excitatas, egeratur. Si vero abscessus adest, vino paucio opus, ob id siccantia esse incommoda reddendis ex thorace ac pulmone excreationibus docet Galenus.

*Li. 5. sim.  
cap. 21.  
Lib. 1. cō.  
ph. part.*

Est quando consistentia non ad gratiam tantum, sed ad melius agendum est. Ladanium enim quia ceræ consistentia est simile, humiditatem requirit, quæ liquidius ipsum faciat: vires tamen eius non minuat, imò potius augeat, cum fluentem capillum per id sistere consilium est. Liquidum igitur fiat in vase duplici, ex vino austero & oleo myrteo maceratum: vel soluatur oleo lentiscino, vel mastichino, vel myrteo, & si ætas & aer frigida sunt, nardino, vel vino veteri & austero. Quæ omnia adstringendi viribus cum ladano conueniunt, & calore alimentū pilis attrahente. Hispanum verò & omphacinum oleum solum astringunt: vetus sabinum, ricinum solum digerunt, ergo horum neutrum per se conuenit, sed priorum loco misceri ambo simul

poss

possunt. Item ladanum liquidius confis-  
tantum capillis adhibemus: crassius rasis, ut  
illos penetret, his hæreat, addito quoque po-  
lytricho fiet efficacius ad pilorum produ-  
ctionem. In his autem oleum & vinum  
etiam rationem habet eius, sine quo lada-  
num nec applicari, nec agere possit. Me-  
dicamentis quoque capillos fluentes sisten-  
tibus, nisi sint essentia tenui, adduntur alia,  
quæ tenuitate essentia intro penetrantia  
cutem quoque in alto adusque pilorum  
radices alterent, neque per summa tantum  
agant.

Consistentia mediocris qualis est mellis *Lib. 6. c.*  
Attici, aut sordium auris in stomaticis, ut in *ph. par.*  
diamoro, & similis crassitudo in stomachi-  
cis, ut in diacydonio.

Consistentia etiam parua linimentis, ma- *In fine li.*  
ior vnguentis & teratis, durissima empl- *6. sancta.*  
stris. Quapropter his cera nunc parcior *tucnd.*  
nunc largior, & lithargyros additur ad cor- *Lib. 1. c.*  
pus & materiam præbendam. Sic oleo ex *pha. p.*  
semine abietis, vel floribus populi nigrae, & *Lib. 4. si-*  
anethino, & chamemelino sampsychino, & *mita. tucn.*  
similibus ceram & resinam addit Gal. ubi diu-  
tius vult super uncto corpore manere.

Magna humoris & eius tepidi quanti-  
tas in vomitoriis est efficacior, præsertim

si oleagina addantur, & diebus aliquot sint præsumpta incidentia tergentia.

Lib. 6. cō.

ph. p.

Libr. 8.

meth.

Crassi vt metallica, terrea vrendo fiunt tenuiora, & sic aptiora ad penetrandum.

Dia *λαρύνου* ob essentiaē tenuitatem efficacius stomaticum quàm dia *μώρων*. Penicillus, purpura marina, præsertim optima Tyria tinctus, tenuiorem astringendi vim habet, quæ altè penetrando corpora quæ sunt circa ventriculum siccet ac roboret, & calfaciat, si calida illi misceantur.

Lib. 3. cō.

ph. p.

Acetum essentiaē tenuitate in altum deducit medicamentorum aliorum vim, cum præsertim refrigerandū est: vt euphorbium, quando est calfaciendum.

Libr. 8.

meth.

Mastiche tusa oleo nardino mista ad fordium crassitudinē sit, quo penicillus purpureus madefactus stomacho imbecillo imponatur. Et hæc de tenui, duplici sicco & liquido. Contrà est, quando crassities optatior est, vt in vlceribus asperæ arteriaē, aut œsophagi crassa sint & lenta quæ adhibentur medicamenta oportet vlceri idonea, cum gummi tamen & tragacatha vel similibus, quæ suo lentore medicamentū affectæ parti diutius affigant. Crassitudine etiā mediocri stomatica & stomachica esse componenda paulò antè probauimus. Sic in vlceribus intestinorum, vesicæ, vteri.

Lib. 1. cō.

ph. p.

Sic

Sic in alopecia, vbi olei laurini libræ vni Romanæ miscuisti thapsiæ, aut si valentius vis, euphorbij: si infirmius, sinapi & nasturcij partem duodecimam, hoc est, vnciam vnam: si facile à capite raso defluxurum tibi videbitur medicamentum, adde ceræ momentum, & vnciam vnam.

In nocturnis venereorum imaginibus *Li. 6. fa-*  
crassioris substantiæ vnctiones seu cerata *nit. tum.*  
quibusdam compono, ne facile à corpore defluant.

Piper, zingiber, baccas iuniperi, mastichen, & alia quædã integra deuoramus, cum ventriculũ calfacere citra hepatis calidi noxam volumus. Si autẽ hepar & longinquas partes calfacere studiũ est, vel aliter medicamento tentare, nõ modò ea læuissimè trita sumimus, sed etiã liquori mista tenuissimo.

Huc pertinet, quòd quadã medicamentis inspissandis adduntur, quæ viribus eorũ nec obsunt nec profunt, sed materiæ rãtũ & corporis rationem obtinent, vt lithargyrose emplasticis, & cera iisdem ac vnguẽtis, ceratis, linimentis.

Quanquã & lithargyros ceu materia *Libr. 9.*  
misceatur his quæ valentẽ habent facultatẽ *simpl.*  
mordicantem vel astringentem, & cera liquabilibus medicamentis etiam ceu materia, quia etiam ipsa quodãmodo media est



torum, quæ valentem habent facultatem.

*Lib. 6. cõ.  
pha. part.*

Nonnūquam tenuitas & crassities actionem & suam & aliorum mutant: ut diamoro addita crocus & myrrha, præterquam quod phlegmonas oris coquunt, & ille repellit, hæc suo calore abundè digerit eadē in altum corpus inflammatum essentia suæ tenuitate subiens simul croci minis substantia tenuis, & reliquorum vires secum trahit, ac phlegmonem in altū vsq; sanat, ac citò ad cutim recurrendo, secum quæ in alto sunt à se tenuata educit. Crocus verò & succus mororum vicissim contrahendo myrrham intro impellit, & eius ad cutim reditus celeritatem præpropetam inhibet. Ob hæc virtus diamori longius peruenit deductis altius à myrrha astringentibus: hæc autem myrrha ab astringentibus impulsæ mororum succo, croco, succo rhois, omphacio, rosæ siccis, balauitio, malicorio, galla immatura, hypocisthidae, & cæteris astringentibus vim deleteriam non habentibus. prædicta enim miscentur, cum vis diamori validior est faciēda. Quo loco tenuia & crassa tanquam dare operas mutuas videntur, & alterum alterius actionem reddere meliorem.

*Li. 5. cõ.  
ph. par.*

Præparatio item quædam per trituram, cribraturam, vitionem, lotionem, in plerisque ut meliora sint, magni est momenti, & etiam

etiam ordo miscendi: vt si phlegmone induruit, medicamenta potentius digerentia probe trita & tenuissimè cribrata sint miscenda, vt costus, macer, amomum, cardamomum, pyrethrum, acorum, meon, dictamnus, succus Cyrenaicus vel Medicus. Sunt autem iniicienda, cum medicamentum propè omnino coctum erit, aut etiam absolute coctum.

Medicamenta componendo apta exactè sunt elaboranda, vt facilius corporis meatus subeant, ob quem transitu celerè si calida sunt sine morfu munere suo funguntur: si frigida, celerius expectatum opus præstant.

Alcyonia vtraq; amygdalas amaras totas cum corricibus vstas & nitrū crematum alopecie adhibet Galen. vt tenuiorum sint partium, & ob id ad imam cutim vsque pilorum radices penetrent.

Medicamenta quæ per venarum oscula promptè subire volumus, & in omnem corporis partem digeri & ferri (qualia quæ sudores, vrinas, menses mouent, obstructions liberant hepatis, lienis, renum, corporis habitus) illa sunt curiosè terenda, & tenui cribro cribranda, vt prorsus sint tenuissima. Sic Galenus calaminthen, pulegium, thymum, petroselinum, fefeli, libysticum, semen apij, piper graue simul tusa subtili

crib

*Lib. 1. r.  
pha. par.*

*Lib. 4. s.  
nit. euen.  
in diacalaminthe.*

cribro creta miscet compositioni diacalaminte, ad vacuandum humores acres in tota carne cessantes.

Sic ibidem nitrum, cuminum, rutam, piper tenuissimum & minutissimū, facere docet, cum urinas multas mouere consilium est: crassius verò id faciendū, quoties per id aluus est deicienda, ac huius præcepti in omnium medicamentorum cōpositione meminisse expedit. Sic hodie nos rha barbarum negligenter terimus, cum aluus per id ducenda est: curiosè verò tritū damus urinas moturi.

*Lib. 6. c.*  
*ph. par.*

Aromata sunt miscēda ad finem coctionis, aut ea iā absoluta, cum vas ab igne deposueris, quòd largior ipsorum coctio aromaticis medicamentis vires adimit: contra verò lithargyros, molybdæna, & alia multa metallica coquendo meliora redduntur.

*Lib. 6. c.*  
*ph. par.*

Succis stomaticis crassis mel statim ab initio est miscendum, si liquidiores sint, ut succus nucum: percoqui debent antequam mel addatur. nam coctione tam longa vstum amaricaret.

Multò plura de his quæ ad medicamentorum præparationē pertinent, leges libro tertio. Quæ hīc adscribere nō est visum, ne idem bis dictum quisquā calumnietur, nulla neque vtilitate neque necessitate.

Est

Est quādo acris & mordens qualitas expetitur, vt in balanis & clysteribus per mel, saccharum rubrum, hieram picram, mercurialem, sales, id genus alia.

Neq; basibus ipsis solū addenda, quæ ipsam ad partem sibi familiarem deducant, sed etiā quæ ipsam in ea parte remorentur, vt si in hepate medicamentum morari diutius volo, semen raphani stomacho grātum ei misceo, quod medicamentū distribui festinans retrahat & remoretur. Additur & multis opium, quod vires medicamenti per corpus distributi tot coctionibus resolui prohibeat, aliis ad sensus stuporem in vehementissimis doloribus.

An verò multa medicamēta eadē facultate prædita misceri debeāt, tāquā cōpositum melius redditura, ambigi potest, cū frustra fiat pluribus, quod paucioribus perfici potest: tamen causæ quædā nōnunquā incidunt, vt docuimus, quæ nos ad id faciendum compellunt, nec factum hoc nostrum caret veterum imitatione: nam Galenus in compositione medicamētorum secundum partes idē pollentia sæpe miscet, vt ad diuturnam & curatu difficilem alopeciā simplicia eiusdē facultatis euphorbiū, thapsia, sulfur viuum, elleborus alteruter cum oleo laurino, aut cicino, aut veteri miscentur.

*Libr. I.*

Opo

*Libro 2.*

Opobalsamum, peucedanum, castorium  
& simul & priuatim seorsumq; singula in  
veteri capitis dolore cum oleo & aceto mi-  
scet Archigenes apud eundem, nec repre-  
henditur. Vt icem, mentham, amygdala a-  
mara, iridem, ana cum aceto & rosaceo.

*Libr. 6.*

In stomatico diuitem costis, amomi, ma-  
ceris, opij Cyrenaici vel Medici, vel alteri?  
pauperum verò dictamni, cardamomi, mei,  
acori, sinapi, duorum, trium, vel omniū  
quantam volēs mensuram, modò sint tan-  
tū horum drach. tres, aut drac. quatuor &  
dimidia, pro libra mellis. Si autem quatuor  
aut quinq; drach. miscueris, digerens, ma-  
gis reddis medicamentum.

*Ibidem.*

Diamoro & aliis stomaticis diuitem mi-  
stere potes vel corticis casia, vel nardi Indi-  
cæ, vel folij malabathri, vel omniū triū ana  
drac. vnam, vel drac. vnā & dimidiā.

*Ibidem.*

Pro omphacio succus rhois, vel æqualis vtriusq;

*Lib. 3. ad**finem.**Ibidem.*

portio diamoro miscetur. Chalciton, mi-  
sy, chalcāthum simul miscet Andromachus  
apud Galenū. Adipes leonis, pardalis, hye-  
næ, anseris, vrsi propè eadē facultate prædi-  
tos, si habes, omnes simul miscere oportet,  
& ad horum partem vnam euphorbij vel  
thapsiæ partem duodecimā, vel vtriusq; ana  
partem duodecimam, tūc q; fit valentius.

Seminis eruce, & nasturtij, & nitri ana mi-  
scet



fecet Heras ibidē. Medicamento stoma- *Libr. 6. c. 1.*  
 ricodīa gleucus miscet heminas tres rhus *ph. part.*  
 coriarij, vel culinarij, aut amborū simul ana.  
 heminam vnā & dimidiā, & etiā paulò am-  
 plius: & addit astringentia, si principium est  
 fluxionis: digerentia, si declinatio morbi  
 ex fluxione nati. Quod si vnicū habes vel  
 astringēs vel digerēs simplex medicamen-  
 tū, illius quāritatem auge, vt expleat, quod  
 ab omnibus colligebatur. Quin ipsi dia-  
 gleucus & diacaryo omnia immittere licet  
 initio quidem astringentia, vt gallā imma-  
 turā, surculos molles rubi, vel canis rubi, vel  
 corni, mespili, sorbi, & fructū eius, & myr-  
 rum: rosā, glauciū, cytinos, balauftia, om-  
 phaciū, rhus vtrūq; prius aqua coctū, ta-  
 maricen, spinæ Aegyptiæ fructū, & cætera  
 astringentia, præter ea quæ pharmacodē, id  
 est venenosā & noxiā facultatē habent, si  
 deglutiantur. Digerentia verò mediocria  
 decoctū cariearū, surfuris, mulsam cui inco-  
 ctū sit origanū, hyssopū, thymū, calamin-  
 the, pulegiū, metha odorata. Fortiora sunt,  
 eāq; amplius coquenda, nitrū vstū, niri spu-  
 ma, valentius his sulfur viuum, pyrethrum.

Andromachus in diarrhoeo miscet cinna-  
 momi & casia ana drach. vnā.

*Libr. 6.*

Croci & crocomagmatis ana drac. duas. *Ibidem.*

Alumen rotundū, fori, misy, chalcicis ad *Ibidem.*

*oris*

oris vlcera simul miscētur apud Galenum.

Generosissimæ oris collutiones in phlegmone gargareonis, vel aliarum oris partium incipiente parātur ex prædictis astringentibus, vel singulis per se, vel decoctis in aqua cum aliis. Mirum enim quanto ipsorum mitiones subinde vtiliores fiant vsu simplicium.

*In fine li.*

*l. c. ph. g.*

Emplastro cuidā albę miscet cadmię, pōpholygis, cineris buccinorū, squamæ aris, calcis lotæ, chalcitidis vstæ & lotæ singulorum drach. quatuor, vel drachm. sex, si ex his tantum quatuor simplicia misceantur: vel drach. duodecim, si tātum duo tibi sunt ad manum, vt ex his quomodolibet iunctis drac. vigintiquatuor. i. vncię tres iniiciātur.

Tamen si altiùs spectes, hæc non idem pollent nisi genere, sed ratione maioris & minoris differunt: vt euphorbium violentius est thapsia, & hæc potentior nasturtio, vt libr. i. comp. ph. par. sic in aliis discrimen aliquod inuenias.

In arteriacis iisdem casia, cinnamomum, amomum, nardus Gallica & Indica, costus, schœnuanthos, malabathrum, & magma malabathri ponūtur. Itē thus, crocus, myrrha dispositiones coquentia iisdem miscētur: sic & glycyrrhiza, gummi, & tragacantha, quæ exasperata læuigant.

In

In diespolitico ruta, piper, cuminum, mel  
curiosè despumatū, nitrum, ad flatum discuti- *Lib 4. fa-*  
endos omnia efficacia. In medicamento *nit. tuen.*  
dia trion piperis tria piperis genera, zin-  
giber, anisum, thymum. In dia calaminthe,  
calaminthe, thymum, pulgium, apium, pe-  
troelinum, fefeli, libysticum, piper graue.

Ex libris aliis Galeni exempla afferre pos-  
sumus propè innumerabilia, in quibus idē  
propè pollentia medicamēta simul miscen-  
tur etiam plurima. Vide tamē ne copia im-  
modica luxuries, magno sēpe ægri dispen-  
dio, sed contentus esto simplicibus quā  
fieri potest paucissimis. Quò enim simpli-  
ciora sunt composita, si scopis nostris satis-  
faciunt, eò sunt præstantiora, præsertim quæ  
mox à componendo sunt vsurpanda. Quæ  
verò ex pluribus constant, longa omnium  
simul ceu fermentatione percoqui ferè indi-  
gent, per quam vis per sēpe contraria prio-  
ri acquiritur, & forma quædam noua à sim-  
plicium formis diuersa, per solam experien-  
tiam cognita: vt theriace recens stupefacit  
(nisi cinnamomi præstantia coctionem e-  
ius accelerarit, vt in theriace audies) vetus  
calfacit, & opera præstat maxima, quorum  
vix vllum in recenti inuenias. Ob id exper-  
ta à veteribus & doctioribus cōposita medi-  
camenta sunt neotéricorū compositis me-

liora: nisi si qua hi inuenerunt, quæ usus iam multus optima probarit.

## C O N S E R V A N T I A .

**P**ostremò cum satis non sit medicamentum nos habere compositum in eum affectum efficax: cuius gratia composuimus, & addita esse à nobis ea, quæ sunt actioni optatæ non modò necessaria, sed etiam utilia: nisi idem compositum à situ & putredine seruetur non dies tantum aliquot, sed menses & annos, interdum etiam multos. Idq; ne frequenter idem componendi labor non necessarius sit sumendus, vel ne simplicium in id necessariorum nunc recentium facultas tunc non sit, cum medicamento erit opus: vel ut tempore vires acquirat medicamentum non solum valentiores, sed sepe etiam prioribus contrarias: quod in theriace & mithridatio accidit, quæ primis mensibus stupefaciunt, postea calfaciunt.

Porro seruare possunt omnia, quæ siccant & humiditatem excrementosam putredinis authorem absument, vel per se, ut sicca: vel per accidens, ut calida. Ob id omnia seruanda medicamenta tam simplicia quam composita corruptioni obnoxia (quedam enim per se diutissimè integra durant, ut metalli

tallica, terrea, semina, fructus multi) siccamus vel sole vel igni: etiam siccantibus adiectis, melle, saccharo, aceto tum per se, tum cum sale; qui solus tamen capparibus & carnibus seruandis. & oleo, & oinphacio, & aliis multis sufficit, siccando & astringendo, ne calor externus vna putredinis causa eas subeat, aut internus foras exhalet, quē quia superfusum oleum intus cohibet, etiam solum succis multis diu seruandis sufficit, vt limonum, granatorum, cydoniorum. Ea- *Initio lib.*  
dem de causa aqua pluuia diacodio miscetur, vt medicamentum putredini minus sit obnoxium: habet enim hæc aqua in se aliquid astringens. Quatenus autem quodque genus medicamentorum compositorum sit siccandū, hic audire ne expectes, sed partim imitatione & experiētia discas licet: partim ex his intelliges, quæ in modo præparandi singula medicamentorum compositorum genera libro quarto scribemus. *7. cō. ph. p.*

Sic hiera picra melle despumato excepta *Lib. 7. method.*  
fit durantius medicamentū, & theriaca, & diacalaminthe, &c. Sic succus mororū coctione per se, deinde cum melle fit duratius diamoron.

Medicamentis compositis id iam adeptis *Lib. 6. cō. ph. part.*  
cura nostra vt seruari diu possint, ad vrium custodiam ne exhalent, & ipsorum



tutelam ab iniuriis externis, aëre, puluere, araneis, muribus, & id genus reliquis, loco est opus non solum communi, sed etiam proprio cuique quo seruetur: cum simplicia plurima si loco communi solo serues, nihil pecces. Reponantur autem composita ut simplicia in aëre sublimi, perflatili, sicco, non subterraneo, praesertim humido, ut in quo situs celeriter proueniat, qui medicamentum corrumpat. Succi tamen oleo superfuso tecti cellis vinariis, uti omphacium, melius seruantur, quo aëris externi magnis mutationibus aer ille minus sit obnoxius.

Tamen in magnis urbibus & frequentibus cum densa & angusta sint aedificia, & contignationes plerumque humiles, redimitur iniuria a pertis dies toros fenestris: praeterea siccitate ignis ad quotidianas compositiones necessarij. In his tamen officinis multo sunt praestantiores, ad quas scanditur, & a quarum area tabulatum abest longius. Praeterea quae aëri libero sunt aperta ac soli, modo is radio medicamenta composita non attingat. Nec improbande, quae solem orientem aut etiam occidentem spectant, neque etiam in septentrionem aperta, modo sublimes, perflatiles, a cloacarum & aliorum inquinamentorum iniuria remotissimae.

*Lib. I. an-  
tidot.*

Priuatius autem locus cuiq; medicamentorum compositorum generi suus est, antidotis suus, trochiscis suus, su<sup>p</sup> & catapotiiis, & aliis similiter. Is autē ferē vas est, idq; vel terreum, & id multiplex, vel vitreum, vel ligneum, vel stanneum, quæ maxima turba est, contra Galeni decretum, vel etiam aliis metallis constans. Præter hæc quædam alio teguntur, vt cataportiorum massa aluta alba colligatur. Sed de his fusiùs libro sequente, in pharmacopolarum instrumentis.

Omnia tamen operculantur, quædam simplici ex eadem materia tegmine, & eo interdum per ambitum picato aut cerato: alia subere, linteo, stuppa, membranis, corio, papyro, aut alia re quauis, nonnulla etiã cera, resina: quædam solo, vt diximus, oleo, quæ tamen & communi tegmine ex papyro aut alio obstruuntur.

Exemplo basim & cætera exerce in hiera picra. Aloë sola in hiera prauos humores ex ventriculo vacuat, mastiche additur ceu apta stomacho & grati odoris, & ad frangendam vim aloës medicamentosam efficax.

Cinnamomum tenuissimarum partium, ventriculi runicarum meatus aperit, humorum crassitiem tenuat, & lentorem terget, quos alioqui aloë nunquā traxerit ob im-

becillam vim purgatoriam. Ad biliofas autem in ventre dispositiones præstantissimū est remediū, vt multos stomachi vitio molestatos vno die frequenter sanauerit. Cinnamonū item alios omnes affectus ex prauis succis contractos suauat mistum: quia facultatem habet, qua prauas qualitates in naturalem statum reducit. Poterantque hæc duo sufficere, cum cætera sint partim apta stomacho, partim tenuia & abstersoria, virtute tamē longè inferiora mastiche & cinnamomo: genus autem facultatis idem habentia, lib. 8. comp. ph. part.

#### Q U A N T I T A S.

**H**Aftenus qua methodo simplicium medicamentorum compositioni aptorum delectū facere oporteat, & quot vt paucissimis ad compositionem sit opus, abundē docuimus: nunc addamus quæ horum simplicium quantitas, id est, pondus aut mensura (dosin vocant) esse in cōposito debeat. si illa videlicet certis limitibus omnino circumscribi queat, quos vltra citraque cōpositi facultas optata esse nequeat. Nā in vnoquoque non modò medicamentorum, sed aliorum quoque omniū remedium genere quantitas sola est, quæ ad vnguem nec dici,

ci, nec scribi possit, sed coniectura tamē artificiosa. Medicus natura prudens, & multa Medicorū lectione exercitius, ipsisque medicis operibus quātitatem excogitabit cuiusque legitimam, aut ei proximā ex affectus essentia, magnitudine, temporibus, situ: ex partis affectæ natura, ex simplicium denique ipsorum facultate vel valida, vel languida, non neglecta indicatione à forma medicamenti constituenda, ab aëris temperie, ab ægri habitu molli, duro, raro, denso, sensu tactus exacto, obtuso, consuetudine huius vel illius medicamenti, aut insolentia. Affectus enim parvus, recens, superficialis, ob hæc curatu facilis mitiora postulat medicamenta contraria, quā qui in eodem genere est, sed magnus, inueteratus, profundus, proinde curatu difficilior: is enim valida requirit. Vt enim plantæ nouellæ etiam summis duobus digitis nulla vi euelluntur, ubi verò altius radicarunt, ligonibus, ascis, multorum hominum robore magno indigent, ut euellantur: sic morbi recētes leuiores, qui longa mora inualuerunt, valentiora etiam remedia postulant.

Adhec superficialis & sublimibus corporis affectibus medicamēta viribus integris quia occurrunt, tanta esse debent, & sic efficacia, quanta eorū vi contraria affectus ipsi

*Gal. in a-  
poplexia*

vt profligantur indigent, & pars ipsa ferre debet. Ad profundos autem affectus penetrando vis medicamentorum obtunditur, quia alteratur, quia aliis etiam miscetur: ob id tantum ei virium cumulamur, & superdamus, quantum in via diminutum iri coniectamus, vt earum reliquum vincendo affectui sit æquale. Cætera hoc exemplo fient manifestiora, si ab affectu, vel affectibus variis sumpta indicatio, & quæ à temperamento partis affectæ, aut etiam totius, & ab aëre sumitur. Idem medicamenti genus suadet, vt refrigerans, medicamentum affectui contrarium est augendum viribus & quantitate, magis, quàm si singuli affectus hi seorsum consisterent. Vt affectui calido in temperamento frigido in aëre calido, refrigerantium vis maxima est adhibenda: quia affectus refrigerantia sibi contraria postulat, & aër quatenus insaluber est, quia intemperiem morbo habet similem, quæ ipsum fouet, & auget, temperamentum verò partis frigidum, similibus seruandum. Quòd si cutis est dura & densa, & sensus obtusior, non modò frigidiora, sed quæ tenuitate essentiaè promptè penetrent, vt acetum, succum corticis viridis nucum, præter hæc affectus requirit. Si verò hæc indicationes pugnent, & diuersum postulent medicamenti genus, quæ

*Lib. 3. facit. tuend.*

*Lib. 7. metho. & 9. & aliis.*



quæ numero & viribus vincunt, vim medicamenti augendam suadent, quæ vincuntur minuendam, magis & minus pro numero & dignitate indicantium. Si verò affectus multi sint implexi naturæ contrariæ, ut hydrops cum febre, vrgentiori maior vis remediorum opponatur, non neglecto tamen altero: sic vbi causa morbi & morbus diuersæ sunt naturæ, ut pituita frigida humida causa febris quotidianæ calidæ & siccæ dispositionis, vrgentioris maior est habenda ratio: pituitæ videlicet per tenuantia, incidentia, tergentia, coquentia, phlegmagoga eius generationem prohibentia: febris per refrigerantia, humectantia, putredinem finientia: si æquè polleant, prior & maior causæ est habenda ratio, ut quæ tollenda primo loco sit. In complexis enim affectibus cōsiderandum est, quis affectus cum quo, quis sine quo, quis post quem curandus vel non curandus est.

Si autem causa morbi & morbus eadem postulent remedia, ea sunt augenda ut tertiæ febris calida sicca à bile flaua, putrente, calida, siccaque etiam ante putredinem, affatim refrigerandum est. Sed hæc simplicium facultatem intendendam potius probare videntur, quàm ipsorum quantitatem augendam: quāquam aucta quantita-

te facultas etiam intenditur: vt si pro cinnamomo duplum casia cinnamomo longè inferioris ponitur, quantitas ipsa casia aucta cinnamomi vires repræsentat. Item quò plus & maior quantitas simplicium calfacientium vel refrigerantium, vel aliud quiduis efficientium miscetur, eò valentius est id medicamentum, vt in diospolitico tantum nitri quantum singulorum aliorum, purgatorium ipsum reddit: & dia trion pipercon est medicamentosius & valentius anisi, thymi, zingiberis ana drachmis sexdecim, quàm drachmis octo: & hiera picra valentior cum drachm. aloës 120. quàm cum drachm. 100. vel paucioribus: & sic in reliquis vires magnas habentibus comperies.

Item si natura id est, temperatura partis affectæ & corporis totius est eadem, maior sit quantitas, & vis medicamenti cum natura partis & totius consentientis, ob id sicca magis adhibe vlceri partis natura sicca, si totum quoque corpus est siccum: contrà autem siccandum minùs simile vlcus, in parte præhumida toto etiam corpori præhumido: nam vis medicamenti tunc naturæ partis incommoda est ac contraria.

Si verò partis & totius natura est diuersa, adhibe medicamentorum parti & toti consentien

sentientium portionem equalem, vel medicamenta inter utriusque naturam media: ut sic corpus humidum, pars sicca, misce humida cum siccis æqualiter, vel humido sicco temperata simplicia: non oblitus tamen indicationis, quam vlcus omne insinuat, scilicet siccandum se esse, eoq; magis, quo est ipsum humidius, & eo minus, quo est in parte natura humidior.

*Lib. 3. C<sup>o</sup>  
7. metho.*

Ex dictis igitur apparet, quod affectus ipsi præsidiorum genera nobis indicant, mensuram verò cuiusq; remedij, & particularem in materiis differentiã, suggerit præter affectum pars ipsa affecta, ægri temperatura, ætas, vis vitalis, æris temperies, ut li. 2. compos. ph. part. docet Galenus: ubi Apollonium reprehendit, multa capiti abiectum vel casu dolenti remedia componentem, nullius tamen simplicis expressa mensura.

*Lib. 2. c<sup>o</sup>.  
ph. part.*

Quantitas verò huius, vel huius simplicis in composito, nec maior, nec minor cur sit imposita, ratione non caret eorum qui primæa miscuerunt: quod si paulò vel plus vel minus eorum quorundam miscuissent, fortasse nec illegitima fuisset compositio, sed quia usu longo bona est comprobata, eam ne mutauerimus. Cum enim exquisitè affectuum ( quibus præcipuè medicamenta componuntur ) natura cognosci non possis, neque

neque fortasse simplicium, coniectura quadam artificiosa collegerunt maiores nostri, simplicia his viribus utcumque cognitis: hunc affectum coniectura tantum sanatura.

Quantitas autem simplicis eius maior ferè miscetur, cuius facultate ad morbum profligandum magis egetur, siue illud simplex sit, siue compositum, quo præter cætera morbum oppugnare Medicus proposuit: ferè addidi ob id, quòd quæ bases magnarum sunt virium & periculosarum, parciores miscètur. Sic in theriace, minor est portio pastillorum theriacorum, quam scilliticorum: in scammoniatis medicamentis parcum inest scammonium, ob valentem facultatem eius actionem. Item quæ densa, sunt, parciora miscentur quàm rara.

Præterea cum multa facultate eadem, ut colorifica & roborante prædita, si in remedium aliquod miscentur, ut xylaloë, mentha, absinthium, cariophyllum, mastiche, in stomachi epithema parciora miscebuntur, quàm si singula tantum imponerentur: quòd quantitas mensuræ vel vnius vel plurium, totius effectum intendit, quod cassia duplex, aut carpesium multum pro cinnamomo planè declarat: quòd illa imbecilliora tamen quantitate sua huius qualitatem propè adæquant.

Quan

Quantitatē igitur & mensuram miscen- *Lib. 1. cō.*  
 dorum medicamentorum simplicium, est *ph. par.*  
 quando primum coniectura tantum meti-  
 tur, etiam facultaris simplicium peritus. Vbi  
 verò expertus est affectum ab eo medica-  
 mento in corpore relictum, seu medica-  
 menti opus, considerat ex eodem si quid à  
 scopo deficit, idque sufficit: ut pilothrum  
 corpori semel iusto tempore admotum, si  
 satis egerit in aliis partibus continua: sim-  
 minus, auge vim simplicium pilos auferen-  
 tium, ut calcis, arsenici, sandarachę: si nimi- *Lib. 2. cō.*  
 um egerit, ut vrat & vlceret, vim illorum *phar. gen.*  
 remitte, minuta ipsorum mensura, & aucta  
 portione aliorum vim istam frangentium.

Si quidem exactē simplicis alicuius mi-  
 scendi, aut composiri medicamenti atque  
 adeo reliquarum causarum salubriū quan-  
 titatem, nemo ante experiētiā inuenerit:  
 coniectura tamen sic antē iudicat & expen-  
 dit, ut nullus multum improsper succedat  
 euentus. Vbi igitur à tutissima in singulis *Li. 5. sanit.*  
 mensura inceperis, & quod ex ea sequutū *tuend.*  
 est aestimaris, potes quotidie vel addere vel  
 detrachere, & quod omissum est corrigere.  
 Sic in dia cnico, cnici ponitur & caricarum  
 par modus: sed prout se habere id ad su-  
 mentis naturam experieris, alias plus, alias  
 minus cnici immitte, lib. 5. sanit. tuenda.

Præter



Prætereà simplicium miscendorum facultas imbecilla vel valida, magni est momenti ad cuiusque iustam quantitatem limitandam: infirmioris enim dosis potest tutò augeri, vt duplū casia pro cinnamomo, duplū radice panacis vel radice peucedani pro succo radice alterutrius. sic omnia reliqua imbecilla misceri possunt largiora, nisi quid veret, vt quantitas totius immoderatio, vel forma constituenda vitietur, vel nisi futurum sit imbecillius tāta imbecillorum portione quā postulet affectus. Pro cuius portione augenda vel minuenda medicamentorum purgantium, digerentium, astringentium, vel alia facultate præditorum vehementia.

*Lib. 6. cō.  
ph. par.*

Quæ verò sunt vehementiora, vt elleborus alteruter, scāmonium, colocynthis, opium, quantitate parua sunt miscenda, & cum præmeditatione. Sic quibus est aurium dolor ex inflammatione vehementissimus, opium castorio pondere æquali multò antè miscendum est: si autem mitior est dolor, duplicato castorio, ambo in sapa ex musto dissoluta, quia dolores magis lenit, quā vinum dulce.

*Lib. 3. cō.  
pha. par.*

Facultas quoque remediorum in duris corporibus augetur, vt prædiximus. Ob id Galenus cuiusdam achoribus chartā vltam

ex aceto illeuit, quòd eum vim medicamen-  
ti ob carnis duritiem facile toleraturum  
confideret: & ita euenit, eòq; remedio pau-  
cis diebus perfanatus est.

Adhæc quibus sensus est acrior, mitio-  
ra: quibus obtusior, valentiora ferunt re-  
media: sic Galenus in hemicrania veteri à *Lib. 2. cõ.*  
causa frigida auribus sensu tactus acri, ac *ph. part.*  
exquisito præditis instillabat oleum eu-  
phorbiatum, id est, quod libra vna olei ha-  
beat euphorbij drachmas tres incoctas: si au-  
tem obtusior earum est sensus, habeat olei  
librã vnã euphorbij validi, & recentis vnciã  
dimidiam: si autem sit inuolidum vetustate  
drachmas quinque, aut plus accipiat.

Item quæ medicamentum gratius faci-  
unt augenda vel minuenda pro aliorum  
qualitatis natura: vt si stomatica fiant ex  
insigniter astringentibus, vt succo corno-  
rum, duplum aut triplum mel postulant.  
Mitiores verò succi, vt mespillorum, pyro-  
rum, & multorum fructuum æqualem mel-  
lis portionem, aut saltẽ quàm prædicta mi-  
norem. In stomatico digerente aromatum  
drachmas tres, aut quatuor & dimidiam: ad  
summum quinque drach. miscet lib. mellis  
Gal. lib. 7. comp. phar. part. Libræ mellis aut  
sacchari maiores pulueris vnc. tres miscebāt  
in ant

in antidotis efficacioribus, quàm quæ nunc parantur cum vnc. tantum duabus, vt sint iucundiora, præterquàm in quibusdam. Aromata item hyeme augenda, æstate saccharum largius miscendum.

Quantitas etiam quorundam simplicium variat temporis ratione, quo ex iis compositio fit: vt si ceratum Galeni facis hyeme, minus ceræ postulat, quòd etiam oleum frigore hyberno valenter concrescat non sola cera, habeatque duritiem lapideam ceratum, æstate verò largiorem ceram accipiat, quòd sub illius æstu etiam cera semisoluta mollescat. Ratione est eadem vtendum in cæteris ceratis & emplastris, & aliis, quæ ceram, resinam, aliâque à frigore concrescencia, à colore liquefcentia recipiunt. Aestate etiam minus olei miscemus emplastris & vnguentis, quàm hyeme, quia illius calore solutum id, vnguentum reddit perliquidum: vt hyemis frigore concretum etiam multum crassius vnguentum efficit. Ob id Alexander Tral. emplastro phæniceo palmarum vnc. decem, addit olei uncias æstate tantum octo, hyeme vndecim. Auicennas quinto canone vnguento apostolorum miscet olei libras æstate duas, hyeme tres.

Addo quòd prædicta fingimus liquidiora, quando eis sicca alia, vt æruginem, cal-

cem,

cem, cadmiam, farinas, pulueres sumus mifluri: duriora verò primùm componimus, fi succos aliquos funt pòft recepturi. vt cùm ceratum Galeni aceto & aqua rofarum, vel alio dum frigeſcit, miſces quantum bibere poſſit.

Rerum etiã miſcendarum natura quantitatem immutat: que enim ſicca & rara ſunt coquẽda, longiorem humorem poſtulant, quàm humida denſa.

Sic Galenus modium ſeminum abietis iniecit olei libris quinque & viginti, quia maceratum menſes aliquot multò planè minùs redditur. Modium verò florum populi nigræ iniicit libris olei viginti tãtùm, aut etiam quindecim, quòd hi flores cùm ſint humidiores minùs olei macerando etiã per æquale tempus ebibant.

Sic ſyrupus ex ſeminibus, radicibus & aliis ſimplicibus ſiccis raris coquendus, plus aquæ aut liquoris alterius idonei requirit, quàm in cõtrariis: quod in compoſitis medicamentis abundè leges. Plus item liquoris poſtulat, qui ob ſimplicium naturam vel formam conſtituendam longiore coctione humorem halitu diſſipante, indigent, niſi liquor ea ſit natura, vt ægrè vaporet, cuius modi eſt oleum.

Eſt quando quãtitas remediorum ſeru-

*Lib. 7. cõ.*

*ph. part.*

puliosius à maioribus est ascripta, quando scilicet à maioribus compositionibus parciore diuidebant, vt Andromachus arteriace 15. thuris drachma vna, obolus vnus, myrrhæ, croci ana drachma vna, oboli duo, succi glycyrrhizæ drachma vna, oboli tres, aut radicis glycyrrhizæ drachma vna & dimidia. Quæ ponderum dissolutio frequens est in compositionibus quarto libro scribendis, quas Mesues ac Nicolaus ex aliis plenioribus descripserunt, quales habet multas antidotarium Hadriani, & antidotarium magnum Nicolai, quod Græcum Romæ audio esse, & Græcum affirmat Nicolaus pharmacographus, vt suo loco leges. Vbi interdum mensuras aut pondera minimùm auximus, vel minuiimus cum scrupulosius diuideretur: sed id tantum fecimus in simplicibus virium parum efficacium, & à quorum quantitate vel aucta vel minuta nulla, aut minima totius mutatio fieret. Quod à nobis rarò licet factum nemo accuset, cum etiã in veteribus quibusdam compositionibus nonnullorum quantitas circumscrip̃ta nullo propè iuditio inueniatur. Nam thuris drachmam vnã, obolos quatuor scribit Andromachus in arteriace 13. cum licuerit scribere thuris drachmã vnã & dimidiam, vel drachmas duas

Lib. 7. 20.  
p. par.



duas (neq; enim tanta est vis in thure) præsertim cum aliorum multò valentiorum sit magnum pondus, ut nardi, myrrhæ, croci, costi ana drachm. quatuor: cum item in arteriace 12. scripserit croci drachmam vnā, mirrhæ drachmas quatuor, thuris vnc. vnā: quidam tamen negāt licere magnarum antidotorum compositionem: vel augere, ut Veneri, vim maximam theriacæ & Michridatii simul coquunt: vel minui, quod prædictis exemplis audisti, quod in maiorum pondere & mensura vis quædam insit, & meliùs illorum mensura paratur. Si tamen non magnus fiat recessus, parum refert: nam duas libras aut circiter theriaces, si quis fecerit, non percoquetur à suo calore natiuo, & citò vaneſcet, ut vinum paucum in paruo dolio: in magno autem feliciùs ſeruatur: ſic theriace quanta à veteribus dicta; lagior autem ægrè paratur, cōmiſcetur, coquitur:

Quin & quantitas ipſa interdum incerta ipſis etiam authoribus fuit; ut in ſtomatico Critonis. *Lib. 6. c. 1.*  
*ph. part.*  
 dià γλίυκερ rhus coriarij drac.  
 vna, alij drach. duas: gallarū drac. quatuor,  
 alij gallas triginta: troci drachmas duas,  
 alij drachmā vnā: aluminis ſciſſi drac. duas,  
 alij myrrhæ drach. vnā. Sic in ſtomatico. *Ibidem.*  
 Andromachi ex gallis triginta, & aceti albi

sesquicyathos: alij scribunt cyathis nouem rhus obsoniorum cyathus vnus: aliis cyathi nouem, mellis cyathi duo: aliis sesqui cyathus scribitur.

Hanc verò ambiguitatem soluit Galenus, vt aceti & rhus ana cyathi nouem ponantur, tuncque amplior fiat coctio, qua galæ tenerescant: id quod multò est præstantius, quàm ponere vtriusque ana sesquicyathum, tunc verò partiùs est coquendum.

Coctio ergo longior, breuior humoris in quo est facienda quantitas nobis insinuat.

*Lib. 4. fa  
mt. tuēda.*

Sic in acopo *di aryēgr* modum florum populi nigre immittit quindecim aut viginti libris olei.

*Lib. 7. cō.  
ph. part.*

Numerus etiam simplicium ad quantitatem refertur, quem alij aliū in iisdem etiam compositionibus sequuntur, vt in arteriacis & hippoglottidibus: alij tria, alij quatuor sufficere putarūt, alij in maiorem numerum extenderunt. Est tamen quando numerum non mutamus, vt in tetrapharmaco, in theriaca diateffaron.

*Lib. 1. cō.  
ph. gen.*

Non multum differt, siue ceterum drachmis metallicorū. siue sex & nonaginta duæ olei coryle misceantur ad emplastrum: in re verò magni momenti drach. quatuor ad iicere aut demere magni refert.

## F O R M A   C O M P O S I T I .

**P**ostremò forma compositi vel vtilior *Libr. 6. c.*  
 fini proposito, vel gratior agro, vel ser- *pha. part.*  
 uando medicamento aut vtèdo accommo-  
 datior, suadet huius vel huius medicamen-  
 ti copiam vel largiorem vel parciorem: vt  
 si os volo colluere lacte cum tritis foliis  
 pruni, liquet multo lacti pauca folia mi-  
 scenda: si volo illinere, contrà paucò lacti  
 multa pruni folia trita miscebo.

Collyria oculi astringentibus præsertim  
 metallicis præpollentia, multo liquore sunt  
 dissoluenda: crocus, myrrha, castoriū, thus,  
 lycium, in quibus vincunt, multò parciore  
 liquorem requirunt, crassiusq; medicamen-  
 tum faciūt: si linimentū cuius parti paras,  
 ceræ pars sexta oleo miscenda, nisi sicca etiā  
 quædam misceas, tunc enim minuēda esset  
 cera: si ceratum liquidius fingis, quarta pars  
 ceræ: si solidius tertia: si in formā emplastri,  
 secunda miscenda est. Cætera ad formam  
 compositi pertinētia quæ simul ad definiē-  
 dam simplicium quantitatem pertinent, mox  
 audies. Interdum nulla ratione forma cō- *Li. 4. san.*  
 positi variatur, sic diospoliticon, dia trion *tuend.*  
 pipereon, diacalaminthe, vel sicca, id est, in  
 puluere vsurpat Galenus, vel melli admista.

Sic Andromachus cū medicamentum  
 ad coxendicum dolorem scripsisset ex ruta

*Li. 10. cō.  
ph. part.* vtraque, abrotano, filphio, baccis lauri, aphronitro colocynthide, cardamomo, amigalbano, opopanace, sulfure viuo, vt emplastrum ex ipsis faceret, addidit picem, resinam terebinthinam, ceram, adipem.

*Libro 7.  
method.* Est quando mutatur, quo sit efficacius medicamentum: sic hiera picra sine melle cum aqua sumpta magis roborat ventriculum: & succos vitiosos in ventriculi tunicis contentos vtilius extrahit: melle autem despumato excepta, minùs ventrem roborat, & magis deiecit, minùs ob hæc vtilis prædicto affectui.

Sic pro fotu, ex oleo vnguenta, cerata, emplastra formamus, vt parti materiæ diutius hæreant, vel alia materia in aliis partibus sed crassiore substantia, si diu hæreere volumus. Contra verò finibus liquida *Lib. 2. ad  
Glaucōnē* omnia iniicimus, vt quaquauersum spargantur, & nullam sinus partem quantumuis angustam relinquant intentatam.

Sic liquidiora expectorandæ à pulmonibus & thorace crassæ & lentæ materiæ formamus medicamenta. Sic lauissimè terimus, quæ vrinas, sudores, menses mouere volumus, prætereà ex liquore purissimo & tenuissimo non crasso, lento, turbido damus. Si clysteres nunc maximè aquosi, quando solum est eluendum: crassi magis & leui, ex  
adipi

adipibus, butyro, vnguentis, muccaginibus, cremoribus hordei, tritici, orizæ, & similiū, quando intestinis immorari diutius, & hæ-  
rere tenacius volumus.

Adhæc forma hæc compositi medica-  
menti à nobis constituitur alia atque alia,  
pro morbi, partis affectæ natura, figura, &  
situ, proprietate ægri, & modo præparatio-  
nis simplicium ad formam aptam necessa-  
rio, & medicamenti componendi differen-  
tia.

Phlegmone enim externa contactum  
emplastrorum, & aliorum similiter durorū  
sine noxa non feret, vti nec vlceris siue sim-  
plex sit, siue cauū, sed omnino liquida po-  
stulat: illa fœtus, linimenta, cataplasmata,  
cerata mollia: hoc, emmota & soluta oleo  
vel liquore alio emplastra linamentis im-  
ponenda, vel etiam instillanda, & iniicien-  
da in sinus ipsos. In quorum fundum sola  
liquida permeare possunt, si decliues sint &  
recti. Si verò anfractuosi & ascendentes etiā  
injectione vix fundum vlceris illa liquidiora  
attingent.

Linamenta, item turundæ, splenia pro vl-  
ceris figura & situ fiunt: adhæc etiam turun-  
dæ frequenter cannallatæ (vt vocant) fiant,  
id est tubum aliquem argenteum, ferreum,  
plumbeum complexæ, per cuius meatū pus



largum continenter effluat, ne mora in parte rodat, & vlcus augeat.

Amara & id genus alia nobis ingrata ventriculus cum non ferat, ea catapotiiis vel alia forma concludimus, vt integra deuorentur, & sensum sui deglutiendo praebeant: aliquo propterea iucundo etiam teguntur, melle, saccharo, pomorum, prunorum, vuarum carne molli, inuoluta interdum foliis auri vel argenti, vel alio simili.

Tali item vel tali forma debet constare medicamentum, vt partem affectam attingat: hinc sunt inuenti à medico pessi color uteri affecto, balani intestino recto (quoniam ei ad excretionem irritando hodie frequentius seruiant) clyster crassis intestinis magis quam tenuibus.

Sic stomatica, & arteriaca, & stomachica sunt forma & consistentia mellis seu crassi & liquidi mediæ nonnihil tenaciorrhina liquida, aut per lufcolia: apophlegmatismata in nodulo, vel aliter solidiora.

Catapotia ite aut bolos formamus, cum à longinquis partibus trahendum: potiones potius, cum vias alimenti primas inanire studium est. Medicamenta tenuissima & eum tenuissimis mista & ferè liqui dissima, quæ ad vterum, renes, vesicam, articulos, cutim volumus penetrare.

Qua in re est ægri consuetudo naturâq;  
 consulēda: vt in opsoniis & cibis aliis inue-  
 niendū experientia est, quod cuiq; est opti-  
 mum (aliud enim alij secūdum naturæ pro-  
 prietatē est melius) sic in medicamētis quod  
 cuique sit non modò gratum, sed etiā opti-  
 mum inuenire tentandum est, rogando si  
 quando vli sint medicamentis. vt purganti-  
 bus, & quibus, quantis; quando, in quo affe-  
 ctu, qua parte anni, & quomodo eos habue-  
 rit. Quidam enim à medicamentis in to-  
 tum abhorrent, quibus iusculo, aut potione  
 dulci, aut sapore alio ipsis iucundo medica-  
 menta tegimus, vt inscij sumāt: alij possunt  
 quidem medicamentum deuorare, sed vel  
 potione tantum, vel bolo, vel catapotiiis, vel  
 forma alia. Sic in admotis quidā emplastra  
 ferūt, linimēta cataplasmata nō ferūt, alij cō-  
 trā. Sunt qui emori maliat, quā clysterem  
 recipere, quibus per epōphalica est succurrē-  
 dum, si ne per sumpta quidem licet. Capitis  
 dolori veteri calido aut frigido, raso ipsi in  
 formam emplastri aut cerati admouenda  
 sunt tōso ad cutim, aut capillis aliter breui-  
 bus liquida adhibe. Succus ex corticibus  
 nucum expressus, quia substātia est tenuio-  
 ri quā stomachico conuenit, & coctus est à  
 Galeno & mel ad litum, vt mellis consisten-  
 tiam stomaticis idoneam haberet.

*Lib. 6. cō.  
 pha. par.*

Est tamen quando simplicium præparationis modus ad aliquam te formā impellit, vt ex infuso siue inacerato rhabarbaro, bolum, aut catapotia, aut formā aliam solidam non feceris, vt neq; ex herba virēte, fructibus mollibus, resinis recentibus puluerem. Ob id considerandū tibi est, quam formā hæc medicamenta, vsta, lota, assata, cocta, infusa, trita, destillata magis requirāt, & in qua melius seruentur, & felicius agant in affectus & commodius possint applicari. Tamen si multa formamus in figuras quasdam sub quibus raro in vsum veniunt, vt trochisci forma sunt solida: ad oculos autē liquore aliquo in cote medica soluuntur. Pulueres in alias atq; alias formas nunc fictas, nunc liquidas, nunc medias abeunt.

Formæ huius vel huius cōstituendæ gratia non pauca medicamentis componendis miscemus, quæ potestatem aut nullam aut exiguam admodum medicamento parando afferunt, sed materiæ commoditatem præbent, vt vel emplastri vel cerati speciem per ipsorum mitionem consequantur.

*Libr. I. E.  
ph. g.*

Qua sola causa lithargyros emplastro dia chalciteos miscetur, quia nec calida, nec frigida, nec humida est, & parum ficta, vt ad primum gradum, nihilq; aliud vehemens habet.

Eid

Eidem emplastro dia chalciteos miscetur cera, quòd sine hac, alia eius emplastri simplicia ad talem consistentiam non peruenirent. *Ibidem.*

Eadem cera aliis emplastris & vnguētis quibuscumque & ceratis miscetur, vt materiæ commoditatem afferat, potestatem nullam aut exiguam afferat.

Sic adipēs, olea, gummi, resinæ adduntur, nunc vt spissius, nūc vt liquidius medicamentū reddant: quæ tamen sæpe miscentur, vt materiæ rationem habeant, & potestatem in medicamento tradant: vt si ex ruta vtraque, sulphio, baccis lauri, abrotano, aphronitro, cucurbita syluestri, cardamomo, sulphure viuo, & similibus siccis nec glutinosis volo facere medicamentum ischiadi admo-  
uendum, quia per se non hæreret, addo prædictis glutinosa, picem, resinam terebinthinam, adipem, ceram. Addere possum ham-  
moniacum, bdellium, galbanum, opopanax, & similia quæ emplastica sunt, & emplastri compositioni conferunt, & emolliunt, & quantitatem picis, & similibus minuendam ostendunt. *Li. 10. c. ph. par.*

Eadem ratione terebinthinæ, aut eius loco larici & abietinæ puluerem glycyrrhizæ miscemus, vt in bolos veniat, licet glycyrrhiza etiam renibus tergendis modicè conueni

ueniat, potentiùs hac rhabbari puluis laxiſſimus cū illis reſinis miſtus renes vacuat, & faciliùs ſumitur. Alij vel alterutrum vel vtrunque ex cicerum decocto multum calente malunt ſumere.

De his non pauca in vſu recto medicamentorum, quædam libro tertio, plurima libro quarto in ſingulis propè compoſitis medicamentis animaduertere poteris.

## DE RECTO VSV MEDICAMENTORVM.

**H**erophilus dogmaticorū medicorum doctiſſimus, præclare dicebat, medicamenta vt cætera medicorum præſidia per ſe & ſola nihil eſſe, niſi rectè vtentem habeant, quando demum ea veluti deorum manus rectè dixeris: iuuat enim plurimum, vbi his vſurus eſt natura prudēs ac industrius, & in

*Celfus c.*

*4. lib. 3.*

*Libr. 1. c.*

*ph. 2.*

rationali methodo exercitus. Propterea etiã rectè Aſclepiades medici officium eſſe dixit, vt tutò, vt celeriter, vt & iucundè curret. Ante hos prudenter nos Hippocrates hortatur, omnia medicæ artis opera ſic perficere, vt iuuent, vel ſaltem non offendant. Quam rem Galenus his omnibus poſterior libr. 12. methodi, & locis perquam multis inculcat, quòd res ea magnarum ſit virium,

non



non modò vt medicus calumnia vacet, sed etiam culpa: cùm proximè secūdum Deum hominem adiuuat, & cui morborū magnitudo, complexus, malignitas perniciem extremam minatur. Hinc medicus ceu terrenus quidam Deus affulgeat, consiliū & auxilium afferēs saluberrimum, cuius beneficio aut vitam ærumnosam calamitosāmq; aut impendētem exitiū facillè æger vitauerit. Non abs re igitur nobis visum est, huc rectum medicamentorum vsum adscribere, tantò certè præstantiorem prius scriptis omnibus, quantò fuis ipse omnibus his quæ præ se antecellit. In quo nostro studio si quid desiderabitur, ex libr. composi. phar. & methodo medendi sufficere cuius paruo negotio licebit.

Meditatio consistit in medicamentorū affectui contrariorum, & ob id idoneorum copia & horum vsum congruo, contrarietatem ex affectus natura & magnitudine ac medicamēti facultate affectui recessu equali contraria, sumēdam nemo ambigit, & id abundè in scopis componendum medicamentorum explicauimus: vsum iam congruum inuentorum methodo remediorum affectui contrariorum dicēdus est, qua methodo perficiatur. Vsum medicamentorū congruum sumitur ab affectus præter naturā causa

*Libr. 7.  
metho.*

causa praesente, essentia, magnitudine, tēporibus: ab aegri, partis, aëris medicamēti natura planè cognita. Affectui enim calido multum, vt ordine secundo, frigida secundo recessu: calido modicè frigida mediocriter conueniunt, siue talia sint per se, siue id per accidens praestent (modò nullū hoc incommodum sequatur) sic vt excessus omnis aequali cōtrario excessu expugnetur. Eodem modo in reliquis intēperaturis tam simplicibus quàm cōpositis, & tam nuda qualitate constātibus, quàm cum materia coniunctis. Item in pituitoso affectu, quæ pituitam incendant, tebuent, tergeant, vacuent, gigni prohibeant, rectè exhibentur, & in aliorum humorū vitio ad portionē: sic in incōmoderatione & solutione continui. Morborū quoq; alia sunt atq; alia remedia, pro temporum tam vniuersalium quàm particularium ratione, vt pòst fusiùs dicemus.

Aegri temperatura, commodèratio, vni-tas partium, quæ fuit ante morbū, scopus est quò tendimus, siue intemperaturā corrigimus, siue morbum organicarum partium proprium, siue solutionem continui. Natura enim calidior similibus medicamentis seruetur: saepe etiam læditur à similibus suæ intēperaturæ causis, præsertim si calidis multum & frequentibus vtatur: modico autem

contra.

contrariorū vſū iuuatur ac emendatur. Cō-  
ſuetudinem tamen per morbum mutare ne  
tentaueris, ſi Galeno auſcultas, quia tūc na-  
turam morbos victurā expugnaueris. Qui  
corpore item ſunt raro, minus opportuni  
ſunt purgationibus, & aliis vacuātibus præ-  
ſidiis: quemadmodū etiam puerilis ætas  
per inſenſilem tranſpiratū continēter mul-  
tūm vacuata, quòd humor in ea promptè à  
multo calore tenuatus, cōſertim diſſipetur.  
Qui nunquā medicamento ſunt vſi, cum  
maiore præmeditatione medicamenti ſunt  
tentandi. Roganda item cuiusque naturæ  
proprietas. Sani quoq; corpore medicatio-  
nes grauiter ferunt.

Qui vētriculo aut hepate ſunt calidiores,  
à medicamētis calidis, qualia ſunt purgātia  
omnia, vt cæteris ſumendis calidioribus læ-  
duntur. Medicamēta valentiora & tenuiora  
lōgè diſſitis partibus, aut profundis, & ſen-  
ſu obtuſo præditis debentur: ſublimibus ve-  
rò & facile ſentientibus, & quibus propin-  
quis medicamentum viribus integris oc-  
currit, miora & craſſiora ſufficiunt, niſi  
alia ratione valens & tenue exigatur.

Spb cane & ante canem difficiles medi-  
cationes: æſtate item per ſuperiora magis, ſi  
facile vomant, purgandi: hyeme per infe-  
riora purgationes potiùs deligende: quia

*Aph. 9.  
li. 4. & ſe-  
quētib.*

est natura vergit, & locus est conferens, ut in melancholicis quoque & tabidis.

Medicamentis præsertim valentibus raro, & cum multa cautione utendum est.

In singulorum medicamentorum usu explorandum, quomodo ægros habeant: si enim plus commodent, quam obfint, toleranda: si contra, tollenda: ut in ozæna si à medicamento morsum sentit æger, coniectandum est, quod simplex in eo mordet, idque tollendum, vel abluendum, vel minuendum, vel alio obtundendum, vel in eius genere mitius capiendum: ut si acetum erat peruetus & valde acre, capiendum est acidum magis & atate mediocri, aut saltem vinosum, vel eius loco vinum dulce vel austerum, si affectus requirit. Sic & in aliis ulceribus & morbis reliquis, effectum medicamenti est diligenter observandum, ut intelligas an in eius usu tibi sit perseverandum, an totum mutandum, an simplex in eo aliquod sit augendum, vel minuendum, vel obtundendum, vel mutandum.

Quapropter ei qui rectè volet medicamenti uti præter ægri & morbi naturam, medicamentorum tam simplicium quam compositorum vires ad vnguem callere debet, & ex his semper optima ac probatissima deligere. Cum enim affectum aliquem certò sa-

nans

nans habes medicamentum, & quod nunquam successu prospero te frustratur, graue est ac iniquum, certioribus remediis in præsens omisissis, noua tentare, curiosæ alicuius experientiæ gratia. ob id cum Galē. ad rabi *Lib. I. cō.*  
 dorum canū morsus habere medicamētum *ph. gen.*  
 omnino probatissimum *Διὰ τῶν κερνίων*,  
 & præter id alia multa, sed parū certa, nunquam voluit in hos morsus alia tentare, aut albam Heræ emplastron id promittentem experiri: quia an id præstare possēt, dubitabat, cum similis sit Attralicæ albæ myrrha solū & adipe ceruina & cera alba Pontica largā adiectis. Quod si h. ec morsum in quibusdam naturis sanat, & eum non ita magnum, neque cum spuma adeo maligna, omnem tamen morsum in omnibus naturis totius substantiæ proprietate non sanat, vt *Διὰ τῶν κερνίων*. Quæ res sæpe fecit, vt Medici quidā Empirici pharmacis quibusdam se primū adeo feliciter gesserūt aliquando, vt in admirationem sui alios perducerent, ipsi tamen in aliis euentu prospero frustrati, sunt irrisi. Non vtenda igitur tibi medicamenta, neque alia præsidia, nisi quæ omnino profutura certò scias, vel saltem nihil prorsus nocitura: aut si nocitura minimum sint, noxam illam faciliè tollendam maiore commodo compensent. Pos-



*In fine li. II. metho.* sem aliarum quoque obseruationum ( quas indicationes appellamus ) exempla ex Galieno proferre plurima, nisi prolixitate displicere metuerem: tamen quædam postea afferemus, & potest quisque nullo negotio ex ipso locuplete Galeni promptuario proferre.

*Gal. in the riaca ad Pisonem.* Ad rectè vtendū medicamento non satis est nouisse simpliciū id constituentium vires, sed etiam totius compositi facultas tibi est noscenda, & ab his qui sæpe eam sunt experti discenda. In medicamentis enim compositis singulorum quæ miscentur virtus & qualitas non amplius conseruatur, ita vt eadem maneat, nec mutetur, nec in vllam qualitatem transeat: sed aliqua omnium fit vnio, tota ipsorum temperie per tota mista: & vna quædam alia virtute ex illis fit mistis profecta vt in ænomelite exactè per coctionem temperato, neque mellis, neque vini saporem omnino deprehendis, sed diuersum quid iam. Sic in theriaca & cæteris compositis cuiusque mistorum vis & qualitas non manet, sed vbi omnia omnibus sunt confusa, & in vnitatem quandam naturalem concreta, vna diuersaque ex omnibus simplicibus medicamenti natura crea-

*Lib. I. cõ. ph. gene.* tur.

In compositione simplicium medicamento

mentorū inter se contrariorū facultates omnino corrumpi quibusdam visum est, vt aqua feruētissima cum frigidissima mista, neutra illarū qualis erat prius permanet, sed tertia quardam, ab vtraque diuersa gignitur. Non solum tamen cuiusq; *Lib. 2. cō. ph. gen.* compositi facultatem expendas, sed prius simplicium medicamentorū naturam, vt communem compositionis viam ac vsum intelligas, & tuo Marte possis conficere similia, & quæ à veteribus citra distinctionem sunt tradita, cognoscas qualem habent potestatem, vt nos in vtilitate & necessitate componendi medicamenti docuimus.

Aduerte prætereà vires compositorū tempore mutari etiam in contrarium, vt in theriace docet Galen. libr. 1. Anrid. & in Philonis antidoto, libr. 12. Methodi: hæc enim recentia stupefaciunt, antiquata theriace calfacit.

Vsus prætereà medicamentorū vt cæterarū causarū salubrium idoneus, est in ipsorū quantitate & qualitate idonea, & tempore apto, quod interdum Galenus o- *Cap. 85. artus med.* mittendū censet, continetq; quantitatis & qualitatis rationē. Si enim (inquit) tali & tanta re adhibita corpus egeat, nemini dubium est, quin opportuno tēpore afferatur.

Occasio siquidem temporis inde ortum habet, quòd fluxile ac facilè mutabile est mortale corpus, & pro transmutationis modo aliis alio tēpore auxiliis indiget, ob quam causam ad docendū tempore tanquam tertio quodam, uti consueuimus, licet reuera tertium præter duo dicta non sit. In libris igitur ad sanitatē tuendā pertinentibus, & methodo medendi passim aliis duobus, centertia additur tēporis occasio, quæ præ omnibus est cognitu difficilis, ac Medicos etiam celebres plerunque fallit, quia præcepta ipsa est, ut Apho. 1. docet Hippoc.

*Initio lib. 1. ad Glauconem, & Aph. 17. et 19. lib. 1.* Est quando vtendi modum velut quartum addit: de quibus quatuor quatenus in medicamentis vtendis Medico sint obseruanda hinc agemus, cum reliquarum causarum salubriū vsus abundè à Galeno dictis libris & aliis sit absolutus.

Cum autē medicamentū dandi ac etiam admouendi quantitas, qualitas, tēporis occasio, vtendi modus ad rectè medendum magnoperè conducant, sint verò hæc cuique morbo ac ægro sua ac propria: nihil autem proprium possit sermone explicari, communia de his docebimus, ex quibus possis proximè ad proprium cuique ægro medicamentorum vsū accedere. Illa autem cōmunia facilè intelliges, si non ignoraris,

taris, quæ sanis secundū naturam communia sunt, scilicet pulsum naturalē cuiusque nature, ætatis, habitudinis, partis anni, ac reliquorum: adhuc tēperamentum cuiusque natiuū vel acquisititiū, præterea proprietates naturarū ex ægris rogandas, denique morborum omnium naturam & magnitudinem, & reliqua curanti necessarium aliquid aut vtile indicantia.

Quoniam autem quantitas & qualitas exhibendi medicamenti, & cōponendi ex iisdem sumuntur scopis & indicationibus, ex ipso sermone prius habito nobis de cōponendi ratione tibi sunt repetenda, quæ quantitatem arque qualitatem medicamenti tibi definiant. Nam causæ morborum adhuc præsentis, magnæ, inueteratæ, expulsi difficili, valētiora, aut largiora, aut frequentiora medicamēta sunt necessaria, similiter & morbus magnus, veteratis, curatu difficilibus, si ægri vires, ætas, corporis habitudo, consuetudo, aëris natura consentiāt. Quòd *Lib. 7. method.* si morbi sunt complicati, vrgentioris seu eius à quo maius impendet vitæ periculū, *Triplex morborū magnitudo.* maior habenda est ratio, & ad id præcipua curatis sollicitudo dirigi debet, non neglectis tamen aliis. Vbi itē causa morbum efficiens adhuc in corpore adest, prima est tollenda, deinde morbus si quis adhuc supersit:

adhuc affectus hic primus est curandus, qui alterius curationem impedit, ut phlegmone ante vlcus est percuranda, si ambo in parte aliqua coierint. Quod si omnes cōplexi affectus remedia eadem postulant, ea sunt intendenda, modò nulla alia repugnet indicatio: in qua pugna quid faciendum, leges in fine libr. 8. Methodi.

Præterea ut in componendo medicamento magni est momenti quantitas medicamentorum valentium: parui fit autem portio imbecillorum, etiam si largior iniiciatur. Sic in medicando valentibus cum magna præmeditatione utendum est, ut cum morbus extremus est aut acutissimus, nullasque dat inducias, si vires, ætas, ær, & cætera non repugnent: mitioribus autem etiam larga quantitate si utaris, aut nullum, aut minimum inde periculum ægro accedet.

Vt autem paucis rem in memoriam reducam, medicamenti tam sumendi quàm admouendi qualitas à morbi natura sumitur, ut calidum sit morbo frigido, frigidum calido, &c. Laxans tenso, densans raro, & in cæteris cōtrarietas: indicationibus etiam ab aëre, natura totius, partis, consuetudine, habitu non neglectis. Quantitas verò à cause & morbi magnitudine præsentis vel  
imp



Impendente, partis affectæ situ, figura, habitu, sensu, agri natura, viribus, consuetudine, medicamento facultate, & substantia tenui, crassa, familiari, noxia obseruatis, ut morbo magno, profundo, longinquo, inaccesso, in parte densa, obtusè sentienti, in natura forti, fortibus assueta, aëre temperato, valentibus, tenuibus uti licet medicamentis: mitioribus in contrariis. Paucis tamen exemplis te exercere in purgantium tanquam usu periculosiorum quantitate non pigebit: si prius vnum addidero, quod ad medicamenti qualitatem ac speciem pertinet: ne scilicet vno aliquo præsertim purgante delecto, id ipsum perpetuò usurpemus, sed varia sunt vicissim vtenda, siue scopus idem permanet, siue alius etiam subortus est. Cui nanque assuefacta erit tempore fumentis natura, eius vim contemnet, quod usu longo familiare sit factum, & ei quædamtenus affinis reddita sit natura: quod de mercuriali, brassica marina, cnico, terebinthina, in senibus varianda quanuis à Galeno dictum est, verum tamen est etiam in cæteris maximè purgantibus. In quibus experientia inueniet quisque mensuram legitimam ex naturarum proprietate: cum veter aliis magis, aliis minùs his medicamentis sit obediens.

*Lib. 4. sanit. tuend.*

*Ibidem.*

**Diosc.** Aloë κατωτρίνη seu ινωτρίνη, id est, aluum ac stercus deiiciens, est à tribus obolis seu drach. dimidia, ad drach. vnam. Perfectæ autem purgationis gratia tribus drachmis, sumitur aliis purgâtibz medicamentis admixta. Eius per se vsus hodie est rarior: hieræ verò *δι αλός* seu picræ, creber, de qua in cōpositis. Hic enim magis statui simplicium sumendorum modum definire. Eadē ab aureo vno ad drach. duas bilem & pituitam purgat Mes.

**Li. 6. simplic.**

Agaricus datur drachmæ vnus pondere vel à scrupulis duobus ad drach. vnam: Mesuæ verò bilem & pituitam vacuat, si puluis eius datur à drach. vna ad drach. duas. In coctione autem à drach. duabus ad drachm. quinque. Actuario dantur drachmæ duæ cum aqua mulsa, vel aceto mulso ad bilem & pituitam: stomacho aduersatur, quia ob leuitatem innatat.

Colocynthis Mesuæ bilem & pituitam vacuat data à filiquis quinque ad filiquas, id est, *κισάτια* decem: frequentior eius est vsus hodie in hiera dia colocynthidos.

**Lib. 5. sanit. tuend.**

Cnici semen phlegmagogum Mesuæ datur à drachm. quatuor ad aureos quinque, seu ab vncia dimidia ad drachm. sex. Galenus id eum pari modo caricarum mistum dat duarum triumve caricarū magnitudi-

ne.

ne. Actuarius pulpe feminis eius drachmam  
vnam dat ictericis in catapotiiis: in iure au-  
tem galli drach. tres pituitā purgare addit,  
non tamen sine molestia. Cnici semen *Li. 13. me*  
cibis admixtū, & vrtica, & mercurialis, & *thod.*  
epithymū, & polypodium, & cætera quæ  
modicè aluum deiiciūt, iecoris cauum per  
ventrem vacuant. Flos eius à drachma vna  
ad aureos duos Mésuæ idem pollet.

Epithymum datur drachmis quatuor cū *Libr. 14.*  
fero lactis aut mulsæ ad purgandum humo- *method.*  
rem melancholicum. Mésuæ verò ad hu-  
mores adustos melācholicos, pituitam da-  
tur pulvis à drachm. tribus vsq; ad septem:  
decoctum autem à drachm. quinque vsque  
ad viginti datur melācholicis: & pituitosis  
ad oxybaphi mensurā ad drachm. quatuor.  
Actuario autem scrupulorū quinque pon-  
dere. Quantum verò variet Græcorum *Dioscor.*  
& Arabum epithymum libr. primo dictum  
abundè est.

Scammonium Mésuæ cholagogum da- *Dioscor.*  
tur à granis quinque ad grana duodecim,  
aluum resoluit duobus obolis sumptum:  
drachma autem vna aut obolis quatuor  
cum aqua vel mulsæ sumptū per inferna bi-  
lem & pituitam extrahit. Modus scammo- *Actuar.*  
nij scrupuli duo, plus paulò, aut minus pro  
virium ratione.

Polypodium cū gallina aut piscibus co-  
ctum datur ad aluum soluendam, & bilem  
atram pituitamq; detrahendam Dioscoridi:  
non expressio tamen pondere, vti nec Gale-  
no libr. 13. Methodi, qui in simplicibus pur-  
gatorium non facit. Mesuæ datur ad bilem  
nigram & pituitā crassā à drach. duabus  
ad drach. sex: senis scrupulis cum mulsā da-  
tur Actuario.

*Actuar.* Veratrum nigrum vtranque bilem va-  
cuat scrupulis tribus, aut paulo pluribus, vel  
paucioribus. Mesuæ etiam vacuat pituitam  
præter vtranque bilem à siliquis sex ad par-  
tem tertiā drachinæ vnius, vel ad drachmā  
vnā, qui modus Actuario consentit, licet  
magnum sit interuallum in hoc simplici à  
scrupulo vno ad scrup. 3.

*Mesuæ do-  
ses recen-  
tū medi-  
camentorū.* Rha barbarum cholagogum & phleg-  
magogum datur puluere à drachm. dimidia  
ad drach. vnā & semissem. Infusum verò à  
drach. vna & dimidia ad drach. duas: vt mē-  
dosus sit locus hic Mesuæ à drach. vna & se-  
missem ad drachmas decem: sic enim nūquā  
scripsisse videtur.

Cassia fistula ab vncia & dimidia ad ses-  
cunciam.

*Mesuæ.* Tamar Indi cholagogi ab vnciis duabus  
ad vncias quinque; ob imbecillā eorū actionē.

Manna cholagoga ab vncia vna ad vnc-  
cias

etiam tres nobis: Mesuræ à drachmis sex ad fescunciam tantum datur, fortè quòd nostra sit imbecillior, aut etiam adukerata.

Turbis b phlegmagogum Mesuræ datur puluere à drachma vna ad duas: infusione autem à drachmis duabus ad drachmas quatuor.

Cassia cholagoga & phlegmagoga datur à femuncia ad fescunciam, modum eius Mesures præterit, opinor quòd innocentissima est etiam largiore mensura.

Senna bilem adustam & melancholiam vacuat ab aureis tribus ad vnciam vnā Mesuræ. Lapis stellatus seu cyaneus idè pollet, & Armenus nõ lotus à semidrachma ad sesqui drachmam: lotus à drachma vna ad drachmas duas Mesuræ & Alexand. Trall.

Hermodactylus phlegmagogus ab aureo vno ad duos.

Quæ alia scribunt Dioscorides, Mesures, purgatoria partim sunt clementissima, partim ob vehementiam hodie à Medicis damnata: quæ omnia fusiùs & doctiùs explicauit Ioannes Tagautius commentario secundo in Mesuræ simplicia, quæ causa facit, quòd minùs diu hic immorandum existimè: præsertim quòd ex his quæ vires habèt minùs vehementes, neque corpori noxias, mensuram si paulò vel augeas vel minuas, nihil



peccabis, siue medicamentum componis, siue exhibes iam compositum aut simplex. Valentioribus verò aliis rarissimè vtamur: cucumere agresti, tithymallis, & lactariis aliis, quibus multis vim purgatricem tribuunt Dioscorides & Mesues, quæ percensere scientes omittimus. De his aliàs plenius dicturi, cum simplicia solis pharmacopolis explicabimus, non etià medicis. Qui labor post hunc secundus mihi est propositus, vt ea scilicet fusissimè declarem: quæ ad pharmacopœorum artem magis pertinent, ea supprimā, quæ illos nouisse est sapenumero perniciosum, dum in messem Medicorum falcem suam mittunt, & pharmaceuticen iniquissimè exercent maxima mortaliū pernicie.

*Li. 7. met.*

Hydromeli cui incoctum sit absinthium tenues succos in ore ventriculi contentos, commodè deorsum impellit.

*Li. 6. sim.*

Empetron ad solas pituitæ & bilis purgationes videtur esse accomodum.

*Lib. 6. sanit. tuend.*

Absinthij coma pota bilem ex ventriculo deturbat vt aloë: pituitosum verò succū ventri magis affigit, cum detergendi vim non habeat absinthiū insignem. Nec aloë valde his conducit, quod ei bilis trahendæ sit facultas: ob id salubriter excogitata est compositio hiera picra, quæ acrimonia calor

calore cinnamomi, & aliorū quæ continet  
crassos & lentos succos dissecat ac deterget.

Ius galli veteris. pituitam & melancholiam magna mensura sumptum ad lib. tres  
Mesuræ, cui nullus venterculus suffecerit. Eius  
parandi ratio est apud Alexandr.

Therebintina resina sumitur aliquando  
nucis ponticæ, id est, auellanae magnitudine,  
aliquando duarum triumve: hodie à drachma  
vna ad drachmas quatuor, vel quinque  
exhibemus, vel bolo cum pulvere glycyrrhizæ,  
vel cum pulueris rha barbari drachma  
vna, quando drachmas resinæ tres raro  
excedimus, vel potu ex decocto cicerum vel  
eius loco aquæ illius aut olei destillando  
separati vnciam dimidiam cum vino albo  
propinamus nephriticis, purgatis prius venis  
primis & ventre reliquo.

*Lib. 5. san  
nit. tuen.*

Diacnicum sumitur, vt dixi, duarum  
triumve caricarum magnitudinis modus,  
quem legitimū in omnibus talibus ex ipsa  
experientia inuenies, cum venter aliis ma  
gis, aliis minus sit medicamenti obediens.

*Li. 5. san  
tuenda.*

Mensura diacodij siue cum sapa ad fom  
num cōciliandum in catarrho acri & tenui,  
siue cum melle ad sputum promouendum,  
que mediocris est duorū cochlearium ius  
tæ magnitudinis, augenda & minuenda  
pro ætate, regione, parte anni: vt si hæc fri

*Lib. 7. cō.  
ph. par.*

gida

gida sint, minùs eius detur: si calida, plus & ad defluxionis quantitatē & qualitatem respiciens: plus minùs exhibe. Quod præceptum præfidiis omnibus est commune.

**Li. I. ant.** Non easdem vires habent antidota, si ante deleteria & post ea sumantur. Ob id si quis quotidie ad præcautionem sumat antidoti theriacæ, vel alterius similis fabæ Aegyptiæ quantitatē, sufficit: post sumpta autē deleteria quadruplo aut quintuplo aucta detur, & bis quotidie, non tantū semel.

**Li. II. sim.** Aescrion morbis recenter à cane rabido dabat per dies quadraginta, quotidie cineris cancrorum fluuiialium vstorum cochlearium magnum: iamdiu antè morbis duo cochlearia.

**Li. th. ad. Pisonem.** Quātum tribus digitis capi potest milui pulvis cum aqua potatur. Aliorum tam simplicium quàm compositorum mensura, pondus, numerus adscribi hic posset, nisi infiniti propè esset operis, & parum necessarij, præsertim cū in compositis libro quarto horum partis maximæ dosis declaranda sit: & cuius liceat ex probatis autoribus exempla plurima proferre. Numerum autem in remediis quibuscūq; ut catapotis, ramis exquisitè obseruari ridet Galenus: quod addunt nōnulli volentes auxilium agere non temperamento, sed mirabili quodam natu-

re consensu hominibus incognito. Quem consensum in his quæ tota substantia agunt, cum Galeno recipimus, sed constitutum in elementorum mistione nobis sola experientia cognita, non in numero.

TEMPVS SVMENDI, VEL  
ADMOVENDI MEDICA-  
MENTI.

**D**Vo igitur nobis præcipue supersunt declaranda, ad usum rectum medicamentorum necessaria, utendi modus, & temporis occasio. Quæ cum magnarum sit virium, non in remediis tantum medicis omnibus, sed aliis etiam cunctis in rebus, ut poetæ ac philosophi fide bona testati sunt. Pro dignitate nobis est tradenda, ut intelligat Medicus, quibus sibi sit opus ad recte utendum temporis occasione in medicando, & si vis, in cæteris quoque remediis.

Finis usus medicamentorum est, ut affectum e corpore præter naturam profliget, siue morbus sit, siue causa morbi, siue symptoma, siue duo ex his, siue omnia simul, siue morbus omnino factus est, siue nondum gigni coepit, sed in pœinctu ut fieri incipiat, siue partim genitus, partim adhuc in gignendo, & partim generandus, siue is affectus sit intemperies aliq

aliqua, aut incōmoderatio, aut solutio continui. Cū igitur medicamentorum vi siue purgante, siue alterante, siue glutinante, vel aliud quidvis affectibus præter naturam curandis necessarium præstante, affectus ipso ex corpore ægro vel neutro expulimus, finem vsus medicamentorum iam consequuti sumus: modò id fecerimus nullo aut saltē quoad fieri potest, minimo viciū incōmodo, quas ostendunt integras aut minimū lasas substantiæ triplicis nostræ spirituosæ, carnosæ, solidæ iusta quantitas, & proba qualitas, actione inculcata æstimanda. Ne scilicet nobis probro obiiciatur, morbum quidem sanatum esse, sed ægrum aut mortuum; aut mortuo simillimum esse redditum, aut in alium incidisse affectum ex nostra curatione lethalem, aut priore peiorem, vel non minorem: cū Medici munus sit, vt dixi, citò, tutò, iucundè curare: aut si omnino curare non possit, saltem leuiorem reddere morbum, aut non augere, neque contrarium affectum inducere: Quod his sepe accidit, qui nulla methodo curant affectus planè nondum cognitos: ignorata etiam parte in eo affecta, ne addam per remedia, quorum vires omnino ignorant: in vitium enim ducit vitiij fuga, dum caret arte.



Porro affectus præter naturam è corpore citius, tutius, minore agri molestia pelluntur, vel cum nondum radicauerunt, vel cum iam victi à natura fuerunt: quomodo plantæ omnes ortu primo etiam parua digitorum duorum vi promptè euelluntur: vbi autem radices altius egerunt, ne multarum quidem manuum violentiæ diuturnæ cedunt: sic principio morbi remediis clementibus tolli possunt, nisi ea sint natura, vt etiam principio ardeant, & sæuiant. Vbi autem in naturam nostra diutius egerunt, remediis quantumuis generosis non vincuntur, vt sæpe ferro sit opus & cauterio. Quomodo item cum agricola omnes magnas arboris radices concidit, terra ligonibus effossa, fessus is vires interdum alterius requirit exiguas, quæ arborem prosternant: sic victo à natura morbo, nondum tamen ob lassitudinem ipsius profligato adiutrices Medici manus postulat. Quæ alioqui solet quem vicit morbum per se profligare, vt arborator arborem: quādo autem certamine aut longo vt vehementi contra morbum longum, magnum, malignum, ipsa etiā prius haud ita valens, fuerit fracta, tunc auxilio eget nostro, nisi antè succumbat, etiam nobis eam adiutantibus, sed planè victam, cadibundam, & moribundam.

*Ap. 2. et* Cum autem purgatio sit humorum sua  
*23. et 25.* qualitate molestantium facta vacuatio vo-  
*1 hr. r. et* mitu, aut potius deiectione, si talis humor  
*. Ap. 2. et* vel à natura, vel à Medico eius imitatore va-  
*3. libro. 4.* cuetur, qualem abundare indicat morbi  
 non modo præsentis, sed aliorum quoque  
 consuetorum natura, ægri ætas, temperatu-  
 ra, vitæ conditio, habitus, consuetudo, vi-  
 ctus ratio, pars anni, regio, præsens calis ta-  
 tus, cōfert talis vacuatio, estq; egro toleratu  
 facilis: vt si bilis flaua calidis siccis prædictis  
 omnibus, pituita iisdē frigidis humidis va-  
 cuetur. ab his igitur ipsis & aliis humorē in  
 corpore redundantē demonstrātibus (quæ  
 in femæntice latius docuimus) qualis humor  
 sit purgandus, coniectabis. Qualitatis signa  
 hæc sufficiant nobis ad eligendum qualem  
 noxiam humorem nos vacuare oporteat.  
 Quantum autem sit vacuandum humoris  
 eius noxij, tolerandi facilitas nobis indica-  
 bit: & si talia deiciantur, qualia deici o-  
 pus est, quod scilicet superabundante va-  
 cuato humore, æger seipso fiat leuior, &  
 morbum melius ferat. Si enim humor ali-  
 quis naturę adhuc familiaris vacuetur, vires  
*Ap. 51.* soluantur & læduntur. Irem si plurima &  
*li. 2.* repentina fiat vacuatio, etiam corruptæ ma-  
*Ap. 27.* teriæ, nam omne nimium & repentinū na-  
*lib. 6.* turæ est inimicum. Autè tamen coniectura  
 qua

quadam artificiosa ex morbi ac causæ eius magnitudine ægri natura, proprietate, viribus, ætate, habitu, consuetudine, aëris tēperie, & medicamenti viribus præsumendum est, quanto purgante remedio ( vt idem in cæteris auxiliis intelligas ) tali vt catholico, cassia in tali tempore, morbi talis, à tali & tāta causa, in hoc aëre, hoc corpore sit opus. Quam coniecturam feliciorem tibi reddēt probatæ iamdū doses, & mensuræ dandorum medicamentorum, tam simplicium ( de quibus paulò antè ) quàm compositorum ( quas lib. 4. dicemus. ) In his enim minimā & maximam medicamentorum mensuram inuenies: illam omnibus dictis causis paruum requirentibus vacuationem: hanc contrariis, in vtriusque medio collocatas causas pro vicinia aut récessu extremarum coniectabis: in omnibus tamen tutius est à minoribus incipere, & pro effecto augere vel minuire.

Aliarum autem vacuationū, vt eius quæ phlebotome fit, quātitatis idonæe signa præter hæc sunt alia, vt coloris sanguinis mutatio, in phlegmonis sectæ venæ propinquis, *Lib. 9. method.* pleuritide, synanche: vt animi deliquium ex multa vacuatione in maximis phlegmonis, in adurentibus febribus, in vehementissimis dolorib⁹, si vires prius erāt integre & valētes.

## TEMPVS PURGA-

## TIONIS.

*Aph. 11.  
et 19. li. I.*

**A**limentum quoque, alioqui naturæ amicum ad suas vires tutandas, prohibetur in accessionibus, & aliquandiu ante accessiones, nisi viriū imbecillitas adsit (tūc enim omni tempore cibandum) multò magis per ea tempora à medicamentis naturam omnino alterantibus & inanientibus, ob id plurimū infirmantibus, est abstinendum, si tamen febris sit aut cōtinua aut intermittens, sed cum longissimis accessionibus, tempus est deligendum in accessione mitius, aut aliquandiu ante accessionem, vt alimento dando, sic medicamento exhibendo. In febribus verò intermittentibus si vnum saltem diem cessent, eo purgandum est, non die accessions: si duos dies, obseruandæ sunt vires, quas reliquit accessio præcedens, & accessioni succedens per sudorem vel aliud vacuatio. Si enim fractæ multum videantur, priore illo die sunt resiciendæ, postero vacuandum: sin erunt robustæ, & nulla post accessionem insignis facta est vacuatio per sudores, vrinas, vel aliter, neque accessions vehemētia immodicè naturam alterauit, priore intermissionis die purgandum, vt simul accessions præceden-

tis

his reliquias vacues, quæ febrile in corpore aliquid fouent, & accessiones anteuertere cōpellunt, & sequuturis accessionibus materiam adimas.

Tempus autem idoneum dandi medicamento præcipuè ostendunt, motus naturæ (leuiora enim plurima à quibusdam tradūtur) vel morbi, vel vtriufq; adhuc ægri vires, & aëris conditio, & quæ præcesserunt, vel adfunt, vel impendent spontinæ vel nostræ vacuationes. Cū nanq; natura integrè ac perfectè crisi ipsa non vacauit, vel non vacuat noxiam materiam, quo deficit addet medicus vel medicamentis, vel aliis remediis, ne à reliquiis ipsis recidina excite-  
tur: vacuabit autē naturæ motū imbecillio-  
rem adiuuās, si is per partes idoneas vacua-  
bat, vt per nares hæmorrhagia, si ex nare  
fluat lateris dolentis, si quod fortè dolebat:  
per intestina, fluore, alui: per vterum, per hæ-  
morrhoidas venas, per vrinarium meatum,  
per poros cutis, promouendo ad has partes  
vacuanda. Si verò natura deprauatè mouet  
excrementa, vt ad pulmonem, thoracem,  
cor, vel aliam partem principem, vel effluxu  
libero carentem, tunc quia maius damnum  
est sequuturū, hunc naturæ motū prohibe-  
bimus, & ad cōtraria trāferemus & auerte-  
mus. Deprauatus etiam est naturæ motus, si

*Li. 9. met.*

*Aph. 20.  
libr. 1.*

*Ap. 12.  
libr. 2.*

*Ap. 21.  
libro 1.*

*Ap. 22.  
libro 1.*



ante coctionē symptomaticē vacuat: nam concocta medicari oportet: si verò etiam iusta crisi immodicē moueat, motus eius est inhibendus, in contrarium repellendo.

- Ap. 24.* Morbi quoque motus vel celer in acutis,  
*lib. 1. &* vel errabundus etiam in aliis, in principio  
*Ap. 10.* crudam adhuc materiā vacuari interdum  
*lib. 4.* permittit: in acutis enim morbis rarò & cū  
*Ap. 22.* præmeditatione, sed in principio medica-  
*lib. 1. &* mentis purgantibus vtendum, in aliis verò  
*li. 8. com.* concocta medicari oportet non cruda, nec  
*ph. p.* in principiis, modò non turgeant: si enim  
*Ap. 29.* turgeat materia, & ad excretionem tendat,  
*lib. 1.* vel in nulla parte firmam habeat statio-  
*Ap. 30.* nem, etiam initio purganda, non expecta-  
*lib. 2.* to eius in partem aliquam decubitu, quem  
*Ap. 29.* postea vincere non fuerit facile. Dum enim  
*lib. 2.* tales morbi inchoant, vacuanda est hæc ma-  
 teria, sed clementiore medicamento: nec  
 minùs in principiis morborum salubrium,  
 si magna est cacochymia, vacuandum est,  
 vt reliquam materiam parciolem facilius  
 natura percoquat. Huc pertinet quòd sym-  
 ptomata etiam vires prostermentia circa  
 morborum initia, vt etiam in declinatione,  
 sunt mitiora.

Eadem verò quia in morbi vigore sunt  
 valentissima, & vires multum prostermen-  
 tia, ob id dum morbi consistunt, à purgan-  
 tibus

tibus medicamentis abstinendum est. Non modò autem in vigore vniuersali à medicamentis abstinendum, sed etià in particulari, atq; adeò particulari principio: si enim est in accessionibus ab alimèto, vtpote nocituro (quia naturam à coquenda morbi causa ad alimenti coctionem auocaret) abstinendum multò magis à medicamento. Porius enim die est intermissionis vacuandum, quòd si accessio vel longissima sit, vel continua, medicandum, vt paulò antè dixi, quando morbus est mitior: si autem sit febris homotonos aut anabatica, initio potius medicandum, viribus adhuc integris, & materiæ coquendæ copia naturæ subtrahenda. Tunc enim dandum est medicamentum, cùm vires validæ id in actum ducere possunt, & materiam nondum fixam expellere ad medicamentũ attrahens, & talem ac tantam vacuationem ferre, qualem hoc est, cuius humoris scilicet noxij, & quantam medicamentum hoc facturum coniectura per experientiam longam firmata, colligimus. Deiectiones enim non multitudine sunt æstimandæ, sed si talia deficiantur, qualia pro morbi natura, ætate, parte anni præcedente victustatione defici oportet, & ægri facillè tolerant. Neq; enim semper optatiora sunt medicamenta,

*Aph. 2. 3.  
et 25. li. 1.*

*Aph. 3.  
lib. 4.*

Ap. 51.

lib. 2.

Ap. 27.

lib. 6.

quæ multam faciunt etiam noxiæ materiæ vacuationem, nisi æger tantam vacuationem facile toleret. Plurimum enim atq; repente vacuare, ut replere, malum: quod omnem nimium & repentinum naturæ sit inimicum. Ob id etiam Hippocrates empyis ipsis, & hydropicis aquam vniuersim euacuare per sectionem vel vstionem thoracis & ventris cauit, quia alioqui omnes moriuntur. Ab aëre autem sumpta indicatio medicamenti hoc tempore dandi vel non dandi postea fusius tractabitur, & antea obiter est perstricta.

Ap. 30.

lib. 2.

Cum igitur circa initia & fines morborum symptomata, accessio, vigiliæ, dolor, sitis, cibi fastidium sint imbecilliora, ut morbus horum causa est mitior: cum verò morbi in suo vigore consistunt, dicta symptomata sunt fortiora, & tunc natura coctioni materiæ vacet. Purgandum aut initio morborum est, aut sub finem vniuersalem morborum, aut utroque etiam tempore: Initio quidem, ut minorem iam redditam materiam possit natura facilius coquere.

Ap. 29.

lib. 2.

Ap. 10.

lib. 4.

Ap. 24.

lib. 7.

Medicari etiam in valde acutis, si materia turgeat, eadem die: tardare enim in talibus malum est.

Item in acutis morbis si materia turgeat, ta est in principio purganda, cum maius com-  
mod

modum huius materiae febrem committē-  
tis vacuationē sequatur, quā in cōmodum  
ex aucto calore per medicamēta purgantia,  
quae omnia sunt potestate calida: si verò  
multus illis crudus succus inest, vel crassus,  
vel lentus, à quo hypochondria inflentur ac  
tendantur, vel immodicè caleant, aut sit vi-  
scerum inflāmatio, in his periculosa est pur-  
gatio in morborū acutorū initio, sed prius  
humores noxij, crassi, lenti sunt tenuādi, in-  
cidendi, tergendī, ad fluxū parādī, & liberā-  
dæ sunt obstructiones, aperiendīq; meatus,  
per quos est humor à medicamēto purgan-  
te trahendas, & transmittendus, faciendāq;  
vacuatio, vt in morbis lōgis tales causas se-  
quentibus fieri consuevit, & quibusdā acu-  
tis: nā acutissimi nō dāt horū auxiliorū in-  
ducias. Corpora enim cū quis purgare  
volet, oportet fluida facere, citra quā operā  
si purgare vomitu aut deiectione coneris,  
difficilis fit purgatio cū torminibus, verti-  
gine, multo fastidio, pulsū malo, dissolutio-  
ne viriū & difficultate, ac rosione ibidem.  
quia omnes succi crudi sunt pigri, & ad mo-  
tum inepti, ob crassitudinē & frigiditatem.  
Quo fit, vt vias omnes angustas etiam ob-  
struat, per quas id quod medicamentū dei-  
cit, ferri ad aluū debeat, ac ita nec ipsi educā-  
tur, & aliis sint impedimēto, li. 4. sani. tuēd.

*Aph. 9.  
lib. 2.*

- Ap. 21.* Concocta nanque medicari & purgare  
*lib. 1.* oportet, nō cruda, nec in principiis, nisi tur-  
*Ap. 20.* geant: plurimæ verò materiæ non turgent,  
*lib. 1.* sed firmatæ sunt in parte aliqua, quas ante co-  
 ctionem neque medicamento, neque aliter  
 mouere expedit: vbi autem cocta erit, va-  
 cuanda, quia tunc naturam habemus eua-  
 cuationi adiuuiculantem: hæc enim co-  
 quendo secernit, postea excernit superflua,  
 & crises facit, quas si perfectè agit, sinenda  
 est: si imbecillius, iuuanda, & quod de legi-  
 tima noxiæ humoris vacuatione deficit, à  
 nobis supplendum medicamento purgante,  
 humorem sibi proprium trahente, & natu-  
 ra eundem expellente, aut alia vacuatione  
*Ap. 21.* feliciter à natura incepta, & per loca con-  
*lib. 1.* ferentia, sed non absoluta. Eam autem va-  
 cuationem absoluimus, quia quæ ex mor-  
 bis post crisin relinquuntur, materiæ humo-  
 rum noxiorum in corpore, recidivas febres  
 facere consueuerunt. Cùm enim alieni sint  
 à natura, nec nutrire possint, corrumpuntur  
 & putrent, idq; celerrimè, quòd sint in loco  
 calido, ante verò putredinem appetentiam  
*Apho. 3.* prosternunt: si in ventriculo collecti sint,  
*lib. 2.* aut corroborari corpus, etiam si alimētum  
*Ap. 10.* idoneum assumat, qui ex morbo illo reua-  
*lib. 2.* quit, prohibent, & quò plusimenti sumit,  
 tantò peius habet, quod corpora non pura  
 quan



quantò plus nutries, tantò magis lædes.

Ex quibus apparet, initio morborum purgandos esse noxios humores, vel qui ventriculi spatium occupant & intestinorum, & si vis primarum venarum, modò impacti eis valentius non sint (qualis multis est harum regionum frigidarum hominibus voracissimis) vel qui motu errabundo huc illuc per corpus incitati feruntur. Tales enim ambo facilè à medicamēto etiam clemente, vel ducuntur, vel trahuntur: vt neq; contingat dicta prius symptomata difficilium purgationum, verrigines, tormina, lipothymia: neque morbus augeatur. In id enim blandioribus, vt cassia nigra, hiera picra, & similibus utimur, quorum vis ultra hepar non fertur, aut non multò ultra.

Purgandum secundo in fine status vel declinatione morborum, cocta iam materia & coepta à natura expelli, sed ob virium eius laxatae imbecillitatem nondum omnino expulsa. Quam vacuationem etiam tentare licet, simul dum natura crism mouet imbecilliter, vt geminatis moribus, naturæ & medicamenti, perfecta tunc fiat noxiæ materiæ vacuatio, eaque per loca conferentia.

Sic hiera dat Galenus in phlegmone venter. *Lib. 3. cō. ph. p.*  
gmo

gmones ipsius tempore, modò non turgear materia, neque ad excretionem impellatur, & nullam adhuc firmam inclinationem ad vllam partem habeat, aut stationem.

Purgantia autem succos crassos & tenaces vt pituitã & melancholiã, faciliùs paulatim & sæpe purgât, interea tenuatos, incisos, deterfos, quàm affatim: sic enim corpus exagitur, & solùm tenue & aquosum vacuatur: Alexander Trallianus in cephalalgia à crassis & lentis & frigidis humoribus, & iterum in podagra phlegmatica.

*Libr. 7.  
meth.*

Sumpto autem medicamento purgante modicè corpus ambulatione mouendum, vt celerius descendat, quod sumpta hiera præcepit Galen. & sumpto elleboro, Hippocrates Aph. 14. & 15. lib. 5.

*Lib. quos  
med. pur.  
oportet.*

Postquàm autem assumptum est medicamentum purgatoriũ præsertim validum, ptissanæ cremorem sorbendum dat Hippo. lib. 2. rat. vict. acutorum, vt quæ portio medicamenti gulæ & stomacho adhæsit, tergeatur, & deorsum trahatur, & alteratio à medicamento in dictis partibus facta corrigatur. Vbi autem fieri inceperit purgatio, negat dandam ptissanam, ne vis medicamēti exoluatur. Hodie quoq; quod lauatoriũ vocant, ferè horis tribus à sumpto medicamēto exhibēt, hora circiter vna ante pastũ;

Si

Si verò medicamentum vel nihil egerit ob naturæ ægri proprietatem, aut medicamenti imbecillitatem, aut portionem exiguâ, aut intestina stercore duro per clysterem prius vacuando obstructa, aut magnû naturæ impetum celeriter medicamentum deturbantis, vel non reducentis in actum, vel ob causas cōtrarias immodicè mouerit: singulorum remedia habes in canonibus Mesuæ. Quòd si retineatur, & clemens fuerit retentum, præterquàm corpus nō lædit, animalis sit alimentum. Valentia verò lædunt si retinentur, & in qualitatem delecteriam & venenosam vertuntur.

Purgantia vomitu interdū ieiunis dantur: sic Philotimus & Praxagoras crudorū succorum copiam ex ventriculo & primis venis vomitu vacuabāt, data largiore mulsæ cui incoctum erat hyssopum, qua etiam hi succi crudi ante vomitum sunt tenuandi & coquendi, & si qui etiam post vomitum supersunt: modò cum crudorum succorum copia, neque humor mordax sit extra venas lassitudinem vlcerosam faciens, neque alius affectus vomitum illum impediens: nam eo acres humores per halitum digerendi intra venas in corpus intimum traherētur. Vomitus etiam impediūt hyems, Aph. 6. lib. 4. phlegmone vētriculi & partium vicina-

*Li. 4. san-  
nit. tuend.*

*Li. 1. loc.  
affec. &  
Aph. 6.  
& 7. lib.  
4.*

rum

*L. 5. v. sus par- zium.* rum, phthisis Aph. 8. li. 4. dolor capitis, quia id vomitus replet, ob id dānatus Astelepiadi: si quis item ægrè vomit, non est cogendus, aut paulatim ad vomendum victu humectante est parandus, vt Aph. 13. lib. 4.

*Sic fotum aqua calida in punctura nerui dānat Gal. li. 6. meth.* Vomitu etiam purgantur corpora post cibū, nō quemuis, sed falsum, amarū, acrem, seu incidentem, tenuantem, tergētem: oxymelite autem cū succo raphanidis misto, & multò largiore quàm potus, aut deiectionis gratia sumpto, faciliior & promptior fit vomitus, adhuc efficacior: nam qui ex aqua tepida vim retentricē ventriculi dissolvente, & corpus eius à frigido concretum velut resolvente fit vomitus, etiam si vinum dulce superbiberint, tantum vacuat, quæ in eius capacitate innatant, non etiam quæ tunicae eius internæ hærent, multò minùs quæ altius in tunicas ipsas recepta sunt & impacta. Ad quæ vacuanda, hiera picram Galenus docet esse efficacissimam.

Vomendum etiam bis in mense Hippo-  
lib. de somniis ægrorum.

*Li. 6. fanit. tuen.* Post vacuatum ventriculum vel bile flamma in ipsum confluente, vel etiam in ipsius tunicas altius imbibito excremento, illa per comam absinthij, hoc per hiera picram, ventri admove foris vnctiones modicæ astringentes, vt melinum æstate, nardinum

hyem.

hyeme, mastichinū vere, id enim medium est inter melinum, quod frigidū est, & vnguentum nardinum, quod calidum, potissimum cū amomum liberalius immistum habet. Qui locus etiam indicationem ab aëre ad vsum rectum medicamentorū conferre declarat.

Astringentia primis epulis sumpta aluū cohibent, post cibū ingesta aluum solvunt. Causa huius est libro 6. sanit. tuendæ, & 1. libr. & 2. alimentorum. Qui verò thorace sunt angusto, & ob id pulmone contracto inepti sunt vomitorie purgationi, præsertim per elleborū album. Vas enim vomendo sibi ruperint in aliquo respirationis instrumento. Quod si alius elleboro purgandus est, cibo & quiete corpus antè humecte tur, & vomitu assuefiat.

Fiunt quoq; purgationes vti & phlebotomæ interdum ad præcautionem morborum impendentium, non præsentium curationem: vt cū quis vere ineūte corpus vacuet, vt à vernis morbis aut æstiuis sit liber: vt autumno, vt vitet autūnales morbos ac hybernos. Eadem ratione si quis in spontanea lassitudine morbum aliquem præ-

*Aph. 5a*  
*libro 2o*

nuntiante vacuet, morbum perfici prohibet. Item si quis noxiorū humorū ex morbo præcedente reliquias vacuet, vt recidiū.

morbo



morbū prohibeat, vt prius dictū est: sic dum plethoricū & optimū corporis habitū vacuamus vt corpus ipsum nutriri rursus incipiat, & ne calor natiuus suffocetur, aut vasa præ copia rumpantur.

*Aph. 3.  
lib. 1.*

*Ap. 36.  
& 37. li.*

2.

Aliās sanos ipsos nunquam medicamur, quia medicamenta difficulter ferūt, & vertigines ac tormina patiūtur, & egrè his purgatio procedit, & celeriter exoluuntur.

Phlegmones initio sola repellentia, augmento miscenda coquentia, statu digerētia, quibus solis in declinatione vtendum. Eadem ratione in morbis aliis à fluxione prodeuntibus, nisi fluxio eruperit in partes principi alicui parti, vt cerebro, cordi, hepatis, vētriculo propinquas: aut nisi materia sit venenosa & pestilens: aut nisi materia crassior, glutinosior, impactior, profundior, vt in pleuritide, ischiade. In horū enim affectuum initiis anodynīs vrimur, post coquentibus & digerentibus, habita prius ratione totius corporis, si vacuatione egere videbitur.

Hæc de tēporibus vniuersalibus & particularibus morborū, quibus medicamenta sumi vel admoueri possint, sufficiant, reliqua ex methodo repetantur.

Tempus aliud quoque spectandum est in recto vsu medicamentorum, non morbi quid

quidem, sed motus primi mobilis respectu,  
quod propriè & absolute tempus dicimus,  
& ab eo partes anni & diei.

Cùm morbus dat inducias & delectu ha *Lib.7. me*  
bito purgamus, siue morbi initio, siue cocta *thod.*  
iam materia ( vt diximus ) ferè purgatoria  
dimus medicamenta, cùm ventriculus he-  
sterno cibo est vacuus, hoc est, manè. Quod  
tempus intellexit Galenus, cùm dixit, hiera-  
picra dabitur solito purgantium medica-  
mentorum tempore, quanquàm in libro  
quos medicamentis purgare oporteat, &  
qualibus, & quando, temporis huius non  
meminit, nisi in ea operis parte, quæ deside-  
rari videtur, id addiderit. Quem verò librũ  
de compositione purgantium medica-  
mentorum promisit libro i. comp. phar. part. ad-  
huc desideramus. Cumq; catapotia dedit ex  
aloë & hieram diacolocynthidos bis initio  
lib. i. comp. ph. part. temporis huius nul-  
lã facit mentionem, tãquam id omnibus  
notissimum esset, prætermittens. Id tem-  
pus etiã hodie seruamus, quoties siue ad  
curationem, siue ad præcautionem corpus  
est purgandum potione, vel bolo ( vt vo-  
camus ) vel tesseris saccharatis & scammo-  
niatis.

Si verò catapotiiis purgandum, magna  
ex parte media nocte leuissimè cœnatis, aut

post primū somnum ea dantur, vacuo iam (vt videri potest) ventriculo, vt in eis ad actum reducendis solis occupetur. Quæ res ei est difficilis ob crassitiem & duritiem, ob id orobi magnitudine & molliora facimus, cum citò vacuare libet, & minore ventriculi molestia. Nam crassa & dura, vt diutius agant, vtq; potentius à corpore toto attrahant, si ea vi sunt prædita, tamen crassitie & duritie, & mora longiore ventriculo molestissima esse consueuerunt.

Cum verò tantum ventrem inferiorem, ventriculū, intestina, ac venas primas purgare libet, etiam hora vna ante vel post epulas, damus leuiora quedam cathartica, vt cataporia Ruffi, & mastichina, & ex aloë, & quæ ante cibum vocant à consueto vtendi tempore: item cassiam nigram. Quæ etiam minore mensura largius purgare videntur, quòd secum cibū propè omnem ac potum deturbent. Quibus item alius natura aut euētu aliquo est astrictior, his succurrimus datis duabus drachmis cassiæ huius, aut circiter paulò ante tres pastus, idq; singulis hebdomadis, si opus est, repetere suademus magno ægrorum commodo.

Quibus hepar est calidius, his hora vna ante matutinum purgantis medicamenti vsum propinamus, ptissanæ vel alterius simili

militer refrigerantis & humectantis cyathos duos, vt pars in melius alterata minus à medicamento mutetur: & horis quatuor à prandio vncias duas syrupi rosati, vel similis exhibemus, præsertim aëre calido: aut ante cœnam, aut horis duabus vel tribus à cœna medicamentum idem damus, hepate iam per alimentum temperato. Quæ ratione iisdem exercitationem (si qua aut celeris, aut robusta, aut vehemens est obeunda) ante cœnam suademus & venerem, si sint vxorati, innocentiores eis paulò ante cœnam aut ante mediam noctem cum prædixissemus, experientia verissimū comprobant: & salsa aromatâq; summa mensa vinumq; generosius & meracius innocenter magis ferunt, quàm primis epulis. Hac de causa enim quietem, hoc est, leuiculam mutationem, qualis est ambulatio, calidæ naturæ præcipit Hippoc. Hac opinor ratione Venetiis & Italię magna parte, & calidis aliis regionibus medicamēta scammoniatæ præbent vel paulò ante cœnam, vel horis duabus à cœna, vt cibo potuque vis eorum vehemens inducta mitescat, & secum quæ in ventriculo & primis venis pigrè cessant, trahat. Quam rem largissimæ deiectiones sequantur, & parua ægri molestia, quam profectò calidæ siccæq; naturæ maio-

rem experirentur, si in vacuum ventriculū hepar, venas calētissimū id medicamentum feratur.

In his verò frigidis regionibus & pituitosis maxima parte naturis nō ab aëris natura modò, sed in expleta ingluvie, à purgātibuscāmmoniatis ventriculò hesternacœna vacuo non timemus, quòd in eo larga adhuc pituita & fluitet, & hæreat, & altius imbibita sit. Ob id ferè matutinū tempus purgationi destinamus, horasque duas, tres, quatuor inter medicamentum & epulas interponimus pro medicamenti facultate & ægri natura. Nam scammoniata nō multò post quā sumpta sūt, vacuant, egentque primū iusculò, quòd ipsa celerius per intestina deiiciat, & noxā partibus impertitā eluat. Rha barbarum verò cū tardius agat, longius sibi tēpus postulat ad trahendum, neque citò de corpore pellendum: quā tantum abest, vt visceribus obsit, vt etiam sua vi astrictoria (quam cum purgante coniūctam habet in diuersis scilicet substantiis) firmiora reddat.

Vbi autem morbi non expectati violentia vrget, quocunq; tempore is vacuationē postularit, si ea perfici possit, & vires ferre queant, à nobis imperatur etiam vehemēs, quòd extremis morbis extrema exquisita  
remed



remedia sint optima: & in talibus morbis à vehementissimis sit incipiendum, non quomodo in clemētoribus à leuibus remediis curatio initur. Quomodo vlcus omne remedia siccantia morsus expertia requirit: quæ verò maligna sunt vlcera & putrida, acribus egent, & ignis modo exedentibus, misy, chalciti, arsenico, calce, sandaracha.

Partes quoq; anni temporis appellatione venientis aliquid etiam ad purgationes vtile indicant: ob id veris initio pituitam siue bilem flauam, & autumnō atram, ad vitandos vernos, æstiuos, autumnales, & hybernos morbos purgare, & venam secare consuevit Galenus, non æstate nec hyeme: nam æstate corpora calidiora & sicciora, & ab aëre ambiente dissoluta, medicamentis purgātibus & sanguinis vacuatione maximè læduntur, quòd illa calfacit, siccatur, infirmit, ac dissoluit, hæc inanitione virium substantiam dissipat: hyeme verò excrementa concreta ad motū pigra medicamento trahent dum non parent, lucta in corpore torminosa fit & molestissima, cui etiam lipothymia sæpe succedit. Phlebotome verò aëre frigido dum calorem natium multum vacuat, & eius pabulum subtrahit, extinguendi reliqui caloris periculum affert ab ambiente frigido. Ob id etiam æsta-

*Lib. 2. ad*

*Glaucon.*

*Lib. quos*

*medi. pur.*

*oportet.*

*Lib. de cu*

*rat. morbi*

*per phleb.*

*Aph. 5. li- bro 4.* te raris vtimur medicamentis purgantibus, præsertim sub cane & ante canem, vel simili-  
*Aphor. 4. libr. 4.* lem aëris statum, iisque cholagogis potius & vomitu magis purgantibus, quòd eo bi-  
*Hippo. de natur. ho- minu.* lis tunc largior magis repar. Hyeme phleg-  
*Aph. 4. 6. & 9. li. 4.* magogis vel melancholiam vacuantibus vtimur magis, & his deiectoriis non vomito-  
 riis.

Aliud etiã tempus, astrorum ortu & oc-  
 casu varium spectare iubent astrologi in  
 vsu medicamentorum apto, quòd tamen  
 hodie Medici propè omnes negligūt, quòd  
 id Galeno obseruatum non legimus, nec  
 obseruandum putamus, longa experientia  
 & ratione optima persuasi. Tamen recipi-  
 mus spectandas Medico magnas in aëre fieri  
 solitas mutationes circa ortum & occasum  
 magnorum quorūdam siderum, de quibus  
 multa Aëtius lib. 3. cap. 174. Alexander item  
 libro 4. in podagra medicamentum Tra-  
 chij Philosophi dat veris initio, sole Pisces  
 ingrediente.

Est præter hæc tempus obseruandū, diel  
 pars matutina, meridiana, vespertina, no-  
 cturna, ante cibū, post cibum, vel alia quæ-  
 dam remedia, vel mox à cibo, vel alio re-  
 medio, vel multò post. Cuius magna vis est  
 in quibusdam, quorum postea aliquot exē-  
 pla leges.

Ad tempus quoq; referri potest affectus prior curandus, qui est alterius causa: ut si fluxio à capite in oculos est, caput primum est curandum, deinde oculorum firmitati est prospiciendum, ut eorum quæ confluunt minus promptè quicquam recipiant. Aliud præterea tēpus ante morbi generationem, dum præcauemus & morbo iam gigni cœpto, aut etiam genito, quando curamus: ad præcautionem enim minor quātitas remedium requiritur, quàm ad curationem. Ob id theriaces fabæ Aegyptiæ quātitas ad præcautionem semel die sufficit: venenato autem, vel alio affectu cui hæc medetur, affecto & largior & crebrior danda. Et Aesculapion plus pulveris *Διά νάρκισσων*, dabat iam diu mortis, minùs recenter mortis. Et Galenus picocolis, quibus quod per cutim quotidie transpirat, est acre, lauare semel in die & modicè cum paucò oleo dulci fricare sufficit, cum valent: ubi verò stipata cutis est ab astringentibus, aut emplasticis, aut siccantribus, sic ut iam inæqualitatem caloris horridam sentiant, vel etiam inde iā febricitent: soluta accessione bis & ter lauat, oleo sabino pinguis & molliter vberius fricat, pro causarum magnitudine & multitudine.

*Lib. 7. method.*

*Li. II. simplic.*

*Lib. 8. method.*

Quedam nullo discrimine ante cibū vel

post cibum sumuntur, ut catapotia ante cibum vulgò dicta, quæ etiam post cibum accipi & dici possunt.

*Li. 4. san.  
tuenda.*

Diospolitici pulvis cremori ptissanæ, vel aliis aptis inspersus, vel ipsum cum melle optimo & curiosè despumato mistum, sumitur ante & post cibum ad flatum discutiendos, & aluum soluendam, præsertim si nitri tantum habeat, quantum cumini, piperis, & rutæ, quibus 4. simplicibus constat.

*Ibidem.*

Medicamentum dia trion pipereon datur ad flatum discutiendos, & iuuandam coctionem non semel, sed bisve quotidie, sed etiam sæpe: siquidem manè & ante cibum, & post, etiam cubitum euntibus cochlearij pleni mensura, & eius quidem parui in parvis corporibus, maximi in maximis, in mediis ad portionem. Vbi indicationem quantitatis medicamenti sumit etiam à quantitate corporis.

*In fine li.  
6. sanita.  
tuenda.*

Diacydonio datur ieiunis mediocris mystri mensura, nec à cibo sumptum lædit: commodè etiam datur ante cœnam post prandium. Detur autem duabus aut tribus horis ante cibum.

Sic cõdita electaria, pulueres, & id genus alia roborando ventriculo idonea, modò ante cibum, modò post sumi iubemus.

*Li. 4. san.  
tuenda.*

Quæ verò ad alimenti in corpus distributio

butionem vehementiorem faciunt, ea sunt sumenda manè: quòd si per ea vacuationem eorum quæ in carne cessant, molimur, post frictionem matutinam, ante exercitationem & balneum sumantur: quando Galenus dabat diacalaminthen in lassitudine vlcerosa cum cocta cruditate primarum venarum.

Quæ hepar obstructum liberant incipientia, tenuantia, tergentia, vacuantia dàda sunt eo tempore, quod inter surgendum à somno & lauandum interuenit, postquam scilicet iam confecta sunt, quæ ex ventre ad hepar redduntur, & temporis aliquid eorum operi ante cibum sumendum dari non inutile fuerit. *Lib. 6. sanit. tuend.*

## DE MODO VTENDI

### MEDICAMENTIS.

**V**Tendi modus superest dicendus, cuique propè medicamento suus, cuique item parti suus propemodùm. Sumitur autem à partis natura, figura, situ, cōnexionem, magnitudine, sensu obtuso vel acri: affectus natura, situ, figura, magnitudine, duratione: ægri natura, ætate, cōsuetudine, viribus: aëris temperie, medicamento denique viribus, consistētia, & cæteris prius in compositionis methodo dictis. Quæ enim methodus est

*Initio lib.  
4. cō. ph. p.*



*Lib. 6. cō.  
ph. part.*

componendi propria partiū medicamenta, eadem his vtendi. Ipsa nanq; compositio veluti vsus respectu efficitur, dum id spectant, qui medicamenta conficiunt, vt ipsorū vsu agris auxilientur. Tamē in multis partibus non opus est solū, qua methodo remedia sint inuenienda scire: sed etiā quomodo inuentis decenter vtendū sit: vt in affectibus capitis, aurium, oculorum, nariū, oris. & cæteris post leges, si prius familiaribus exemplis prædicta breuissimè declarauero. Partibus natura frigidis, vt capiti, oculo, etiam si morbo calido laborant, actu vehementer frigida, qualia sunt narcotica, adhibere veremur: licet ab æstu calfactis olea etiā niue refrigerata capiti affundimus: & oculis calētibz aquam frigidissimam applicamus.

Quia capiti rotundo & probè sphærico affusum oleum nō coheret, ex alto per mediocrem lanæ modum sincipiti affunditur. In partes cauas, vt aures, nares, os, & reliquæ ei connexæ, vterum, meatum vrinariam, sedem, sinum, medicamenta impelluntur, vel attrahuntur, vel recipiuntur corpore in id figurato: in aures enim otenchyra, id est, oriculario clystere vel strigili infunduntur: in nares flatu per tubū impelluntur, vel inspirando attrahuntur, vel turunda immittuntur. In os imposita nūc gargarizantur, nunc

per

per foramina palati expiratu propelluntur, nunc deuoratur, nunc paulatim deglutiuntur, nunc faucibus retenta sensim inspiratu trahuntur in pulmones, nunc ore retinetur, ut ventriculum vel cerebrum roborent, ut fluxiones acres temperent, cogant, reprimant.

Cauitas narium, & sedis, & vteri, & quorundam sinuum deorsum spectat, ob id vel corpus in contrariam figuram constituendum, vel liquidis materiis in hos meatus iniectis, bombace, turunda, pello est opus, vel alio operculo, ne materiae refluant.

In os & fauces recepta, foraminibus palati, gutturi & gulæ communia sunt: in illa autem efflatu, in asperam arteriam inspiratu, in gulam deglutitione feruntur, quæ ipsi, vel ventriculo, vel hepati, vel lieni, vel tenuibus intestinis, vel venis mesaraicis, atque adeo toti corpori per venas & hepar coniuncto cum ventriculo salubria esse volumus, ut in crassa intestina per sedem, in capacitatem vteri per collum vteri, in vesicam, per meatum urinarium, in sinibus caueriosis & fistulosis pro cuiusque figura, situ, & connexione iniectiones fiunt nunc hæc, nunc illæ.

Quæ hepatis foris imponuntur linimenta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, sint latiora, quam lieni, quam alteri reni: minora

minora quàm ventriculo, & ventri reliquo.

Quę capiti magno epithemata, cucuphæ nobis dictæ, vel emplastra, vel alia remedia applicantur, sint maiora quàm paruo: & quę cruri circumponuntur maiora, quàm tibiæ: & quę sedi imponuntur pertusa cornua (cannones buxeos vocamus) in puero minora sint: & pessus in recens foeta, quàm in grauida sit maior.

Clyster largior magno, vacuo, quàm paruo & pleno, siue ab hydrope, foetu, stercore, siue à flatibus, cibo, & aliis. Item parciore vtero & vesicæ iniectio fiat, quàm intestinis, quàm ventriculo: etiam potio immittitur, nisi recens foeta sit mulier.

Quæ partes sensu tactus carent, vt glandulæ, ossa, cartilagines omnium remediorum vim ferunt etiam causticam sine dolore. Quæ sentiunt, qua parte magis sentiunt, vt dens interior, musculi caput & tendo, oculi cohærens tunica, os ventriculi, palma manus, & internum digitorum: hæc mitiora postulant remedia, & minus mordacia, quàm si affectus est in alia ipsarum particula minus sentiēte. Et qui sunt delicati, mulieres, pueri mitiora postulant: rustici, fossiores, baiuli, nautæ valentiora in simili affectu remedia ferunt, siue sumenda, siue admouenda, facienda, educenda sint.

Morbus

Morbus calidus alia , quàm frigidus: humidus contraria quàm ficcus remedia postulat: & calidus primo recessu alia, quàm calidus secundo aut tertio aut quarto: & intemperies sola solis alterantibus pariter contrariis corrigitur, quæ verò cū materia est, illius quoque vacuationem ad sui curationem indicat. Intemperies simplex alia quàm composita, & pro vario compositionis modo aliis atque aliis remediis utendum, & recetibus alia sunt vsui, alia veteratis. Præterea modus est alius sanandi intemperiem, alius incommodationem, alius vnitatis solutionem, & in quoque horū genere modus alius, atque alius utendorum remedium pro varia horum specie. Aliter enim fracturam curamus, aliter vulnus, & vulnus recens aliter quàm vetus, & simplex aliter quàm cauum, & sordidum aliter quàm purum, & æquale aliter quàm cauum, & putridum ac malignum aliter quàm salubre. Intemperies sublimis mitiora requirit remedia quàm profunda, vlcus, aut tumor superficialius ad motis remediis idoneis cedunt. Interna etiam sumptis ægrè vincuntur, vlcus intestinorum, vteri, viarum vrinalium, oris: & aliarum partium præhumidarum, & calidarum immodicè ægrius vincuntur. Vl-  
cus etiam rotundum haud temerè ad cicatricem

tricem peruenit, fractura in modum raphani ægrius alligatur, sinus ægrius curantur, quàm alia vlcera. Magno vulnere non sufficiunt vt paruo partes commissæ & deligatura, sed ferè futura aliqua opus est. Magnæ phlegmonæ si non sit sanguis missus, & remedia alia idonea sint adhibita, superuenit gangræna & sphacelos. Magnus dolor dentium, coli, & aliarum multarum partium vires deiicit, & sæpe est lethalis. Magna febris seu quia est acutissima, seu quia actiones principes multum prosterнат, ferè est lethalis, & extremis exquisitè remediis eget. Achoribus, alopeciis, cephalalgis, & aliis affectibus veteratis, ob id sanatu difficilioribus valètiore opus est remedio. Febribus diuturnis vel aliis affectibus natura longis, post coctionem etiā clementiora remedia sufficiunt, ob id quotidianas & hecticas initio blādè tractandas imperat Galenus, veteratas etiam solus aer vernus aut æstiuus persanat. In delicatis tertianam exquisitam pleniore victu curat Galenus, in aliis si vires valēt, tenuiore. Iisdem purgantium vim liquori delicato transmittimus, eum colamus, saccharoq; & vulgari cinnamomo condimus, aliis ipsorum substantiam totam exhibemus: assuetos vni purgantium generi aut formæ ad vtēdi modum

*Lib. 1. ad  
Glaucō-  
nem.*



dum alium trahimus. A medicamentis ab-  
 horrētibus ea iusculis incoquimus, aut ali-  
 ter alimēto, vel re iucūda tegimus, ne pur-  
 gari se cognoscant, priusquam facta iam sit  
 vacuatio. Sic phlebotomen formidanti ve-  
 latis oculis secamus, aut aluū largiū deici-  
 mus. Quibus partes infernæ laborant, pur-  
 gationes supērnas si faciles iis sunt, & con-  
 suetæ imperamus: cōtrà quibus aliqua su-  
 periorū pars laborat, vt tabidis, cephalalgi-  
 tis, deiectiones molimur nō vomitus. Qui-  
 bus ventriculus est imbecillus, adeò vt me-  
 dicamentum ferre nequeat, vel antè robo-  
 ramus, vel acri clystere vacuamus. Fluen-  
 te aluo immodicè ad vrinas, sudores, vom-  
 itus retrahimus: obstructo hepate, liene, reni-  
 bus, aut inflāmato, aliis atque aliis vtimur  
 medicamentis pro causarum ratione. Nam  
 si multum excrementum est, secta prius ve-  
 na si omnia consentiunt, postea clementer  
 purgamus: si crassum, tenuamus, si lentum,  
 incidimus, & tergemus, potionibus, apoze-  
 matis, electariis, id genus aliis.

Senes, spadones, & multæ mulieres, & qui  
 alij gulà sunt angustiore, catapotia etiam  
 orobi magnitudine ægrè deuorant, portio-  
 nem facilius. Florentes atate, genus o-  
 mne medicamenti quauis propè forma  
 sumunt, nisi proprietas naturæ obstat, aut  
 à me

à medicamentis offensi ipsa refugiant.

Quomodò consuetos labores faciliùs ferimus, etiã si imbecilli simus ac senes, quàm non consuetos; sic & medicamēti formam nobis consuetã faciliùs toleramus, quanuis ratione ac minùs sit efficax, vt pote nobis iam tempore familiaris reddita, vt imbecilibus venam cubantibus Medici secant: sic imbecillis mitiora & forma maximè iucunda exhibent medicamenta. In robustis minùs sumus solliciti de viribus medicamēti & de forma.

Potiones hyeme calidas imperam⁹, æstate frigidas, nisi affectus aliquis repugnet, vt vētriculi intemperies illic calida, hīc frigida. Aestate capillum audenter tondemus & radimus, cū affectus postulat: hyeme vix audemus, nisi vrgeat morbi magnitudo.

Cathēretica in hyperfarcosi larga adhibemus, eadem summa specilli lata parte puluisculo parcissimè vlceri cicatricetergendo inspergimus. Valentia purgantia vstionibus, lorionibus, trituris, aliorum mitionibus meliora efficimus & salubriora, exhibem⁹que cum his quæ viribus eorum obfistunt.

Cauistica cū adhibemus, vndique munimus cera, vel alio, ne vis eorū lati⁹ serpat. Galbanum medio emplastro im-

nimus, quando ad eam partem quam ipsum tanget, largius trahendum est.

Crassiora medicamenta vt emplastra, quia phlegmonas sua duritie ledunt, aliquo aptiore liquido molliamus, & liquidiora missis crassioribus corpulentiora reddimus, vt diutius hæreant.

Quorundam ex prædictis scopis ad modum vtendi medicamento obseruandis exempla aliquot ex Galeno maxime proferamus: nam omnium fuerit prolixius, & fortasse parum vtile.

Pilos auferimus vel nouacula, vel psilothro à parte, cui emplasticum medicamentum imponimus, & à toto corpore in picatione ad renutritionem, aut picationem inter duo lintea facimus, vel picem oleo aut butyro, aut simili minus tenacem reddimus.

Pueris, eunuchis, mulieribus & cæteris cute & carne molli præditis, digerentia adhibe mediocria, si ex corpore illorū, vt ex cute capitis in alopecia dissipandū est: ex talibus enim prauis humores facile discutuntur. In vlceribus eorundem medicamenta morsu carentia vtenda sunt: hæc enim vel sine molestia omnino agent, vel nihil nocent. Quæ verò parem noxam commodo afferunt, non sunt tentanda, vt quæ po-

*Lib. 1. cō.  
ph. par.*

*Ibidem.*

lypodas efficaciter purgant, si eos exacuunt non sunt adhibenda. Multo minus quæ plus nocent quam prosunt, nisi noxa sit corrigi facilis: ut noxa ex balneo, frigide per calfacientia in hecticis mox tollitur.

*Libro 10.  
method.*

*Li. 1. ant.*

*Li. II. sim.*

Antidota ante delecteria parua quantitate semel quotidie sufficiunt: post illa verò quadrupla aut quinupla, & bis quotidie sunt sumenda. Id quod etiam ad modum medicamenti refero, ut Galenus semel aut bis, aut frequentius cibum dare in morbo retulit. Aph. 17. lib. j. Sic Aeschrius moris nuper à cane rabido dabat cochlearium magni pulueris. vstorum cæcorum, iam diu moris cochlearia duo quotidie.

*Libr. 1. cõ.  
ph. part.*

Cum singulis medicamentis validis utimur, initio clementiora ipsa offeremus, mitis his quæ vim eorum validam obtundit, ut oleo, cera: cum autem imbecillibus utimur, ut thure, amygdalis amaris in alopecia, post usum primū & secundum, obserua affectū à medicamēto in corpore relictum, pro cuius varietate medicamēti vires vel augēbis vel mitigabis. Valētissima igitur non statim ab initio adhibenda, sed à mirioribus incipiendum est, nisi affectus sit maximus.

*ib. 2. cõ.*

*ba. par.*

*idem.*

Quoties simplicia aut composita facultatibus contraria miscemus, initio parum eius quod est generosius miscēdum, secun-

do

do & tertio usu augendum, si successerit: ut in diuturno capitis dolore ab intemperie calida, cum spiritu flatuoso, in primo transgressu ad calida polygonium cum pauca ruta vel serpillio miscendum.

Plethorico corpore in arthritide sanguis primum mittatur, mox deinde fiat purgatio. Ex successu remedij loco affecto prius admoti vel etiam sumpti cōiecta an eodē sit, perseverandum, vel ad aliud transeundum consilio Hippocratis, Aph. 52. lib. 2.

Quæ sunt polychresta: id est, multi usus *Lib. 3. cō.*  
seu multis simul partium aliquarum, ut aurum dispositionibus, ac commoda medica- *ph. part.*  
menta, neque multum opitulantur, neque obsunt, si perpetuo ipsis utamur.

Quæ verò uni tantum dispositioni conveniunt, illam optimè curant, alias interdum præterquàm quòd nihil iuvant, etiam exacuunt.

Medicamenta media omnibus partis dispositionibus conveniunt, tamen his quæ *Lib. 4. cō.*  
leviora aut valentiora requirunt, neque bonum neque malum magnum afferunt. *ph. par.*

Ob id polychrestum, id est ad multas dispositiones utile medicamentum nullum potest optimum inueniri, sed quod singulis est proprium, id melius est.

Polychresti autem compositio utilis est *Lib. 8. cō.*  
*ph. part.*



ei, qui vnum medicamentum ad multos affectus mediocriter idoneū habere cupit.

*Lib. 4. cō.*

*ph. par.*

*mtio.*

Partibus laborātibus vt capiti, oculis topica ne adhibeas, nisi vacuato prius toto corpore per phlebotomā, purgationem. In oculis autem etiam caput prius per apophlegmatismos vacuandum est, errhina enim ad oculos trahunt. Quod si emplastica oculis prius adhibes, vehementem excitant dolorem, dum fluentem materiā extra vasa vacuari prohibent, ob idque tunicae horum distenduntur ob copiam affluentium humorum, & nonnunquam rumpuntur vel eroduntur. Nec solum his vacuationibus oculum, vel aliam parti idoneam ad curandum reddimus, sed etiā reuulsionibus, vt in oculo primum ad inferiora corporis: deinde ad occiput & cutim capitis: interdum & in his arterias incidimus transuersas post aures. Post hac genitam in tunicis oculorum dispositionem curamus, quæ etiam bonum sanguinem affluentem per venas in

*Lib. 4. cō.*

*ph. part.*

oculum corrumpit. Curamus autem per desiccantia sine morſu humorem in oculo noxium, qui quod influit corrūpit. Astringentia autem nec siccant eiusmodi dispositionem, & mordacis saniei effluxum cohibent: acria verò & mordacia succorū qualitatem augēt: laxantia & digerētia vacuāt

qui

quidem hanc saniem, vlcus autem cicatrice non tegunt, nec affluxum reprimunt, vt nec coquētia thus, crocus, myrrha, quamuis dispositiones coquere non mediocre bonum est. Acida & amara rodunt, & tales dispositiones exacuunt, & his magis nitrosa, salsa, austera: sola igitur medicamēta rosionis expertia sanant vlcus cum acri fluxione, longiore temporis spatio vitiosum affectæ partis humorem consumentia: vt collyrium libianum, quod Paulo libanium dicitur, cygnus à colore albo, ex multa cerusa Rhodiana, terra Samia, amylo.

Per tempora inorborum varia dantur remedia, vt per initia phlegmones, & vehementes influxus austeriora, per statū dolēte multum phlegmone mitigatoria, laxantia, coquētia. Quod si aliquid phlegmones reliquum durefcens & solutus contumax euaserit, à repellentibus ad digerētia paulatim est transeundum. Si verò habes medicamentum vnum excellens, vim eius exolue misto alio: si imbecillum, intende.

Oleū lētiscinum recens in vase duplici est tepesciēdum, ad sedandum dolorē phlegmonarum in gingiuis, tunica linguæ, cure totius: quia citra molestiam & asperitatem repellit, quam habēt plurima austera, & citra rosionem discutit.

*Lib. 6. cō.  
ph. part.*

- Lib. 1. cō.*     *ph. part.*     *locis va-*     *riis.*     *Ibidem.*     Assidua fiat rasura in alopecia ante medi-  
camenti impositionem. Rasa cutis nitro-  
tergitur ante digerentium applicationem,  
postea cutis derafa fricatur linteo subaspe-  
ro, aut foliis fici, vt per rarefactam eam ad  
radices imas pilorum melius penetrēt me-  
dicamenta humorem prauum digerentia.  
Medicamentum in alopecia metasyncriti-  
cum, id est, ex alto euocans, admoue in aëre  
calido, & si potes in sole æstiuo: hyeme au-  
tem in laconico.
- Lib. 2. cō.*     *ph. par.*     *i. fine.*     Ceratum Gal. *Ἀνὶ ὑποφθίου* in hemicrania  
frigida veteri, aut ischiade frigida ante  
balneum semel illitum statim affectui me-  
detur, sic vt æger sanus post balneum om-  
nino euadat.
- Li. 8. met.*     Capiti ab æstu immodicè calenti ( vnde  
febris diaria nasci solet ) rosaceum niue re-  
frigeratum ex alto per hapsum lancæ impin-  
gitur.
- Lib. 2. cō.*     *ph. par.*     In dolorificis capitis dispositionibus ca-  
lidis aut frigidis sed diuturnis remedia ad-  
hibentur idonea, emplastri vel cerati modo  
confecta, capiti derafo: liqda verò eadē cōso  
ad cutim, seu breuissimos habenti capillos.
- Lib. 3. cō.*     *ph. part.*     In dolore aurium ex inflāmatione vehe-  
mentissimo, opium æquali portione castorij  
multò ante vsum miscendum est, vt vis eius  
frangatur: ambóque sapa ex musto sunt  
disso

dissoluēda, quia dolores magis lenit, quàm vinum dulce.

Si quid auribus infundēdum est supinis, liquore idoneo resoluatur in cōsistentiam, quæ per auricularem clysterē immitti possit, vt trochiscus ex opio & castorio cum sapa coactus, sapa dissoluatur. Castorium per se bene tritū cum opio in sapa dissoluto misce, & fac pastillos, quos tempore vsus sapa resolue ad eā consistentiā, quæ per otēchytē, id est, auricularium clysterē in aures phlegmone detētas possit infundi, vel potius specillum lana mollissima inuolutū liquore prædicto mersum in aurē dolētē blādē immissum eas foueat, & liquore sensim demittat, & cetera. Quæcūq; applicātur auribus & oculis, vt lac muliebre, albumina ouorum, mediocriter calfacta esse oportet.

*Ibidem  
initio.*

*Lib. 3. cō.  
ph. par.*

*Initio lib.  
3. c. ph. p.*

Pastillus & collyrium diaglaucii & diacrocū ex aceto in cote medica lauigatis & calfactis auri infundendus est.

In vlcere aurium glaucium ex aceto infundendum: si verò cum fluxione sit, aut pure, pastillus primū Polyidæ, post hūc Andronis, deinde Bithinus. Cui similis est, aut etiam melior pastillus Galen. diachartu, vt à leuioribus incipiamus.

Ad dolorē dentiū remedia in aurē lateris nunc dolentis, nunc oppositam infundit

*Libr. 5. c.  
pha. par.*

Archigenes. Auris initio prius tergendā, ne pinguedinē habeat, quā infundas medicamentia narcotica, reserantia, coquentia laxantia, digerentia.

Quæ auribus instillatur, mellis aut mellis tenuis habeant spissitudinem, siue ex sapā, siue ex aceto, melle, vino Cretenſi, mulſo, lacte muliebri, albuminibus, sanie expressa ex carne bubula parum super prunas affata Asclepiadi, succo perdicij, marrubij, conizæ, cæpæ, porri, spondilij infundantur. tepida autem sunt infundenda.

*Lib. 3. cō.  
ph. part.  
Ibidem.*

In nares etiam pulvis continenter potest inspirari polypo vel ozæne idoneus, quia perpetuo humorum affluxu eluitur, quomodo & in lippientibus oculis.

Linamenta & spongiæ, & alia quæ naribus sanguine fluentibus inmittuntur, lino per acum dato deliga, ut retrahi possit.

*Lib. 4. c.  
ph. par,*

In quibus oculorum collyriis astringentia præpollent, copiosissimo liquore opus est, paucissimo medicamento astringente, præsertim si id astringens est metallicum.

In quibus verò collyriis eorundem crocus, myrrha, castorium, thus, lycium superant, crassiore medicamento utendum est.

Quæ moderatè influxus in oculum repellunt, ocularibus remediis indita iuuant: quæ verò vehementer repellunt, dolorem



augent, tunicas exasperando magis quam influentium impetum reprimunt. Vtilissima igitur lippitudinibus & aliis omnibus in oculum defluxionibus, vlcerebus, pustulis, quæ modicè astringunt, vt rosarum folia, flores, succus, ericæ fructus, spica nardi, crocus, lycium, hypocisthis. Eadem medicamentis visum acuentibus mista contrahendo & constringendo oculorum substantiam iuuant.

Collyria oculorum in coribus nonnullis terunt, ex mammis lac boni succi instillant, vel liquorem tenuem oui, vel si vlcus est decoctum fœnigræci: id enim nonnihil terget, liquor oui nihil, lactis ferosi pars magis, sed cum morfu, ob id noxia. Nam quæ vlcera replent, tergent sine morfu.

Quæ oculis adhibentur, exactè trita esse oportet, & horum quædam inuersa palpebra specilli parte lata illinuntur. *Libro 3. metho.*

Oculi inflammati foueantur decocto meliori & fœnigræci ex spōgia semel aut bis in die, si parum dolent: si multum, ter, quater, præsertim longis diebus æstiuis. Quædam horis omnibus adhiberi possunt, vt xerocollyrium Galeni. *Libr. 4. c. pha. part.*

Phlegmonæ oculi albumen oui crassum & lentum sine morfu est anodynum, & diu adheret. Si in ictero oculi manent palli- *Initio lib. 9. c. ph. p.*

di reliquo corpore perfanato, trahere in balneo naribus cochlear vnum aceti acerrimi, & multum biliosæ substantiæ defluet. Quia ex naribus, gutture, gula facile medicamenta ab humoribus per has partes descendentibus ex cerebro vel aliunde eluuntur, continuè sunt applicanda collyria liquida, vel sicca stomatica, vel stomachica, vel arteriaca, siue ozænas, siue polypos, siue vlcera narium, vel etiam alios dictarum partium affectus curas.

*Lib. 5. c. v.  
pha. p.*

Datis apophlegmatissimis vel à dente trahentibus medicamentis, ore hiet æger, & deorsum spectet, vt post medicamentum usum humor facile defluat.

*Initio lib.  
7. c. ph. p.*

Si affectus est in aspera arteria, vel musculis laryngis, vt lassitudo motoria phlegmonodes ex vociferatione, siue sumuntur cibi, vt lac, amyhum, chondrū, oua: siue arteriaca & hypoglottides eiusdem cum arteriacis facultatis, vt, ex vino thereo, gūmi, tragacantha, glycyrrhiza, lenta sint & emplastica, vt partibus quas attigerint, hæreant, asperitates læuigent, reliquias inflammationis coquant & perfanent: tuncque medicamenta linguæ subdita dum paulatim liquefcunt, larynx quod in eam defluit, excipiat, æger autem oborienti tussi resistat, & se cōtineat, vt medicamentum aliquid in laryngem & arteriam deflu

defluat. Eclegmata quoq; vt decoctum hyssopi, ireos, ficum, nucleorum pineorum sorbeimus, vt cum inspirato aëre etiam portio decocti in asperam arteriam trahatur, aut id calidum quantitate parua dum faucibus continemus semisupini, aliquoties inspiramus, aut paulatim deglutimus salivæ mista.

Stomaticis tribus modis utendum est in laxata vna: primò cum aqua præsertim per initia, vel cum mulla, vel cum chylo, & cremore prissana. Secundo modo medicamentum stomaticum purum, vel digitis vnae illinendum est, vel cochleari attingendū & apprimendum. Tertio vnam foras ad linguam educendo, id quod maxime confert, vt abscedat à rectitudine, quā vt plurimum ad fauces habet.

In affectibus partium oris, vt inflammata aut laxata columella Asclepiades per fistulā expirat, & flādo expellit medicamenta in partem affectam, aut inspirari iubet. Quod merito damnat Galenus, nam bona ipsorum portio in gulam & asperam arteriam delabitur. Præstat igitur ficcis columellam ex cochleario attingere.

Si ulcera sordida in ore puerorum tãgis medicamento valente, specillo lana inuoluta in medicamentum intincto tangatur  
pars

*Lib. 6. cõ.  
pha. part.*

*Libr. 4.  
metho.*

pars, ita tamen figurato puero, ut non deuoret: post collue decocto lentis aut rosarum mellito: ut in vlcere intestinorum crassorum clystere iniiciuntur medicamenta ei vlceri idonea: in vlcere ventriculi bibuntur: in vlcere tenuium, vtrinque dantur: in vlcere gulæ non semel, nec totum simul sumendum, sed paulatim & assidue. Nam ex transitu & contactu his vlceribus, utilitas accedit, non ex continendo & diutius adhaerendo, ut ventriculi vlceribus: tamē crassiora & glutinosa ex gulæ figura & situ facere ea didicimus: hæc enim cibi & potus est transitus: ob id medicamentis æger, quæ hæreant, vndique quasi concregant & agglutinentur, non quantur & defluant promptè. Crassa autem promptè concregant, lentè agglutinantur, ob id his tragacantha & gummi miscentur.

*Ibidem.*

Vlceribus gulæ & cæteris internis adhibentur hypocisthis, malicorium, balaustrum, cytinus, acacia, succus rhus & rosarum, asfer fumus, sigillum lemnium, & cætera vlceris interdum sanantia, & nullam noxam inferentia visceribus. Dantur autem ex decocto summitatum rubi, myrti, vitis, lentisci, mali cydoniorum, vel vino austero, si phlegmone absit. quæ si vlceribus gulæ applicas, gummi misce, & tragacantham.

Purgantia damus nunc potione, cum celerio

deriore & parciore vacuatione opus est, aut  
cū in alios meatus facienda est vacuatio,  
vt mox in hieræ exemplo audies: nunc bo-  
lo, vt vocamus, cū diutius ventriculo im-  
morari medicamentum volumus, vt minū  
sit vomitorium quibusdam, vel à longin-  
quis plus attrahat: aut catapotiis, cū diu-  
tissima in ventriculo mora opus est. Alia  
item forma aliis multis de causis damus, vt  
in compositis patebit, & ante hæc ac post,  
vino vel alio liquore grato os abluimus, vel  
anisum conditum, vel rhodofacchar, vel si-  
mile sumimus, & illa tegimus vmbra, vase  
denso, foliis auri, carne & cute fructuum  
coctorum, pane azymo: siphone etiam præ-  
longo fauces attingente quidam sic deglu-  
tiunt, vt linguam saporum indicem nec at-  
tingant, nec afficiant.

Sic hieræ picræ drach. vna Asclepiadi vel  
Galeno cū aquæ cyathis quatuor sine mel-  
le, quia stomachum evertit, datur tardè co-  
quētibus, aut vomentibus, aut aliter fluen-  
te vētriculo afflictis: & cū declināt phle-  
gmonæ internæ aut cū vis mouere vrinā  
vel mēses cū hydromelite, aut potius cum  
vino, aut potius cum œnomelite. Sic enim  
ex ventriculo eius distributionem iuuabis  
& delationem ad vrinas, & quæ vtero inhæ-  
rēt, dissolues & incides, & robur addes par-  
tib



*Lib. 8. cō.  
pha. par.  
Ibidem.*

tibus, per quas tráfitur, & calorem partium  
per quas fertur, augebis: qui etiam multum  
confert ad fundédum & vacuandú humo-  
res inhaerentes. Ex quibus apparet magni  
interesse, quæ medicamenta cū quibus su-  
mantur vel admouéantur. Ob id in usu aste-  
ris stomachici liquorem dispositioni cōue-  
nientem requirit Asclepiades. Asterē egre-  
giū in cephalalgia fronti idem illinit cum  
aceto: ad aurium verò dolores perdicij suc-  
co diluit: ad sanguinis eruptionem, cum vi-  
no myrteo: ad sanguinis screatū, dysente-  
riam, choleram, cū succo Polygonij: ad tuf-  
ses, cum vino Thereo aut passō: ad phthises  
& empyemata, cum succo marrubij: ad ser-  
pentis ictum, cum rutæ decocto: ad menses,  
cum succo arthemisiæ: ad stranguriam &  
vulvæ strangulatum, cum mulso: ad arthri-  
tidas, cum decocto gentianæ.

Sic emplastrum diachalciteos ex contra-  
riis compositum, ut in cōpositis audies, ul-  
ceribus glutinandis & cicatrice regendis, &  
phlegmonis curandis accommodū redditur,  
aliter atq; aliter factum & liquatū. Si enim  
phlegmone magnum parti dolorem affert,  
oleum & adēps recentia sint magis blanda  
& mitia: eadem vetusta minis dolenti &  
diuturnæ phlegmonæ conveniunt: hæc que  
quò diuturnior & contumacior, hoc magis

vete

vetera illa profunt & sola curāt, modò amplius nihil affectæ parti affluat: si quid verò affluit, compositum diachalciteos conuenit mista facultate præditum digerente quod influxit, & repellēte quod influit: pauca verò phlegmonæ sunt diuturnæ, quibus nihil affluat, cum diutinæ esse soleant ob affluentes in ipsas humores. Cùm autē phlegmonæ incipiunt, & augentur, refrigerantium & astringentium virtus præpolleat, emplastrum igitur tunc soluatur vino vel aceto, vel aqua, vel oleo crudo, vel Hispano, vel Histrico, vel, si validius erit astringendum, myrteo & melino, vel dulci aliquo, vt sit anodynum.

Phlegmonarum in artubus initio spongia imponitur ex aqua frigida, vel ex oxycrato: phlegmonis autem hepatis calida applicanda, melinū, myrteum, mastichinum, nardinum, lenriscinum, absinthites, & cataplasma item calidum.

Phlegmonæ irritātur à duris, qualia sunt multa emplastra: nisi hæc oleo vel alio simili molliantur.

Quāuis astringentia etiā sola phlegmonas initio iuuent, id quod influit repellēdo, & etiam interdum aliquid humoris in parte inflammata contenti exprimendo ad venas particulam nutrientes, tamen quod va-

*Libr. 13.  
metho.*

*Ibidem.*

*Libr. 5. c.  
ph. p.*

leut

lentius astringit, tātū abest vt phlegmonas iuuet, vt etiam dolorē partibus inflammatis intendat eas velut contundendo, & substantiam earum violenter contrahendo: sic valenter digerentia sua acrimonia quid erosioni simile in parte excitant. Quæ verò modicè digerūt, augmento phlegmonarum & statui conueniunt, dolorēq; leniunt: moderatum igitur vtrunque est præstātius quàm immoderatum. Tamē si dētes dolent citra gingiuarum phlegmonen, siue in ipso corpore dentis, siue nervo sit causa doloris humor aut flatulentus spiritus, medicamētis acerrimis opus est, siue repellere, siue digerere causam doloris libet. Ob id plurima ipsorū ex aceto acerrimo parātur.

*Libr. 10.  
metho.  
Ibidem.*

Ceratum Galeni refrigerans nō maneat super ægram partem, donec manifestè incalcat, sed assiduè subinde mutandum: imponendum autem parti primò affectæ & refrigeratione egenti, vt cordi, hepati, renibus, non autem toti thoraci propter cor, nec toti ventri inferiori propter hepar vel lienem vel ventriculum, ne partes refrigerationem non postulantes, tamen refrigeratæ cogant te ante tēpus à refrigeratione partis primò affectæ cessare.

*Li. 11. metho. & c.  
21. libr. 5.  
simpl.*

Ad vētriculi & hepatis robur absinthii ponticum oleo incoctum est salubre, nisi à calor

calore & siccitate laborent, quia qualitas absinthij amara prait, & viam astringenti facit.

Contra morbum, qui generosè ex arte *Li. 11. me* pugnat, terminus ei sit, vt tutò medicetur ei *thod.* vero, qui dolorem mitigat, virium totius aut partis custodia terminus est, cum vrendum est narcoticis, præcipuè in calido corpore & affectu: nam in crassis & glutinosis succis alienissima sunt narcotica. Oleum quia tedium affert, post actionem ab eo editam tergendum, lib. 8. in diarjæ à stipatione, curatione in bilioso homine.

Oleum phlegmonis oculorum vel oris *Li. 12. me* non infunditur: infunditur rosaceum etiam *thod.* cum aceto phlegmonis incipientibus aurium non oculorum. Contra diamorū & stomatica alia oris phlegmonis incipientibus *Li. 13. me* conueniunt, nō aurium vel oculorū, quan- *thod.* tūm genere sint ex his quæ indicantur.

Fornēta & penicilli, & alia id genus ven- *Lib. 8. me* triculo & stomacho abundè calētia impo- *thod.* nantur: nam tepida vētriculi firmitudinem dissoluunt.

Neruis vulneratis aqua calida est inimi- *Lib. 6. me* cissima, cum præsertim eorū substantia ex re- *thod.* frigerata concretaq; humidiorē materia sit condita: omnis enim talis cōstitutio per ea quæ simul calfaciunt & humectant, resol-

uitur ac putrescit.

*Lib. 8. method.* Vnguenta vt nardinum ad roborandum fomento ventriculum & stomachum, soleo calcacere in vase duplici utiq; cōiecta prius in vas maius aqua feruente: nam aliter calfactis vitiatur eorum facultas.

*Lib. 9. cōph. part.* Vteri, & vesicæ vlcera iisdē medicamētis siccantibus egētia, requirūt prētereā instrumenta quæ intrò ea liquore aliquo soluta transmittant, vt crocum, myrrham cū succo plantaginis vel simili mistū: siphonibus, aut catheteris, aut metrenchytis infundimus.

*Lib. 1. cōph. gene.* Vlcerebus quæ ad cicatricē veniunt, multis consequenter diebus pharmacum epuloticum immanere debet, quò melius & citius ita cicatrix ducatur. Ob id medicamentum ex aqua & oleo copiosiore & lithargyro coctum donec liquetur & alteretur: tam sit glutinosum, vt ne à lotis quidem decidat. Vtile autem est epuloticum teneris corporibus, pueris, mulieribus, grādiōribus, cute cā dida mollē corporis habitum testante præditis, si vlcera habent parua sed praua, & dysepulota ob vitiosum ipsorum succum.

*Lib. 2. cōph. gen.* Sinibus implendis emplastrum diachalciteos, vel aliud idoneum oleo largo solutum, per cornu rectā perforatum cum vesica porcina clysteris modo infundendum. Extosaceo autem soluatur, si parua phlegmones



mones suspicio adhuc adfit: si paulò latius est foramen sinus, clystere infundendum, vtendúmque piulcis, id est, pus attrahentibus instrumentis, quales sunt nostre clysterum syringes. Quæ enim sunt substantia crassiore, vt emmota, infundi sinibus nequeunt. Contrà in superficie caua vlcera crassioribus egent medicamētis, quòd liquida statim defluunt, & linamentum siccum relinquunt. Ob id in iis ceratis validè tergetia miscetur in sinibus oleo, vt dixi, largiore soluantur.

*Ibidem.*

In sinibus item & fistulis splenium excinde, vt excernendo humori liber sit exitus: hic enim mora in parte eam exedit, & vim medicamenti obtundit. Eadem causa cannulatas turundas, hoc est, pertusas, ex solidiore aliqua materia penna, plumbo, argento, auro, iisdem immittimus, vt puris emissarium perpetuò sit liberum. Vbi vlcus erit penitus repletum & planum & æquale, nec quicquam illi cauum manebit, ipsis vlceris oris specilli mucrone imponendum siccum epuloticum medicamentum: super reliquum linamento dato, quòd imbutum sit aliquo medicamento consistentia humido ex his quæ cicatricem inducunt.

*Ibidem.*

*Li. 13. method.*

Eòdē pertinentia exēpla perquam pluri-

ma potest proferre, qui vult ex libr. 3. 4. 5. 6. Methodi, vt exempla rectè vtendi medicamentis intemperaturas curantibus, & morbos partium organicarum proprios ex libris aliis Methodi, & lib. compo. ph. part. & gen.

*Lib. 10. c.  
ph. par.  
& alibi.*

Repellentibus initio chiragræ & podagræ vt aliorum affectuum à fluxione pendantium vtimur: ischiadis autem initio vt pleuritidis mitigatoriis non repellentibus, quia sanguinem ex vasis ambientibus & musculis in ischion & thoracis partem affectam protruderent.

*Lib. 9. c.  
ph. part.*

Ambientis temperatura rectiorem quorundam medicamentorum usum facit, ob id prius alopeciiis medicamenta docuimus adhibenda in aëre calido, vt sub sole æstiuo, vel hyeme in laconico. Item in ictero oculorum acetum in balneo naribus trahendum, & psilothra in balneo tentanda. Quæ res magni est momenti, vt apertis à calore poris, humores ab eodem liquati promptè trahantur.

Emplastrum liquidum ex farina fœnugræci, sinapi, māna thuris, myrobalanu pyelmate, spuma nitri, oleo cedrino decocto, applicatur lieni scirrroso, quandiu id pati potest: deinde in balnei solium ducto homine fascia in aqua soluitur.

*Ibidem.*

Malagma ex fœnugræco, calce viua, ni-

tro, melle impositum lieni scirrroso aut ischiadi, donec mordeat, si tunc ductis in balneum auferatur (alioqui ægrescerent) sani balneo exeunt. Archigenes apud Galenum.

Herbæ iberidis (quam nonnulli lepidū vocant, alij nasturtium syluestre) radicem tusam adipe suillo excipe, emollitā emplastri modo applica ischio ad horas tres, deinde ī balneū dimitte. Eadē etiā verustos capitis dolores liberat vice sinapismi & thapsiæ.

Si in ictero oculi manent pallidi reliquo corpore persanato, trahe in balneo naribus cochlear vnum aceri acerrimi, & multum biliosæ substantiæ defluet. *Lib. 9. cō. ph. part.*

Medicamentū in alopecia metasyncriticum, id est, ex alto euocans, admoue in aëre calido, & si potes, in sole æstiuo: hyeme autem in laconico, id est, prima domus parte, quam stuphas vulgò vocamus. *Initio lib. 1. cō. ph. p.*

Ceratū Gal. dia euphorbiū in hemicrania frigida veteri, aut ischiade frigida ante balneū semel illitū, statim affectui medetur, sic vt æger post balneū sanus omnino euadat. *Lib. 2. cō. ph. part.*

DE LIMITATIONIBVS AD  
rectum medicamentorum & aliarum  
causarum salubrium vsum  
necessariis.

△ *logiquis* Latinis distinctio, limitatio, determinatio est, definitio ac declaratio.

*Libr. I. cō.  
ph. part.*

tio facultatis remediorū, cui affectui differentia, à qua causa, in qua natura, quo aëre idoneorum: citra quas cum quid absolute pronunciat Galenus, ad naturam temperatam in aëre temperato referri vult: ut cum scribis remedia ad achoras, id est, tineam, vel alios affectus, adscribe ad quales & quantos, & quo affectuū tempore illa sint salubria. Si vino quoque intus aut foris utendum erit, ad rem mergendam vel diluendam, quale velis distingue. Nam multæ eius differentia facultatibus etiam contrariæ, quanvis interdum ex scopo medicamenti potes vini genus inuenire, ut austerum, si astringendū: acre, si digerendum: sic in cæteris differentibus, aut virtutes contrarias habentibus, observa quem scopum medicamenti compositio habeat, ut scripta absolute & sine limitatione distinguas. Et in reliquis remediis similiter.

Porro limitationes ad rectè utendū medicamenti non mediocriter conducunt: neque sunt recipiendi, qui medicamento- rum vsus citra distinctiones scripserunt, dicentes: ad dolorem idoneum est hoc medicamentum, non addentes, à qua dispositione & causa ortum dolorem intelligant.

Rectius hi qui dispositionē, doloris causam exposuerunt, ratione nixi: vel etiam experiētia, quæ signa euidenter apparentia se-  
qui

quiritur: qualia in oculo dolente fuerint affluens sanguis largus, paucus: rodens, rofionis expert: rubor maior, minor. Venæ plenæ sanguine multo, paucos, sed vaporesco.

Phlegmones oculi rumor, maior, minor.

Colore eius præter naturam varius. Lipitudo in angulis oculi crassior, tenuior: largior, parciore, seu maior, minor. Dolor, & doloris species ab ægro nobis declarata, tēsius, rodens, pulsatorius, cōprimens, & contrahens, & quassans, & contundens.

Non manifestè verò apparet, an internis vel externis cranij partibus fluxio fiat, multò minus an per venas, vel per arterias: ob id distinctiones ab his sumptæ parum sunt efficaces. Specta igitur differentias dispositionum dolorem excitantium, secundum quas scribendæ sunt tibi distinctiones, ut libro 13. Methodi in oculorum affectibus à Galeno scribuntur. Ad frigidas & pituitosas dispositiones, si albæ sunt: ad melancholicas, si liuent, & melancholici humoris malitiam prodant: ad calidas, & igneas dispositiones inflammatorias quidem, si rubent: erysipelatodes verò, si flauent: ad dolorem mediocrem, vehementem, tendentem, grauantem, pungentem, pulsanter. Ad vlcera simplicia, caua, plana, sordida, sinuosa, pascentia, phagadenica, chironia,



Telephia, cacoëthea, dysepulotica, cū phlegmone, cum erysipelate, vel sine his.

Ad aphthas albas, nigras, depascentes, citra depastionem, depascere incipiētes, & ob id multam saliuam reddentes.

*Lib. 6. cō. ph. parti.* Ad affectum quenuis incipientem, auge-  
scentem, vigentem, declinantem, exiguum,  
simplicem, mitem, magnum, mediocrem, ali-  
liis complexum, malignum, putrem.

*Initio lib. 2. cō. ph. p.* Qui cephalalgiae remedia citra distin-  
ctionem scripserunt, plus noxae quàm com-  
modi attulerunt his, qui fidē ipsis adhibue-  
runt. Cephalalgia enim omnibus non acci-  
dit ob vnam corporis dispositionem, sed ob  
plures causas, quibus singulis propria est cu-  
ratio. Aliæ etiā distinctiones ex particula-  
rum affectarum natura sumuntur: aliquan-  
do enim extra cranium, aliquando intra, ali-  
quando utrobique causa doloris est, aliquan-  
do in venis, vel arteriis, vel nervis, vel mē-  
branis, vel cerebro, vel cute, vel quibusdam  
horum, vel omnibus simul. Difficillimum  
igitur est locum affectum in his inuenire,  
nisi Medicus sit doctus, & multa ægrorum  
inspectione exercitus.

Species igitur affectus est explicanda, cui  
utile auxilium dicimus, siue ea sit morbus,  
siue morbi causa, siue symptoma, & in ho-  
rum trium singulis specialissimū est expli-  
candum,

candum, vt ad febres, bilioſas, melancholicas, pituitoſas, & à qua bilis alterutrius, aut pituitæ ſpecie ſint. Ad diariam à tali vel tali cauſa externa, niſi remedia ſint omnibus diariis communia, vt balneum aque dulcis in declinatione. Ad febres eaſdem clementes, recentes, vel malignas veteratas. Ad phlegmoneſ principium, augmentum, ſtatum, declinationem, in hoc vel illo corpore, in tali parte.

In infantibus, adultis, ſenibus alia atq; alia uſurpanda ſunt medicamenta, vt etiam reliqua auxilia. In pueris item, mulieribus, eunuchis, & cæteris molli carne præditis: vel contrà in agricolis, ſoſſoribus, nautis, baiulis, & cæteris duræ carnis hominibus hoc, illud vtendum adſcribas, quod ab ætate, temperamenti ratione, & virium, & à corporis habitu diuerſæ ſumuntur indicationes limitationibus exprimenda.

Frequenter vnica ſufficit limitatio, vt à tēpore, vt ad incipientes alopecias: ſæpe non ſufficit, vt butyrum benefacit parotidibus incipientibus: addendum enim eſt mitioribus, modicè dolorificis, paruum abſceſſum facientibus. Hiſ enim ſufficit butyrum, præſertim in molli corpore, vt pueri, eunuchi, mulieris, & reliquorum molli carne præditorum: nō ſufficit autem vehementioribus

*Lib. 3. cō.  
ph. part.*

cum dolore magno & pulsatorio, & cum vigiliis, & cum magno abscessu.

Distinctio etiam fuerit sufficiens, si dicas remedium ad capitis dolorē à tali vel tali causa vel affectu, & sine febre, vel cū febre. Item ad achoras incipientes, sine malignis corporis totius humoribus, aut saltem sine his copiosis, vel ad inueteratos cum copia humorum prauorum.

Quidam suis medicamentis limitationes adscripserūt, sed generales tantum, aut si particulares, non integras, & in quibus multas adhuc requiras: ut qui scripserūt remedia cū his titulis, ad aurium affectus, ad aurium dolores, ad vocem abscissam: & adhuc alij generalius, ad vocē læsam non significantes qua offensa, & à qua dispositiōe seu causa læsa vel abscissam vocem intelligāt: cum tamen quævis causa, & ab ea dispositio in corpore relicta, remediū flagiter sibi proprium. Scribendum ergo fuit ad aurium dolorem, gravem, pulsatorium, &c. à tali vel tali causa.

*Initio lib.*

*8. cō. ph. p.*

Ad stomachicos Andromachi & hīeræ limitatio est, sed confusa nimis: quia cum stomachicorum significatio latè pateat, nō addūt ad quos stomachicos sua remedia velint efficacia: ob id ea quibusdam prosunt, quibusdam nocent plurimum, ut cætera indistinctè scripta.

Est tamen quādo promptissimū est cuius  
in simpliciū facultatib<sup>9</sup> versato, & affectuū  
naturas callēti, dicere vim medicamenti ali  
cuius composui, etiā si eam titulo nō expri  
mat, & inuenire qualenā ex his vel illis indi  
stinctē scriptis qui partis huius dispositioni,  
& quali & quātā idoneū fuerit præsidiū,  
& quo tēpore: quæ qui ignorat, maximam  
sæpe noxā ex usu indistinctē scriptorum in  
fert. Quia tamē id discernere nō omnes pos  
sunt, neq; in omnibus possunt, commendā  
di maximē sunt, qui limitationes integras  
medicamenti nō solum generales, sed etiā  
particulares maximē adscripserunt. Inter  
quos primas iure meretur Herophilus per  
petuō iubēs, vt Medicus sciat, quæ, qualis, &  
quāta sit morbi causa, & quod cuiq; potissi  
mū sit remedium, vt singulis congruā cura  
tionē moliatur, lib. 3. cōp. ph. part. Non sunt  
recipiēdi, qui diminutē scripserūt, multo mi  
nūs qui absoluto sermone sine limitatione  
scripserūt, vt ad vlceratā arteriā, vel asperatā  
vel vocē abscissā aut raucī. Multæ enim pos  
sunt esse causæ vocis abscissæ vel raucæ, vt  
destillatio vet<sup>9</sup> à capite, empyema, rabes, vo  
ciferatio multa, īspiratus aēr frigidus, potus  
frigidior, raucitatis sunt causæ. Qualia pluri  
ma ī li. Archigenis, Herē. inuenias: & quod  
mireris ī li. Apollonij Herophilē, cū tamē  
Herop

Herophilus omnium maximè distinctiones cōmendavit: Appollonius autē eas alicubi sequitur, est vbi malè negligit, vt ad auriū dolorē cum scripsisset remedia, subiicit calida, frigida, humida, sicca, & omnibus propè secūdis qualitatibus diuersa, lib. 3. comp. phar. part. Debuit enim diffinire, cui auriū dolori, & à qua causa singula remedia sua sint vtilia. Sic enim scriptis indistinctè qui fidem adhibent, non mediocriter decepti agros plerunque offendunt. Ex quibus apparet, parum probandam medicamenti compositionem, nisi dispositio indicetur, in qua eo medicamento sit vtendum.

*Lib. 7. cō.  
ph. par.*

*Lib. 4. cō.  
ph. p.*

Sed ne fallare, omnibus citra iudiciū ne credideris. Nam multa medicamēta titulo magna promittunt, opus autem eorum interim nullū est, interim valde exiguum apparet, vt ad suffusiones disterendas myrrha, stacte, & collyriū ex felle scari piscis, inuailida enim deprehendes. Expende igitur vires simplicium, & totius, & quid affectus huius, hæc illa differētia, ab hac vel alia causa procedens, in hac corporis natura, ætate, cōsuetudine, in hoc aëris statu pati ab hoc remedio queat: tum demum te in consiliū adhibe, & si potes, peritos, an tali remedio sint vfi, & in quo affectu, & corpore, & in quo successu.

Sine



Sine periculo non imitamur eos, qui in- *Lib. 3. c. 8.*  
 distincta scribunt remedia, nam pro varia *ph. part.*  
 causa sunt mutanda, ut aurium dolori à fri-  
 gore, statim medentur calorifica. Eadem ta-  
 men doloré capitis pulsatorium ab inflam-  
 matione aut acrimonia mordaci exacer-  
 bant: quanquam ea ipsa inflamationes me-  
 diocres & non pulsantes sanant, ut acetum  
 mistum rosaceo exactè & calfactum. Archi-  
 genem reprehendit lib. 5. compos. phar. par.  
 quòd absinthium, hyssopum, origanum ad  
 suggillata scripserit admouenda, nec addi-  
 dit, coctane an cruda veller adhiberi. Ad-  
 hæc quòd voluit illa applicari aut seorsum,  
 aut cum melle, aut cum aceto, aut cū aqua,  
 perinde ac si hæc viribus essent similia, aut  
 proxima cum aqua, nec cutim nec vlcera  
 mordeat, acetum ambo mordeat, mel so-  
 lum vlcera.

Malè item Appollonio apud Galenū scri-  
 bitur, lithargyros cū oleo laurino vel albo,  
 id est, communi, quod malè ceu simile lau-  
 rino adscribitur, & à laurino ex aduerso di-  
 stinguitur, cum tamē à laurini virtute mul-  
 tūm absit. Idem malè loco lithargyri ce-  
 rusa vititur, & mergit eam oleo myrteo, vel  
 laurino, medicamentis multūm differenti-  
 bus: nam illud repellit, aptum igitur inci-  
 pientibus: hoc admodū calidum & dige-  
 rens.

rens, vtile est cū humor achoras gignens infixus est ac firmatus, vt prædiximus.

Absurda similiter est scriptura, si ad aliquem affectum scribis cataplasma, vel alia remedia viribus diuersa, aut etiam cōtraria: vt si scribis ad affectum aliquem, fiat cataplasma ex blito cum oleo læuigato, vel ex semine melanthij cum oleo ricinino: nam eidem affectui ambo conuenire non possunt, nisi distinguas, vt illud quia imbecilliter refrigerat, humectat phlegmones initio, & affectibus calidis attribuas: hoc quia calfacit, siccatur phlegmones declinationi, & affectibus frigidis magis minùs pro vi remedij & natura partis.

Neque solum ad rectum medicamentorum & aliorum remediorum vsum valent hæc limitationes, sed etiam ad rectam medicamentorum compositionem sunt necessaria. ob id si rutā scribis, adde vtrum siccam an viridē velis: illa enim quā hæt multò est calidior & acrior. Quod si indistinctè scriptum legis, coniecta ex viribus & scopo in quem affectum potius vtra sit vtenda. Sic serpillum acre & calidum magis quā viride, sic mentha. Ob id malè scribit Archigenes, menthæ viridis aut siccæ, & rosarum viridium aut siccarum, vt malè ad achoras scribunt quidam apud Galenum oleum rosatum

*Lib. 2. cō.  
ph. par.*

fatum, vel vrina tauri aut cameli acerrima. Illud enim minima virtute præditum repellendi incipiētibus achoribus auxiliari possit, hæc vrina admodum calens & digerens utilis est, cum humor achoras gignens ibi est infixus ac firmatus.

Limitationes in compositione requirunt facile ostēdit vinum miscendum, cuius qualitates & tempus sunt adscribendæ. Multum enim interest, an acerbum, austerum, acidum, dulce vel acre sit vinum, crassum item an tenue, & album an rubrum vel nigrum, & an oligophorum vel valens & vinosum, & an recens aut vetus. Quod enim calidæ naturæ & vetus digerit, acerbum & austerum repellit. Tamen inveniuntur composita vt simplicia, quæ siue à tota substantia, siue causa alia ignorata ad omnes sunt affectus efficacia, vt hepaticum admirabile Pharnacis herbarij apud Galenum libro 8. compositi. pharmac. part. quant. eius promissa licet Galenus nō reprehendat, falsa tamen mihi videntur. Cum enim aromatum catalogo constet, quī calidos hepatis affectus iuuare possit? Galeni theriace omnes à pestilentia seruat, quæ si correpti fuerint, omnes euadunt vsu theriaces, qui fuerunt sanabiles: sic quæ à tota substantia agere diximus. Tamen in his etiam quæd

quædã limitationis necessitas videtur, aut  
 cur Aescrion recens morbis à cane rabido  
 dabat semel in die cochlearium magnum  
 pulueris *Αἰχμαγνύων*, iamdiu verò morbis  
 dabat cochlearia duo. Curitem Galenus  
 ad præcautionem mitius remedium suffice-  
 re ait, ad curationem largius & valentius,  
 etiam si id tota sua substantia agit, vt alyf-  
 son in morso à cane rabido. Hæc tamẽ quæ  
 tota sua substantia seu suæ totius substantiæ  
 proprietate vel similitudine vel qualitate,  
 aliquem affectum profligant, hoc est, ele-  
 mentorum 4. mistione simili si trahunt: con-  
 traria: si pellunt, sed vtraque nobis nulla ra-  
 tione, nullaq; coniectura comprehensibilis:  
 sola enim experiẽtia, vt antè docui, cogno-  
 scitur diuina illa rerum quarundã proprie-  
 tas nobis indicibilis & incomprehensibilis.

Ex his patet, quantam vim habeat ad ar-  
 tis medicæ constitutionem distinctio medi-  
 camentis ad partium affectus varios in scri-  
 ptis adhibita: contrà autem quãtum noceat  
 confusio & indistincta verborum series,  
 qualis toto propemodũ Dioscoride, Celsò.  
 Scribonio, Apuleio, Actuário, Simeone,  
 Psello, Celio, Plinio, & aliis propè infi-  
 nitis, qui medicamentorum vel simplicium,  
 vel etiam compositorum facultates descri-  
 bere tentauerunt. Quibus carere fortasse  
 æquius

æquius ac præstantius fuerit,quàm vestigia  
sequi, nisi quis Galeni methodis exercitus  
ex natura affectuū & facultate medicamen-  
ti cognita, facile inueniat, cuius talis affe-  
ctus speciei, & in quo tempore, & an recenti  
aut veterato, & in qua parte, & in quali cor-  
poris habitu, virtute, ætate, consuetudine,  
viribus, sensu tactus, hoc illud medicamen-  
tum tantū, sic sumptum & admotum, cum  
his, post illa, ante illa est idoneum. Verissi-  
mum enim est, quod Galenus vsurpare con-  
suevit: Curatio agnitionē & prænotionem  
sequitur. Recte nanque is solus curabit, qui  
omnium nunc dictorum vires tanquàm ip-  
sas literas cognoscet, & qui præuideat, qua-  
le & quantum ab his vel ab illis remediis  
effectum proficiscetur, vt si modera-  
tius est futurum, prohibeatur: si  
inferius quàm opus sit,  
intendatur: si pro-  
ut rei propo-  
sitæ conue-  
nit, sina-  
tur.

\*

F





# DE SIMPLICIVM MEDICAMENTO.

RVM AD COMPOSIT-

*tionem prepara-*  
*tione,*

LIBER III.



EDICAMENTA compo-  
nēdi methodo à nobis abso-  
luta, compositionis modum,  
exemplūq; varia sed celebra-  
tiora trademus, si prius pauca  
quædam docuerimus, partim prædictis affi-  
nia, partim sequuturis nō vtilia solū, sed  
etiam necessaria. Ad medicamentorum si-  
quidem delectum (de quo multa libro supe-  
riore diximus) nō minimū pertinet scire  
simplicium verorum & natiuorum signa,  
quibus à nothis & adulteratis probè fecer-  
nātur. Adhæc cū nomen vnum multis est  
simplicibus commune, quod ex his nomine  
simpliciter pronuntiato, intelligendum sit.  
Postremò cū simplex aliquod compo-  
sitioni necessarium desideratur, quòdnam  
eius loco substituisse liceat. Ad ipsum ve-  
rò compositionis modum felicius obeun-  
dum

dum, necessaria est simplicium quorundam delectorum præparatio per ignem, lotionem, trituram, solutionem  $\chi\acute{\upsilon}\lambda\omega\sigma\iota\mu$ , id est, ut sic dicam, succationē, muccationē seu mucilaginem, purgationem, & quam vocant, clarificationem, quæ ad purgationē referri potest, uti & colatura, clarificationi necessaria. Cuius præparationis etiam in theriaca meminit Galenus, & alibi passim, præparationumque libros à quibusdam scriptos ait idem lib. 2. simpl. capit. 15. Præter hæc instrumentorum non paucorum, ut ponderum, mensurarum, vasorumq; aliorum elegans, pura, proba supellex ad rectè componendum, & composita recondenda est necessaria. De quibus omnibus ubi dixerimus, ad rem nobis propositam aggrediemur.

D E D O L I S, S E V A D V L-  
T E R I I S. M E D I C A M E N-  
T O R V M.

**M**edicamenta simplicia, præcipue rara, & ob id pretiosa adulterantur, & falsa pro veris, ficticia pro natiuis supponuntur, idq; multis modis. Nam simplex idē est interdū, sed facultate dolo ablata, ut rhabarbarū maceratione dierū quinq; in aqua examinatum, deinde siccatum, vel alia virtute, sed improbiore addita, ut si idē rhabarbarū

aqua post maceretur, vel destillata ex tithymallis, vel simplici quidē, sed in quam succus tithymallorum sit dissolutus, aut scammoni). Interdum simplex idem genere est nō specie aut loco, vt libr. i. in cinnamomo & casia diximus: & plurima quoq; docebimus titulo sequenti. Nonnunquā idē est etiam specie & loco, sed vel intempestua collectione, vel improba ad repositionem preparatione, vel ipsa repositione in loco parum idoneo, vel seruatione diuturniore vitiatum est, quorum tam magna est copia, vt exempla deesse nequeant.

Est frequenter quando simplex pro simplice subiicitur, vt pro costo radix enulæ Campanæ, pro acacia, succus prunorum syluestrium. Frequentius pro simplici multa eius ipsius substantiam, magnitudinem, figuram, qualitates denique omnes quoad fieri potest mentita, substituuntur: vt pro galbano colophonia cum farina fabarum purgatarum, & quæ mox plurima leges.

Frequentissimè ambo simul miscentur, portio scilicet simplicis alicuius veri, sed vel ligni sui vel aliorum mistura aucti & conspurcati, quod in myrrha, ladano, opopanace, & aliis propè infinitis, malum euidentissimum est. Huc pertinet, quod verorum simplicium nunc puluere fictitia

fictitia integuntur, ac velut incrustantur, interdum illorum decocto vel infusione macerantur & imbuuntur, vt etiam qualitates ipsorum & substantiam simulent.

Hæc autem simplicium medicamentorum adulteria fieri consueuerunt primum & maxime ab his, qui à se ignoranter, animo malo, intempestiue collecta in vrbes conuehūt & vendūt: deinde à mercatoribus in regiones alias transferētibus, & postremo ab ipsis rhopopolis ac pharmacopolis. Adeo autem calidè nonnulla hi omnes adulterant, sicq; veris assimulant, vt etiam exercitatissimis quodoque imponant: id quod ne frequenter accidat, quorundam fragmenta partim prius diximus, in multis simplicibus, partim hic dicentur. Quamquam hæc adulteria non publicanda censet Galen. ne prauī homines vbi ea obiter didicerint, opere ipso vitient & corrumpant. Eadem ratione eos accusat, qui lethaliū pharmacorū descriptiones inuulgant. Tamen cum vix regio ista aut velit aut possit hæc vitare, non raro autem ab infistoribus & interpolatoribus externis fallatur, è republica Gallorum fuerit scire, quibus quædam falsò represententur, & quibus notis deprehendantur: præsertim cum etiam ipse Galenus suam illam sententiam interdum non ita anxie ser-

*Li. I. antid. & li. 9. simp. in diphryge.*

uarit, sed quorundam simplicium adulteria in antidotis, & alibi passim leuiter attigerit: licet quorundam aut nulla aut non exacta est discretio, sed eorum & dolosè paratorum notæ confunduntur. Quædam contra nullam adulterationem recipiunt, ut agaricum, xylobalsamum, carpobalsamum, pentaphyllum, polium, zingiber.

*Li. i. ant.*

Cum igitur omnium nobis bonorum post Hippocratē author Galenus planè intelligeret, quantā vim habeat ad rectè mededum integritas medicamentorū: ut aliarū materialium medicarum, sollicitus magno perè fuit, ut medicamenta singula apud se præstātissima haberet, partim ea quotannis ex omni regione ab amicis fidelibus recipiens, partim ipse in loca ipsa profectus, ut Cyprum, Lemnum, quæ volebat exportans, quantum sibi in vitam reliquam sufficeret.

Vbi verò simplex aliquod præstantissimum nactus erat, identidem explorabat totam eius naturam, substantiam, colorem, odorem, saporem, vires, ut experientia illa crebra verorum medicamentorum perfectam haberet cognitionem. His enim veris cū vitiato collatis, facile secernebat tanquā indice quodam germanum & natuum à spurio. Ut enim rectum sui & obliqui est demonstratorium, sic verum mendacij.



dacij, sic præstantissimum medicamentum  
 fui & vitiatorum. Quæ via præterquam  
 quod breuissima est (veritatis enim sim-  
 plex oratio, & in vnoquoque genere rerum  
 quod perfectum est idem simplex: imperfe-  
 cta verò ac vitiata propè infinita, vt à signo  
 ad signum linea recta est vnica, infinita au-  
 tem obliquæ esse possunt) etiam est rutissi-  
 ma, ob id quod simplicis etiam vnus tan-  
 tum vitiati mistio, totam sèpe compositio-  
 nem conspurcat & vitiat, vt medicamen-  
 tum vires non sit habiturum, quas illi ma-  
 iores dederunt, & quas tu fortasse sape es  
 expertus: quo fiet, vt spe tua frustratus tri-  
 steris & irridearis: & mirum ni etiam ca-  
 lumniam sustineas, ægro scilicet per id non  
 sanato, quod futurum promiseras, & fortas-  
 se ne adiuto quidem: est etiam quando gra-  
 uiter offenso.

ADVLTERIA SIMPLI-  
 CVM MEDICAMEN-  
 TORVM.



CACIA succo & carne pruno-  
 rum agrestium representatur do-  
 lo parum malo, cum vtraq; viri-  
 bus conueniant.

*Auicenna*  
 2. canone.

Aloës crassæ partes & impuræ lotio-  
 ne separatae aqua marina & croco Mesuæ

**Dioscor.** adulterantur: sed croci odor dolum aperit. Alij acacia, alij gummi immiscendo adulterant, tuncq; minus est ad minima friabilis, & odor & sapor est alius.

Ambra puluere ligni aloës, styracis, ladanii, ambrae largioris moscho in aqua rosarum soluto. Sed hæc manuū attritu multo cetera mollescit, vera non mollescit, Plateari<sup>9</sup>.

**Dioscor.** Amomum planta amomide simili, sed inodora, ex Armenia delata, seminis dissimilitudo vitium detegit.

**Serapio.** Asphaltum, id est bitumen pice mista Dioscoridi licet adulterari non posse, ut neque carpobalsamum, neq; xylobalsamum scribit, Gal. lib. 1. antid.

Aerugo multis modis adulteratur Dioscoridi: sed hodie syncerior videtur, si adulteratam suspiceris, notas ex eo repete.

**Dioscor.** Aeris flos delimita æris scobe.

**B**ellium adulteratur gummi, sed ita vitiatum minus est amarum, & suffitu odoratum, Dioscorid.

Balsamum, id est, opobalsamum, vitiatum terebinthina paucio opobalsamo mista, vel sine hoc, croco orientali & succo foliorum citri, vel oleo nardino. De quo in opobalsamo plura leges.

**Dioscor.** Bitumen adulteratur pice, ut in Asphaltum dixi.

Casto

**C**astorium variè adulteratur: vitiū autem facile deprehendes attentus notis, quas in vero & laudatiore castorio diximus, in partibus animalis medicamentosis.

Costus radice prædura Helenij Comagenij, sed odor Helenij minùs vehemens, neq; caput tētās, & sapor minùs acer quàm costi. *Dioscor.*

Crocus misto crocomagmate tunso, flore cneei, vel oleo & puluere berfilij, vt vocant, qui fricando dolum detegit: vel sapæ sublitu & lithargyro, vel plūbagine ad pōdus augendū, vtrunq; minùs odore vegetū est: prætereà hoc est puluerulentū. Adulterati quoq; croci color & odor celeriter euanesçūt: veri diu permanet, Gal. primo antid. *Dioscor.*

Casia odorata, corticibus capparis & radicis tamaricis mistis.

Caphura, gummi iuniperi: sed hoc est minus odorum & durius: illa est friabilis, & odore valentiore. Platearius.

Caryophylli vetustate exanimati vino puluerem optimorum caryophyllorū habente irrigantur, siccantur, foris solum caryophyllos olent, & vix ad dies decem: molliores sunt integris.

Carpobalsamum adulterari semine hyperici simili, quod Petra Palæstinæ oppido affertur, autor est Dioscori. adulterari tamen non posse affirmat Gal. lib. i. antid.

*Diosc.*

**E**Vphorbium lacte hœdino, sarcocollæ, & glutini mistione conspurcatur, experientia veri est difficilis: nam euphorbiū leui gustu os diu accendit, ita vt omnia gustata euphorbium resipiant. Idem iniectum igni odorem edit fastidiendum. Dioscorid.

Ebur vstum (quod cur spodium vocet vulgus non video) osibus canis vstis vel albo marmore vsto: id verò grauitate proditur, illud forma ossis, & linearū desiderio.

**G**Albanum mutatur resina, farina fabarum excorticatarum, hammoniaco, Dioscorid. ex cuius notis syncerum deprehendes.

Galanga acris cypero europeo insipido, vel falso, vel bistorta (vt vocant) radice austera: si verò dictæ radices aceto puluerem veræ galangæ & piperis habente, biduo macerentur, foris solum galangam referunt. Platearius.

**L**Adanum stercore caprino & puluere nigro, id autem tractando non mollescit, sed in puluerem abit modo ladani vetustate exusti. Viribus præterea & odore ladani caret, quod sic vitiatum est.

*Diosc.*

Lasar omne antequam siccescat adulteratur sagapeno, aut fabæ lomento, sed maleficio deprehenditur colore, odore, sapore, dilutione, Dioscorid.

Lici

Lycium quibusdam amurca, succo absinthij, felle tauri, sed id à viribus synceri multum recessit. *Dioscor.*

Lemniam terram sic adulterant, ut nemo veram à falsa possit secernere: sic & Lycium Indicum, & plurima alia, ut verorum notæ à falsorum notis non exactè discerni possint. *Gal. 1. li. antidot.*

Ligustici semē adulteratur semine quodam simili, quod facile gustu discernitur, amarum enim est: alij semen sceniculi aut seseleos admiscentes ligusticū dolo viriant. *Dioscor.*

Lentiscina resina, id est, mastiche thuris & resinæ pineæ nucis mistura. *Dioscor.*

**M**oschus pelliculis incisis pulvere carnis columbinæ siccata, sanguine hœdino, pane asso. Si eius certum pondus pelui madenti impositum aliquādiu sit gravius, est legitimum: si pristinum pondus servat, supposititium. *Symeon.*

Manna arabum saccharo & folliculis fennæ.

Myrrha adulteratur gummi macerato in aqua, in qua myrrha maduertit. *Dioscor.*

**N**ardus adulteratur stimmi, seu stibio cum aqua aut palmeo vino inspissationis ponderisque causa inspirato. *Dioscor.*

Nard<sup>o</sup> Celtica adulteratur imposita herba fimi *Dioscor.*



**Dioscor.** simili, quæ hirculus ab odoris grauitate vocatur, sed herba candidior sine cauliculo, minoribus foliis, radice nec amara nec odorata, uti vera nardus est.

**O**pi omnes adulterantur addito sagapeno, antequam inarescant, colore, odore, sapore dolus deprehenditur: & quia cum aqua vel saliuâ non mox soluuntur adulterata: adulterantur etiâ furfure & farina præcipuè *λευκίας*, id est, qui ex caule defluit, quia dilutior: *ρυσίας* verò, id est, qui ex radice perlucidior & purior. Quauis enim radice incisa aut caule quod effluit crassum & lentum *ὀπὸς*, id est, liquor dicitur, lib. 8. simpl.

Opium, semine lactuæ agrestis.

Opopanax, hammoniaco aut cera, tunc in aqua si digitis teratur, non soluitur, nec lateſcit ut syncerum, Dioscor.

Os ex corde ceruî cartilaginofum, simili ex maiorum animalium corde.

**Ga. 1. lib.**

**antidot.**

**Dioscor.**

Opobalsamum tam variè adulterant & astutè, ut eius adulteria etiam exercitatissimos fallant. Hæc verò adulteria inuulganda non censeo, ne maligni etiam vitient a nobis edocti.

Vitiatur misto vnguento terebinthino, lentiscino, Cyprino, balanino, susino, metopio, melle, vel Cypria cera liquida: sed malefic

lesiciū facile deprehenditur. Nam verus liquor in vestem laneam fusus maculam nō facit, & post lotionem notam nō relinquit; cū vitiatuſ inhæreat. adhæc merus, lac si instillatus coagulat, & in aqua aut lacte celerimè liquatur, & colore lactescit. Alias quasdam notas apud eundem & Simeonem si libet, legeris potius, quàm apud barbaros hoc seculo adhuc legi solitos, profunda hominum ignorantia, & magno mortalium incommodo.

**P**iper longum fraudulèter præparatum, est herba quædam flaua, quæ à Xene affertur, aspectu quidem, nō autem gustu macropiperi similis: hæc autem aqua irrigata soluitur: natiuū macropiper insolubile permanet, Gale. lib. 1. antidotorum. Piper longum verum ex Barbaris affertur: adulteratū verò duplex est, alterum, quod in Alexandria maximè conficitur: alterum herbæ cuiusdam germen. Quod factitium est, si per diem totum in humore maceretur, illicò liquatur ac soluitur, libr. 4. sanit. tuend. Illud fortè ex maza subacta aqua, in qua dissolutum aut maceratum sit piper, & in formas effictas, coniecta post siccata. Vidi etiam adulteratum ex germine & velut nucamēto betulæ & coryli.

Pastilli theriaci ex radice pentaphylli, id est,

est, tormentilla, Venetiis malè componitur, non ex viperarum carne: Hermolaus in Coroll. Musa.

*Dioscor.* Phu radice rusci admista vitiatur: sed maleficiū facile deprehenditur, quia hæc dura est, frangi contumax, & sine vlla odoris gratia.

*Dioscor.* Pompholyx taurino glazine, ouillo vel marino pulmone, aut grossis vel quibusdam aliis crematis.

*Li. 1. ant.* Pentapetalon, Pentaphyllon, Polium nihil simile habent in plantis, ob id non adulterantur.

*Mesues.* **R**ha Ponticū, radice centaurij magni. Rha barbarum exanimatur: maceratum aqua diebus quinque, postea siccatum idem minus in crocum tingit, intus nigricat, varietatem in fracturis amisit, densius est, astringit magis: ex aqua verò illa siccata trochisci fiunt regibus.

*Galdi. 1. antid.* **P**ñop cum viget ac integrum est, valenter astringit, densum est ac contractum tota substantia, tamen celeriter perforatur. Incola regionis in qua gignitur, coctione vires eius in aquam trahunt: deinde Rheū siccatum tāquā integrum sit, nec coctū transmittunt, sed id rarius est & laxius integro, nullam aut minimam astrictionem retinēs.

Qua

Quantum aliis notis rheon à rha barba-  
differat, alibi diximus.

**S**Agapenum succo lasaris & galbano &  
Dioscorid. id non eliquescit, sed verum  
vino vel aqua affusa statim dissolvitur, Gal.  
lib. I. antid.

Sarcocolla pulverizata est suspecta adul-  
terij, Dioscor. à quovis pulvere misto: inte-  
gra eligatur.

Styrax modis multis Dioscoridi adulte-  
ratur, sed dolus facile deprehenditur notis  
ab eo dictis.

*Dioscor.*

Santala lignis aliis, rubrum berfilio ino-  
doro: flauum & album ligno cedrino odo-  
ratiore linguam calfaciente.

Scammonium lacte rithymalli & sarco-  
colla, vel erui farina, tunc linguam minùs  
valenter pungit & mordet.

*Dioscor.*

Saccharum intus faculentum aut spuma  
succicannæ eius auctum, tunc in ore vane-  
fcit, & fractum nigricat.

**T**Urbith, gummi dissoluto quibusdam  
radicibus extremis illito: verum au-  
tem si frangitur, gummosum est intus.

Tamar Indi prunis adulterati non splen-  
dent, humidiores sunt, sapore & nucleo pru-  
norum, multum à semine Tamar Indorum  
diuerso.

*Thur.*

**Dioscor.** Thus pini resina & gummi: suffitum autem gummi flammam non edit, resina autem in fumum vanescit, thus statim ardet: odore etiam maleficium proditur.

**Dioscor.** Thuris cortex pini aut nucis pineæ cortice horum tamē index, lignis: nam reliqui cortices suffūti quanquā incenduntur, sine odore fumant. Thuris verò cortex ardet, & odorum fumum edit.

**Dioscor.** Thuris manna adulteratur cribrata pini resina, aut polline aut corticethuris contuso, sed hæc igne deprehenduntur.

Hæc abunde fuerint ei, præsertim qui veras simplicium syncerorum notas ex libro primo accuratè didicerit. Nam cum rectum sui & obliqui sit index, ut initio huius docuimus, & in vnoquoque rerū genere quod perfectissimum est, idem sit simplex ac vnicum. Id si cognoueris, alia ei cōgeneria aut etiam arte affinia nullo negotio secreueris.

**I**am tradamus simplicis alicuius nomine scripto absolutè & sine determinatione sexus, coloris, magnitudinis, figuræ, loci, temporis: vel notarum probitatis aliarum, vel partis eius simplicis, radicum, foliorum, florum, seminum, & cæterorum, quòdnam sit eligendum: nam pro variis scopis varia, sed in scopos efficaciora deligimus. Quam in  
rem



rem te iuuabit nostra simplicium per locos communes descriptio. Quæ enim radicibus folis sunt efficaces plantæ, illarum nomine, radices veniunt, quæ foliis, floribus, fructibus, seminibus, cortice, ligno, liquore, succo gummi, sunt vtiles ac medicamentosæ magis, dum plantæ nomen effertur, partē eius vsurpari solitam elige: quum verò pluribus suis partibus ad res etiam varias valent, quibus sit opus, coniecta ex partium illarum facultate & affectus natura, & medicamenti constituendi forma, vt ammi, anisum, apiū, carū, cnicus, cuminum, gith, libypticum, nasturtiū, psillium, seseli, staphis agria, semine sunt præstantiora, idē; solum illarum nomine intelligendum, in aliis multis similiter.

Anisum Cretense lib. 4. sanituend.

Hagnus, id est, flos eius aut semen, licet folia etiam sint vtilia.

Agaricus, albus & fœmineus.

Aloë, id est, succus eius: aloë Indica lib. 9. simplicium in diphryge.

Alumen, scilicet scissile, quia præstantissimum. lib. comp. pharm. gen. primo.

Acetum, ex vino non hydromelite vel cereuisia.

Aristolochia pro re proposita explicanda est: rotunda enim cum multum tenuare crassum humorem, tergere vlcera, digerere

Li. 6. simplic.

ex vtero: longa autem cum mitiora hæc volumus. Clematidis autem, quia fragatior in vaguentis expetitur.

Amomum, Scythicum lib. 8. comp. ph. part.

Ammi Illyricum libr. 9. eiusdem Aegyptium alij laudant.

Balsamum, opobalsamum potius intelligendum quam carpobalsamum, aut xylobalsamum, lib. 2. comp. ph. part.

Bryonia alba quia efficacior quam nigra. Buglossum utrumque foliis & flore efficacius radice tamen non inutile.

Casia vel Cassia in libris Græcorum.

Casia syrix optima, & cinnamomo viribus & toto habitu finitima. In libris Arabum eadem lignea dicitur: altera verò fistula his dicta ponitur, cum medicamentum est purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radiceis.

*Galen. in simplic.* Centaurium, minus in purgantibus medicamentis. In cæteris maius dictum à facultate multiplici & efficaciore.

Calaminthe, montana, quia efficacior quam domestica.

Costus, amarus, cum subamarus & valde acer solum nominetur: dulcem tamen nescio quem Arabes inuexerunt.

Cypres

Cypressus, id est, nuces eius ī astringētib<sup>9</sup> medicamentis, lignū aut folia in diureticis.

Cinnamomum optimum, de quo in simplicibus abundē.

Corallium, rubrum.

Cuminum, Aethiopicū, libr. 4. san. tūen.

Daucus, agrestis: nā satius pastinaca est alimentum veriū quā medicamentum.

Elleborus, niger Mesuae, quia salubrior, albus Gale. Apho. i. lib. 5. Obserua igitur, an compositio sit Arabica aut Græca. Ellebortus vterq; & heleniū ex locis editis pręstāt.

Eruca, sylvestris, quia efficacior hortensi.

Epithymum, Atticum melancholiam ex ventriculo purgat: id in Græcis cōpositionibus vsurpandum, in Arabicis Arabicum.

Fœniculus, semen, sed in collyriis succus foliorum aut radicum.

Galla, solida efficacior quā perforata.

Gummi, Arabicum: id enim omniū perfectissimum vel Plinio authore.

Gluten, mastiche, ceteris glutinis efficacior, vt vitrum etiam glutinet, quibusdam intelligitur: aliis ichthiocola, aliis taurocolla magis placet glutinis nomine.

Hyssopus montanus hortensi melior, vt calaminthe montana efficacior domestica.

Hyssopū Ciliciū Dios. Creticū verò Archigenes, apud Gal. lib. 8. c. ph. p. Hyoscyamus,

albus, seu album eius semen: quod tamē interdum exprimitur, frequentius tacetur.

Iris, radix ireos Illyricæ veteribus, nunc pharmacopolarū ignauia Florētina vsurpatur, cū illa per Venetos facilē haberi queat.

*Li. 6 simp.  
plic.*

Lupinus amarus: nam dulcis esculeatus est, ut ille amaritudine per macerationem in aqua deposita.

Lactuca, semen, præterquā in victus ratione, ubi herba potius intelligitur.

Lapathū, oxylapathū efficacius rotundo.

Lithargyros, auri: tamē lithargyros chryfitis ali quoties in lib. c. ph. Gal. legitur.

Mastiche, Chia lib. 7. Meth. & alibi passim. Aegyptiam tamen ac recentē ob id pinguis simam laudat lib. 2. ad Glaucon.

Marrubium, album præstantius nigro.

Mel, apum, alterum aëromeli seu mel aërium & rosidum.

Margaritæ, solidæ meliores perforatis, nisi etiam sint flauæ, obscuræ, solidis pares.

Medulla si nō additur cuius animalis. & valens futurum est medicamētum, ceruina miscenda valentior quā vitulina, libr. 6. compo. ph. part.

Nuclei, pini, oliux: dactyli autem Auiennæ.

Oleum, olium ex oliuis expressum.

Opium, Thebaicum Gal. libr. 7. simp. & post

post eum omnes.

Petroselinum, Macedonicum, & in hoc Aitreoticum, & huius semen maximè in usu est lib. 8. comp. ph. part.

Pruna, sialius deiicienda est, Damascena, & Hispana seu Iberica, hodie Augustana & Cathalaunica Italis dicta, sunt multò præstantiora, vel si qua his similiter sunt pingua, dulcia: si ad cohibendum & astringendum sit medicamentum, Damascena immatura, vel potius quæ Iorana nobis dicuntur. S. Iuliani & Turonica.

Papauer, album semen.

Piper, album quia acrius, & linguam magis pungit quàm nigrum, à quo per adustionem vis exhalauit, Galen. lib. 8. simp. sed album id maturum intellige. Nam album ex macropipere in racemum granatim dehiscente, recens factum, minùs est acre, & macropiperi facultate proximum, quale apud Serapionem est accipiendum. Fix, liquida in suppuratibus & tergentibus: sicca, in siccantibus, vnguentis epuloticis & glutinatibus, Gal. lib. 7. simpl.

Pæonia, mas seu eius radix, vel semen, Manardus ætatis nostræ medicus longè doctissimus in epistolis.

Polypodium, quernum vulgò vsurpatur, murale & à saxis pretulerim cū Narbonen-



sibus quibusdam, quod frequentissimum, & pro querno omnes venditant, nisi si quando astrictione opus est: qua ratione hederam quoque quernam nonnullis experiri audio.

Quatuor emolliētia, malua, althæa, viola nigra, acanthus.

Quatuor femina.	Frigida	Maiores, melonum, cucurme, cucurbitæ, citruli.
		Minora, lactucæ, portulacæ, intybi, cichorij.
	Calida.	Maiores, zumini, carui, anisi, fœniculi.
		Minora, apiij, dauci, ameos, amomi.

Quinque radices vreticæ, apiij, petroselinij, asparagi, graminis, rusci.

*Lib. 8. simplic.*

Resinarum, primas non iniuria meruit lentiscina, id est, mastiche: inter alias verò præfertur terebinthina, quia melior quàm colophonia, & phrycta dicta: aut illius loco ponitur larix dicta, terebinthinæ propè similis, Gal. lib. 1. comp. ph. gener. recentioribus verò pinea intelligitur.

*Lib. 9. c. 6. ph. part.*

Ruta, folia rutæ agrestis, Græcis verò folia rutæ domesticæ. Illam verò & illius semen, moly vel besanū, vel besafa, vel cū Syris, apud quos nascitur Hermola ferè vocat.

Rosa, rubra recens in purgantibus, sicca in astringentibus.

Rhapha

Rhaphanus, sylvestris.

Rosmaris, folia, interdum flos, quem nescio: cur hodie vulgus *ἀνθός*, id est, florem absolute appellet.

Rhus, cortex fructus sumach dicti.

Stoechas, stoechados Arabicae flos.

Syrax, calaminthes: nam liquidus vulgò dictus est myrrha stacte, si verus sit.

Santalum, flauum.

Spica, nardi Indicae.

Sulfur, *ἄνωγον*, id est, ignem non expertum ceu viuum est nobilissimū: ad quēdam extinctum seu nobis familiarius praefertur.

*ἔχθινος*, id est, iuncus, pro scœnu anthos.

Tres flores cordiales, violarum, buglosi vtriusque.

Thymum, Atticum aut ex editis locis & siccis, lib. 4. fanit. tuenda.

Viola, nigra seu purpurea, vulgò Martia & quadragesimalis, quòd in ea tēpora flos ferè incidat, & eadē recens si haberi potest: nam sicca inefficax.

Zizipha. i. iuiubę recētia & bene matura, aut saltē integra, nō putria aut vetustate exucca, qđ illis post sextū mēsem ferè accidit.

Sic quę singula in singulis regionibus sunt praestantissima & laudatissima.

Alumen Milesium.

Agaricus Ponticus Andromach. iuniori

in theriaca.

Myſi Cyprium.

*Lib. 6. ſanit. tuend.* Nitrum Berenicium.

*Lib. 9. cōph. part.* Sinon Syriacus.

*Lib. 1. an. tidot.* Cuminum Hiſpanum, alibi Aethiopicū, melius Aegyptio. Aniſum & Thymum & alia plurima Cretica, libr. 4. ſanit. tuend. in diatrion piper. & diacala.

Meon Hiſpanum & Macedonicum.

Aristolochia Pōtica, & hac melior Cretica, libr. 10. comp. ph. part.

Phu Ponticum, Caſtorium Pōticum.

Daucus Creticus, ſemine & radice bonus, cæteri ſolo ſemine. In Dicearchia quæ nunc vocatur Puteoli, ærugo, ceruſa, æs, ſquamma æris, & alia nonnulla. Romæ argenti ſpuma fit optima: ex Sicilia itē, magna Libya & Creta quotannis multa præſantiſſima Romam afferebantur.

De his multa libro ſecundo in delectu medicamentorum diximus, quædam dicturi quoque libro quarto in theriace.

*Quid, id eſt, quod medicamē tū pro quo ſupponendū.*

Q V I D P R O Q V O.



Ντιβαλλόμενα, hoc eſt, ſimplicia, quæ aliorum facultate ſimilium penuria ſupponi poſſunt Medici conſilio, quæ nomine Galeni circū

circunferuntur, & à Paulo ad verbum propè citantur. Galeni non esse hinc liquet, quod statim ipso initio Galenum citat. Adhuc anacardiij fructus mentionem facit, qui Galeno ignoratus fuit. Postremò multa supponit absurdissima, vt loco agarici, euphorbium: pro serpyllo, potamogitona: vice gal-læ, sordes gymnasiolorum: in locum poly-podij, radix chamælææ aut chamæleontis: pro polythrico, absinthium, & alia eius generis plurima viribus dissimilia. Tamè quæ recipièda magis sunt, tum indidem, tum ex Galeni libris, tum etià ex Arabibus vtcunque proferemus, vt pro

Aqua pluuiæ, supponi potest aqua fontana pura: & ab omni mistione syncera, Gal. lib. 1. comp. ph. part. in diacodio.

Acacia, succus & caro prunorum agrestium, vel hypocisthis, Auicenn. 2. canon.

Afaro, acori par pondus & dimidium.

Carpesium quoq; pro afaro & cum asaro, lib. 2. comp. ph. part.

Absinthio, cum Galeno abrotanum: & contrà pro abrotano absinthium.

Acanthij semine, lychnis, & contrà, ἀντιβαλλομένων author.

Acantha Arabica seu Aegyptia herba (que succha Serapioni dicitur) acantha leuce nostras, eidem dicta bedegar.

Alicacabo, semen folani.

Asphalto, pix liquida, brutia.

Aethiopicae oleae lacryma, lacrymarum  
acaciae partes duae, seu pro gummi elemmi,  
gummi Arabicum.

Acoro ad flatum & hepar ac liene iuuand-  
um, cumini par pondus, & tertia pars ar-  
istolochiae Auicem.

Anchusa, hyacinthus.

Arsenico, sandaracha.

Amylo, sicca farina.

Amygdalis amaris, absinthium.

Aristolochia quauis, vna ex tribus aristolo-  
chiis, quacumque habueris, Gal. lib. 3. c. ph. part.

Adipe vulpis, vrsinus.

Adipe ceruino, anserinus.

Alumine, sal fossitius.

Pro balaustio, malicorium.

Buccinis, ostrea vsta.

Balsami liquore, myrrha stacte.

**Lib. 6. fa-** Pro Cinnamomo, casiae aut amomi du-  
**nit tuend.** plum ad odoris gratiam Gal. lib. 5. c. ph. par. in  
**Li. 1. an-** dentifricio. Pro cinnamomo, duplum optimae  
**sid. Gal.** casiae, vel cum Quinto Medico duplum vel mul-  
tum carpesij, vel certe non paucior casia, Gal.  
lib. 2. 3. & 8. c. ph. p. & lib. 1. antid. Quidam  
carentes cinnamomo in vicem eius ponunt  
aequale pondus ex semine cardamomi. Da-  
mocrates in Cyphi. lib. 2. antidotorum Gal.

Casia,



Cassia, cinnamomum, Gal. lib. 2. cō. ph. p.

Cassia cortice, nardus indica vel malobathri folium: vel contrā, lib. 6. comp. phar. p.

Chamæmeli floribus, duplum foliorum & radicum.

Costo hodie rarissimo, pyrethri dimidiū, vel baccæ cedri, vel radix helenij, vel ireos.

Cimolia terra ex Cimolo vna cycladum, recrementū ferri & molæ simul attritorum.

Scutellario, in sternutamentis ellebor<sup>9</sup> albus.

Cardamomo maiore, minus: & contrā.

Calaminthe omnis, mentastrum, pulgum similia sunt facultatibus, ob id inuicem sunt antiballomena.

Pro croco, crocomagma.

Cypero, iuniperus maior.

Cumino, semen rutæ vel agni.

Clinopodio, heliotropium.

Colocynthis, semen ricini.

Capparis radice cortice, cortex radice tamaracis vel ericæ.

Cicutæ semine, coriandum.

Pro dictamno, elelisphacus vel nepitha.

Doronico, dimidium seu duæ tertiæ caryophyllorum, Auic.

Damasonio, eryngium. Pro Elaterio, succus foliorum cucumeris agrestis.

Ebeno, lignum Gaiaci: & contrā. Nam quas vires hodie in ligno Gaiaci experimur, ebeno

ebeno tribuit Galenus libro 6. simpl.

Eupatorio Mesuæ, absinthij & asari ana  
dimidium pondus eius, vt ambo simul mi-  
sta æquent pondus eupatorij Mesuæ, ab eu-  
patorio Græcorum diuersi.

Pro Folio, folium caryophylli, nardus  
Indica si inuenitur, cassia id est, vulgare cin-  
namomum, macis, Auicenna 2. canone.

Ferrū ferrugo, squama ferri idem propè  
pollent, & pro se mutuò ponuntur.

Fimo palumbis, fimus columbæ.

Felle suillo, vel perdicis, vel piscium.

Pro Gentiana, asari & radice capparis  
ana dimidium.

Gongilide, heliotropium.

Glycyrrhizæ succo, æquale radice eius,  
Andro. in arteriace 15. apud Gal. li. 7. c. ph. p.

Gnidio cocco, semē lathyridis, & cōtra.

Galbano sagapenum.

Pro Hammoniaco, propolis.

Hermodactylo, in doloribus iunctura-  
rum folia anchusæ & dimidium bdelij.

Hederæ gummi, gummi perfici.

Hyacintho. flos Isatidis.

Pro Iride Illyrica, helenium odoratum.

Pro Lapide asio, lapis gagates.

Pro Lapide magnete, lapis Phrygius,

Lapide Phrygio, pyrites lapis vel argy-  
rites.

Libystico, semen staphilini, id est pastinacæ, præsertim agrestis.

Lepore marino, cancer fluuiatilis.

Lanariæ radice, radix veratri nigri.

Lycio, succus radicis cētaurij magni, li.

7. sim. aliis succus baccharū periclymeni, auctor libelli Dynameôn: Gal. male adscripti.

Pro Melle, mellaërium vel faccharum.

Malabathro, casia, vel nardus Indica.

Myrrha troglodytica, calam<sup>9</sup> odoratus.

Myrrha, Smyrnium, & contra Dioscor. in Smyrnio.

Pro nasturcij semine, folia eius sicca.

Nuce moschata, parispica. Nardo Syriaea, iuncus odoratus.

Pro opopanace, hammoniacū, vel galbanum, vel sagapenum, vel bdellium, lib. 2. ad Glauconem in curando scirrho.

Ozimo caryophyllato, melissa in affectibus cordis.

Oleo laurino, pix liquida, licet illo infertior, vel oleum cedrinum, vel cicinum, vel vetus, vel oleum ex lucerna cum Hera, Gal. lib. 1. comp. phar. part. vel coctum, sic enim tenuius fit, & veteri ac cicino simile, vel sordes lucernarum luti crassitie. Ibidem.

Oleo rosato, violatū, nymphaea: amygdalinum autem loco rosacei boni, id est ex multis rosis, cum oleo omphacino insulso fact

facti libro tertio comp.ph.part.initio.

Oleo recinino seu cicino, raphaninum.

Opobalsamo, opocarpasum Galen. vel myrrha stacte, vel liquor myrti.

*Lib. 6. cō.*

Oriza, hordei farina.

*ph. part.*

Oesypo, medulla ceruina.

Omphacio, succ<sup>o</sup> rhois, vel vinū austerū.

Pro Pipere longo, album: pro albo, nigrum optimū, id est, grauissimum: & contrā, 4. sanit. tuendæ.

Periclymeni fructus drachmis tribus, radicis eiusdē drach. tres. lib. 9. comp. pha. par.

Phœnicobalanorum pinguium carnis drachmis tribus, palmulę seu dactyli tres, aut sex Galenus, lib. 7. comp. ph. p. in arteriæ 15. Andromachi.

Psyllio, lens palustris.

Petroselino Macedonio in theriaca, alterius regionis Peroselinum, Gal. lib. 1. antid.

Pro resina phryctæ, pix, aut pix brutia, Gal. lib. 9. comp. phar. part.

Rubigine, scoria ferri.

Raphani seminis drachmis decem, succi eiusdem cyathus vnus, Galenus lib. 9. comp. ph. part.

Rosis, flos rosarum, vel contrā, Gal. libro 6. comp. ph. part.

Rhoë coriario, rhus obsoniorū, & contrā, Gal. lib. 6. comp. ph. part.

Pro

Pro Staphide agria, pyrethrum.

Spodio Græcorum, cinis super fornacem aurariam inuentus melior quàm ebur vstum, quod nescio cur hodie Barbari spodium vocent.

Styrace, castorium.

Sale Indo, saccharum candefactum.

Sagapeno, gummi cedri, hammoniacum, resina picea sicca.

Spuma nitri, nitrū molle, vel aphronitrū, Gal. lib. 3. comp. ph. part.

Sulfure viuo, flauum vel vstum & purgatum.

Satyrio, semen erucæ, vel scincus: vel contrà.

Sinapi, cardamomum vel cardamum.

Scammonio, ricinus.

Stribio contuso, squama æris, stannū vstū.

Sepiæ osse, pumex.

Serapiade, pæoniæ radix.

Scilla, bulbus.

Pro Terebinthina, larix dicta resina, ei propemodum similis, Gal. lib. 1. com. ph. ge.

Thapsiæ succo, chamæleontis nigri succus, vel nasturtium, vel nasturtij aut erucæ seminis pondus æquale, licet illa sint multò inferiora thapsia, Gal. lib. 1. comp. ph. part.

Tamaricis succo, succus sambuci, Gal. libro 9. comp. phar. part.

Pro



Pro Veratro albo, nigrum.

Viscoquerno, chamaeleon niger.

Vino falerno, aliud quoduis colore ful-  
 um substantia tenue, vt perluceat, & sit o-  
 dorum vehementer, vt Ariusium ex Chio,  
 Lesbium ex Mitylene, Cresso: Methymna  
 & Timolites, Gal. lib. 1. comp. ph. gen.

Pro Zedoaria, aristolochia.

Zingibere pyrethrum.

*Ἀνισαλλόμενα*, vel horū aliqua vel alia  
 potest quauis regio noua desideratis facul-  
 tate affinia facere doctorū medicorū con-  
 silio: nam si Arabibus & Græcis pro sinapi  
 cardamomum fortè ipsis frequentius licet  
 substituere, quidni pro cardamomo fre-  
 quētissimū nobis sinapi vsurpabimus? præ-  
 fertim cum vt pro cinnamomo cassia, sic con-  
 trā pro cassia cinnamomo assumi probaui-  
 mus: idēq; in aliis faciendum puto. Ob id  
 Galenus libr. 7. simplicium melissophyllum  
 (inquit) marrubio facultate simile, sed ipso  
 multo imbecillius, ob id melissophyllo uti-  
 tur nemo. Nam absurdum fuerit, præ sente  
 vbiq; terrarū magno marrubij prouentu,  
 vti melissophyllo. Si cui verò ad manum  
 non fuerit marrubium, melissophyllo uti  
 poterit, obseruata eius præ illo imbecillita-  
 te, vt ob id quātitas eius augeatur: hæc Ga-  
 le. quā ratione pro cinnamomo duplū cassie

optime

optimè miscemus medicamentis, vt quātitate qualitatis imbecillitatem redimamus.

Quæ igitur apud singulas gētes sunt copiosa, modo sint facultate proxima his quæ desiderantur: quia faciliora sunt paratu ponantur: vt in Asia in frigidis capitis affectibus, aut in declinatione calidorum rustici cedrio dicto vtuntur: eius penuria pisselæo, id est, pice & oleo mistis liquida forma; in terdum etiam cedrio & pisselæo simul magis & minus mistis, prout vires eius intēdere student: hoc autem linūt sinciput, nares, frontem, aures, & quibusdam plantam & sedem, Gal. lib. 2. comp. ph. part.

Sed videmur antibalomenis non egere, qui magna cura iam simplicia generis omnis in prōptu habeam⁹: imò maximè egemus, cū multa simplicia veteribus laudatissima (vt Theriacēs cōpositio docebit) hodie nobis parum sint cognita. Quæ vbi certa erunt, his vtendum potius quàm antibalomenis. Vt enim pluris est equo domini oculus quàm equisonis industria: pluris agro domini vestigiū, quàm villici stercorizatio: pluris familiæ paterfamiliās, quàm procurator: pluris prætor, cōsul, rex, pastor, quàm proprætor, procōsul, prorex, mercenarius: sic plus tribuēdū puto his, quæ maiores magno delectu & ratione optima in com-

sistit. ob id aromata miscemus aliis ab igne depositis, ne ab igni ipso vise eorum dissolvatur, vt postea dicemus.

Medicas portiones hyeme calidas damus, & cum vomitarias esse volumus, tepidas: cum hydroplicas, plurimum calidas propinamus.

Semina saccharo incrustanda antè calefaciēdo modicè siccamus, vt promptius in his saccharum siccitate concreascet & albescat. Caloris vis in medicamentorum præparatione tā latè patet, vt me dies prius sit defecturus, quàm calor is illius exempla, si omnia persequi liberet.

Nutriuntur super cineres calidos ly- *Li. 9 sim.*  
thargyrum & molybdæna, & cum oxelæo *et li. 1. c.*  
celerrimè liquantur: cum hydrelæo diutiss- *ph. gene.*  
ima cōctione opus est.

Turbith lacte nutritur & myrobalani oleo, aqua, & aliis apud Mesuen. Sarcocolla lacte muliebri, vel asinae, vel caprae nutrita aliquandiu post siccata, idq; aliquoties, reponitur ad vsus. Fit hæc simpliciū quorundam nutritio & velut resectio atque auctio interdum sine igni, præsertim aëre calido, vt etiam vnguentum nutritum declarat.

## L I Q V A T I O.

**L**iquantur calore ignis, quæ frigido cōcreuerunt, butyrū, oleum hybernū,

adipes, medullæ, cera, resinæ: gummi melius aqua solvuntur, & ei miscentur, non oleo, ut succi leni bdellium, hammoniacum, & similes, vel aceto, vel alio: resinæ verò oleo liquatæ eidem probè miscentur non aquæ.

*Lib. 1. cõ.  
phar. gen.*

Chalcitis metallicorum celerrimè liquatur, & alumen omne, sed scissile mollescit tantùm: liquatur & sandaracha & auripigmentum. Lithargyros per se tardissimè liquatur: cum ærugine vel duplo oxelæi cocta citius liquefit, quàm cū hydrelæo duplo, vel paulò plus duplo. In medio horum sunt ærugo & misy: fori autem quia terreum magis est ac saxeum, quàm chalcitis & misy, etiam tardius liquatur.

#### DISSOLVTIO.

**C**Rocum, thus, myrrham læuigata vino dissoluit, & medicamento propè cocto miscet, quæ ubi modicè liquata erunt ab igni, deponit Andromachus in arteriace 16. lib. 7. comp. phar. part.

Galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniacum ex vino vel aceto, vel alio liquore cocta dissoluuntur. Cum siccis verò trita abeunt in puluerem.

Gummi ferè dissoluuntur liquore aliquo, aut pistillo calido, item & pingues succi nisi ob siccitatem teri possint, ut frequenter

gum

gummi Arabicū, tragacāthi, iuniperi, thus masculum, mastiche, & propè reliqua vetustate vel igni siccata: recentia verò & adhuc vuida etiam calentibus digitis liquefunt, aut saltem mollescent. Eadem tundendo lactescunt, multò magis si pistillo calido in mortario calido tundantur. Gummi quia aquea est natura, pròptius cum aqueis miscetur, quàm cum oleaginis: resina contra quia est oleagina, vt in simplicibus diximus. Multa item composita, vt conseruæ, trochisci, anridoti aliis miscenda, antè liquore aliquo dissoluantur.

Non modò autem hæc ad compositionē sunt necessaria, sed particulares quædam compositiones sæpe sunt antè faciendæ, quæ in alias maiores recipiuntur: vt cyphi in mithridatiō: pastilli theriaci & scillitici & hedychoon magna in theriacen. Galla moschata, & alipta moschata in multas Arabū compositiones: & præter hæc nō pauca, quæ in sequentibus compositionibus inuenies.

## I N F U S I O.

**I**Nfunduntur medicamenta parum trita, & macerantur liquore aliquo calente à sole, vel igni per semihoram, per horas etiam plures, vt octo, noctem totam etiam diem,



biduum, triduum, pro medicamento natura, & vario medici scopo & necessitate, ut interim vis eorum tota in liquorem illum trahatur & transeat. Hac utimur non modò in apozematibus & syrups, sed etiam in potionibus quotidianis purgatricibus, ut hac ratione sint gratiores, quàm ipsa solidorum substantia.

*Apho. II.  
lib. 2.*

Citiùs etiam subeunt aut distribuuntur liquida quàm crassa: quomodò potu quàm cibo facilius & iucundius est impleri. Nec sola medicamentorù facultas in liquore transit, sed eius substantiæ portio tenuior: interdum etiam crassioris aliquid, præsertim dum infusum valentius colando exprimitur, aut per colum rarior transmittitur. Colandum enim ac exprimendum magis aut minùs pro ægri, & affectus, & medicamenti natura. Infusio veteribus parum frequens est, quanquàm multa sæpe in liquore aliquo ante decoctionem macerauerunt, non tamen ad purgationem, quo more nos hodie in ægrorum delicatorum & diuitum gratiam solemus, atque adeò alteramus saccharo & pseudocinnamomo adiectis, ut æger sumpsisse se medicamentum nesciat.

*Li. 4. fa-  
m. t. tuend.*

Est quando vice infusionis iusculo aliquo eadē nodulo ligata incoquimus. Gale-

nus verò semen abietis tritum & flores populi nigrae tritos oleo dulci & tenui macerant dies quadraginta interdū menses duos, tres, quatuor, plures; in domo calida, & sub sole mouet meridiano, postea linteocolatum & expressum oleum reponit, reliqua abicit.

Infunduntur seu macerantur liquore aliquo medicamenta, vt eorum vires in ipsum transeāt (vt dum agaricū, fennam, rhabarbarū, & alia multa super cineres calidos temperamus aliquandiu humore idoneo) vel vt simplicis facultas vehemens corrigatur, vt turbith lacte caprino recens multo maceratum & post siccatum fit clementius, neque ventrem postea cōturbat. Mezereon quoque & esula aceto macerata acrimoniam effrenem deponunt. Vel vt facultas noua medicamentis acquiratur: sic turbith succo cucumeris agrestis temperatum materias à partibus remotis valētius attrahit & vacuat. Hermodactylus itē scillæ, aut raphani succo, vel aceto scillitico infusus à iuncturis potentiū euocat. Agaricus etiam oxymelite maceratus fit purgantior. Vel vt medicamentum fiat lubricum, ob id medulla collocynthidis, chylo tragacanthi prōptē per vētrem totum lubricat, vt neq; vētriculo, neq; intestinis, neque vesicæ adhæsu suo sit mo-

*Menses  
in cano-  
nibus.*

lesta. Scammonium quoque oleo violato vel simili maceratum promptè subit deorsum, nulla aut minima partium noxa, quas permeat. Aut igitur liquor ipse medicamento vires in se trahit, aut mutat ac frangit, vel auget pro varia cuiusq; liquoris natura: ut si aloë decocto aromatum mergatur, illorum vires in se trahet. Sed hæc fusius & clariùs nostris tabulis in canones Mesuæ expressimus.

## M V C C I L A G O.

**X**υλὸς, id est, succus, seu succago ac lentor, ac veluti muccus ac muccago sit infusus quibusdā seminibus in liquore calfacto sole vel igni. Cuiusmodi sunt semen psillij, ex quo fortem facere expressionem cōtra falsam Arabum opinionem ne dubitata: sic etiam extrahitur ex semine cydoniorum, maluæ, bismaluæ, lini, & nigrici, vrticæ. Lini semen in aqua coctum refrigerantem *χυλὸν*, id est, cremorem lentum, efficit. Quomodo ex radicibus maluæ, bismaluæ, symphyi, periclymeni, & similium: vnde emplastrum est, *διὰ χυλὸν*, seu *διὰ χυλῶν*, id est, de muccaginibus: diuersum tamē ab eo quod de muccilaginibus vulgo dicitur, ut leges in emplastris Mesuæ. Ex quo autē liquore succus ille fit educendus, Medico cōsultore opus est, ut in dysenterijs cum aqua  
rosa

Lib. 6. *sanita. tuen.*

rosarum & plātaginis clysteribus iniicitur hæc muccago in pleuritide cum aqua tussilaginis aut adianti, aut hyslopi, aut scabiosæ extracta illinitur, & in aliis affectibus cum liquore alio pro variis Medici scopis. Ex gummi item Arabico & tragacantho infusis materia sic lenta educitur, vt ex cæterorum gummium dissolutione. Iniiciuntur autem prædictorum libræ vni aquæ calentis libræ tres, si crassio rem vis chylon: aut 4. aut 5. si aquosio rem, & nocte vna, vel horis aliquot macerantur recalcrafta, & sacculo lineo imposita exprimuntur: baculo interdum etiam batuantur, donec totus humor glutinosus effluat.

*Xoλός* autem etiam succus ex tritis plantarum partibus expressus, vt libr. primo docuimus. Semperuium autem vtrunq; portulacam, maluam, symphytum, buglossum, cotyledon, aloë, telephium, & alia per multa lentore multo prædita, vix succū trita reddere, nisi inter tundendum liquorem aliquem affundas tenuem & aquosum, non crassum & lentum. Aut calatho imposita in cella vinaria herbas tufas aliquādiu in catinum suppositum destillaturas colloques, aut prius quā exprimas, mediocriter calfacias in vase duplici, refrigerationem obtundi times. Quod si liquorem affundas, is

*Li. 6. fa-  
nit. tuen.*

herbæ huius virtutem nō vitiet, sed vel au-  
geat, vel foueat, & feruet. Sic polygonum ma-  
ri præfertim ex loco arido, & quando se-  
mētescit, maioranæ, thymo, saluiæ, rorima-  
rino, foliis lauri, hederæ ex locis aridiori-  
bus liquor aliquis est affundendus his facul-  
tate conueniens, si succum aliquem ex hu-  
iusmodi siccioribus educere libet.

#### CLARIFICATIO.

**C**Larificantur, hoc est, purgantur & puri-  
fiunt, succi quidam per se (residendo  
enim, quod terreum est ac faculentum sub-  
sident) quidam coctione & colatura, quidam  
vt decocta, alia quæ vix sine albuminibus  
in singula decocti libras ferè singulis (quan-  
tis tria etiam sex libris & pluribus sufficere  
possint) purgantur, idq; immisso vel paulò  
antè, vel illico post melle aut saccharo: alio-  
qui & albumina vrūtur, & purgatio parum  
bellè procedit. Quòd si qua apozemata  
aut syrapi, quos vocant magistrales, agari-  
um recipiunt in fine ponendum, albumini-  
bus non egetur. Albuminum loco etiam est  
acetum, aqua vitæ dicta, succus limonum &  
aranciorum. In quibus enim acetum est, de-  
spumentur coquendo, & coquantur despu-  
mando, donec spumam emittere cessent:  
tunc enim clara sunt quatenus eis datū est.

Veteribus non fuit in vsu, sed horum lo-



co-collum panneum, nunc simplex, nūc duplex, interdum etiam triplex, vel rarum, vel densum pro re varia & scopis diuersis aliquo scilicet interuallo, vt trium digitorum: angustissimum verò erat & rarissimū summum, latissimum & densissimum imum, mediocrem amborum medio fixum stabat: si quod facis crassitie obstruclum non patebat, abluendum erat.

Albumina autem ouorum vel in aquam frigidam iniecta scopulis concutiuntur, donec in spumam abeant, quæ particulatim saccharo cum aqua feruesfacto, vel decocto alicui iniiciatur, cum scilicet prior nigrescit, aliam substituendo donec clarescat, vel eadem iniecta primū saccharo cum aqua coquendo, vel decocto alicui, vel simul mistis ambobus (quod frequentius fit) scopulis similiter in spumam agitati multo abeunt, simul coquuntur, donec succidat spuma. Dum verò id decoctū refrixit, modicè quidem si decoctum mediocre habiturum est consistentiam, vel potius liquidæ proximam.

Magis autem, si decoctum futurum est liquidissimum, vt oxymeli, hydromeli, apozemata propè omnia colantur per pannum album laneum semel, & si non sint clara satis, bis & ter.

Quæ

Quæ verò decocta succum habent crassum & lentum, vt qui paulò antè succi lenti & crassi sunt dicti, & syrups & saccharum cum aqua coctum incrustandis seminibus, vel aliis bellariis aptū, calida omnino sunt per pannum colanda.

Æcius & Paulus ebullitionem ad tertie partis consumptionem faciebant ante mellis mistionem, ne, opinor, coctione multa mel amaresceret: id quod Galenus in oxymelite nō metuit, quod tribus aqua, aceto, melle initio simul mistis posse coqui scribit.

## C O C T I O.

*Aris. c. 3.  
lib. 4. me-  
teor.*

**C**octione medicamentorum ferè fit elixando in humore calido, rariùs assando in calore sicco: simplicia enim non modò alimenta, vt radix ari, dracontij, capæ, alij, porri: sed etiam medicamenta in liquorem cui incoquuntur, vim suam transmittunt, & liquores illius virium aliquid adipiscuntur. Ob hæc alimenta & medicamenta acria elixando euadunt mitiora & gratiora (nisi liquore medicamentoso elixetur) ipsum verò decoctum vires simplicium sortitum à medicis in apozema vel syrupum, vel fotum, vel id genus alia vsurpatur.

Quinetiam coctione fiunt antidoti, catapota quædam, olea permulta, vnguenta, cataplasmata, emplastra, & reliqua prope omnia

omnia, quæ libro sequenti composita doce-  
bimus: in quorum multis non solum facul-  
tates simplicium miscentur, sed ipsæ etiam  
substantiæ. Quid quod ellebori radicem  
raphani radici inter cineres assandē im-  
positā, vt raphanus iste purget mitius, quàm  
per se elleborus (cuius rei meminit Galen.  
quos medicamentis purgare oportet, & qui-  
bus, & quādo) elixari dixit Mesues: & scam-  
monium malo cydonio circumdatum, & in  
eo assato coctum, vt ipsum etiam malum  
clementius purget, quàm per se scammo-  
nium. Coquimus igitur medicamenta per-  
multa, vt eorū vires imbecillas augeamus,  
aliorum validas nimis minuamus, aut alie-  
nas in rotum abigamus, vt quoq; ex omni-  
bus etiam facultate diuersis & sæpe contra-  
riis facultas vna cōcrescat & coalescat. Ad-  
hæc ad custodiæ diuturnitatem coctione  
longa quædam siccamus, quædam etiam  
diu coquimus. ob destinatam medicamenti  
formam: vt syrupū diutius coquimus, quàm  
apozema, vel ialep vulgare emplastrū diu-  
tius, quàm ceratū aut malagma. Quæ medi-  
camenta mel liberalius accipiunt, coqui lar-  
gius postulant: & itē quæ paucum mel acci-  
piunt, si his parantur, qui mel & dulcia cete-  
ra auersantur. Nam eo pacto minùs est dul-  
ce, & minùs stomachum eorum qui à melle  
abhor

*Li. 4. san-  
tuend. in  
diacala-  
minte.*

abhorrent, subuertit. Longo tempore etiam coquuntur: ob id initio decoctioni imponuntur aristolochia, polypodium, hermodactylus, & cæteræ radices, semina propè omnia, fructus, ligna (nisi sint aromatica, aut

*Mesues.*

virtute imbecilla, aut superficialia) violæ eadem ratione diu coquuntur, quando vis purgatrix in centro earum posita quæritur: rha barbarum, myrobalani omnes quando astringendum, acerbæ, austera, metallica omnia. Parcius verò coquuntur, quorum virtus imbecilla, aut est superficialia, aut facile ob tenuitatem dissoluitur, aut substantia est parum firmiter contexta, hoc est, rara, ut flos violæ nigræ, si vis leniens quæritur, rosæ, & reliqui propè flores (excepto camemello) epithymum, adiantum album, agaricus, semine cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, rha barbarum, myrobalani omnes, quando per hæc duo, ut rosas recentes purgandum, aperiendum, tergendum. Manna quo-

*Mesues.*

que & cassia, & tamar Indi, & cætera dulcedine, vel aciditate lubrica & humiditate multa purgantia, quia vim lubricandi aut comprimendi in tamar Indis imbecillâ coctio multa perdit. Aromata quoque, ut nardus, costus, amomum, cassia, cinnamomum, iucus odoratus, calamus aromaticus, iris, ladanum, folium malobathri, styrax, bdell-

lium,

*L. 7. metho. & 6. c. ph. p. in diamoro, & 9.*

lium, opobalsamum, xylobalsamum, non *eiusdē, ex*  
 coquuntur: sed cū vas ab igni deponen- *1. antido.*  
 dum est, aut mox vbi depositum est, ini- *in theria-*  
 ciuntur. Quod autem in diacydonio zingi- *ca.*  
 ber & piper post modicam coctionem & le-  
 gitimam despumationem imponit, deinde  
 percoquit ad mellis consistētiā, priori lo-  
 co non repugnat, quia piper non esse aro-  
 ma colliges ex lib. 9. comp. ph. par. Si ta-  
 men hęc maceratione vires in aliquo liquo-  
 re deposuerint, etiam si prius erant euanidę,  
 nunc volunt posse vt liber concoqui, & in  
 liquore firmas & integras seruari, vt in sy-  
 rapo de absinthio Mesuæ.

Decies deferuescente cortina Plinio dici-  
 tur in oxymelite Dieuchis, id est, rebus ipsis  
 decies sufferuefactis, seu post decem ebulli-  
 tiones: sic per alios numeros, vt cū leges  
 apud doctos: Coque donec feruescat semel,  
 id est, vna ebullitione. Coctio cuiq; medi-  
 camento est sua pro variis scopis, citra quā  
 & vltra medicamētum est deterius, pro na-  
 tura simplicium, affectuum, aëris tēperatu-  
 ra & forma constituenda. Nam minūs co-  
 cta quō sunt liquidiora, eò gratiora, sed mi-  
 nūs diu seruari possunt: vt oxymel Galeni  
 multò gratiūs, quā quod officinæ ad mel-  
 liscrassitiē coquūt, vt scilicet diu seruari pos-  
 sint cū illud aëre calido vix dies 4. integrū  
 serua



seruari possit. Sed de gradibus coctionis cuiq; medicamento composito conuenienti dicetur libro quarto in singulis propè cōpositis.

Coctio ad dimidias nullam habet ambiguitatem, siue interpreteris ad dimidia partis consumptionem, siue donec pars dimidia supersit: vtraq; enim oratione res eadē significatur. Sed coctio ad consumptionem duarum partium ex tribus scilicet vt trium ex quatuor intelligēda est, qualis multa hodie fit, vt in syrupis audies. Coctio autem ad secundas, tertias, quartas scilicet partes, & ceteras Galeno lib. 4. sanit. tuendæ in oxymelite vsurpatur ad consumptionem tertie vel quartæ partis: vt oxymeli sit potu iucundissimum, & etiā in febribus nullo caloris metu bibi possit: quæ dos ad mellis crassitiē cocto pharmacopolarum oxymeliti per se non adest. Apud Plinium autem oppositum intelligitur: nam lib. 14. c. 9. sapæ coctio (inquit) fiat ad tertiam partem: & de eadem sap. lib. 23. ca. 2. vult eius coctionem fieri, donec tertia pars supersit, seu donec duæ partes ex tribus coquendo sint resolutæ. Qui coctionis scopus sepe Galeno & Mesuæ exprimitur. Alibi Galenus hunc scopū neglexit, vt in diacodio, cuius finem coctionis esse vult non tertiam aut quartam, aut omnino

ral

talem aliquam aquæ partem relinqui, sed cum primum capita coquendo in aqua intabuerint. In stomaticis & stomachicis, & *In fine lib. 6. sanit. tuend.* aliis multis sumendis scopum coctionis statuit mellis aut sordium crassitiem, in multis dum manu tractatum digitos non inquinat, nec ipsis hæret. Sed hi coctionum scopi in singulis compositorum generibus libro sequenti plenius explicantur.

## A S S A T I O .

**Q**Uæ assando in vitro, sartagine, alio vase, vel patella, vel prunis, vel cineribus coquuntur, non admodum multa sunt: neque enim raphani radix aut malum cydonium propter se assantur tantum, sed multo magis ut vires illa ellebori, hoc scammonij coquendo trahat: assando verò propter se coquuntur Medicis. Cuminum modicè frigitur in vase fictili, quod coctum in camino quàm optimè fit ad diospoliticum. Erysimi semen tostum valentiùs fit, lib. 7. comp. ph. part. Scilla assatur in lienosis, libr. 9. comp. ph. part.

*Lib. 4. sanit. tuend.*

Alia non pauca Medici assando seu (ut vocant) torrefaciendo præparant diuersis rationibus. Quædam enim ut sicciora facilius ad leuorem terantur, ut gummi, traga cantham, herbe, radices, flores, ut rosæ, crocus, ubi celer usus pulueris requiritur: cro-

cus etiam papyro impositus igni vel sole  
 ficcatur. Sericum Arabibus torretur, vt pul-  
 uis fiat. Psillium vulgò, nuclei pini, & bdel-  
 lium torrefiunt Andromacho, libr. 6. com-  
 posi. pharm. part. Sic sideritem & perdicia-  
 dem assat Galenus lib. 5. comp. ph. p. in suo  
 dentifricio.

Quædam vt vis eorum per ignē augea-  
 tur: vt scilla tosta & in sartagine frixa ma-  
 iorē assumit acrimoniam, humiditate lar-  
 gius absumpta, ob id purgātior euadit. Scil-  
 lam grādem luto circumdatam torret Cry-  
 sermus, & corticem, ac quod in fundo du-  
 riusculum aufert, & πυρήνα, id est, nucleum,  
 accipit, lib. 9. ph. p. in splenicis.

Quædā vt vis eorum minuatur, sic cr-  
 pa, alliū, ari radix sub cineribus assa, minū  
 acria & magis vesca euadūt. Sic as si fructus,  
 vt poma, castaneæ flatus deponunt, quomo-  
 do elixū hordeum, & alia pleraque præter  
 fabas, nisi iis acria, vt cæpas misces. Eadem  
 ratione opium & meconiū obeius narco-  
 ticam malignitatē Apollonius & alij qui-  
 dam insignes viri torruerunt: sed quia tor-  
 rendo omnis eius in stupefaciendo sensum  
 efficacia aboletur, nō tostum Galenus ma-  
 uult castorij caliditate obtundi. libr. 3. phar.  
 part. Sic psillium assando ficcatum minū  
 aluum subducit Arabibus, cū ei solam re-  
 frigeran

frigerandi facultatem Græci dederint, non etiam lubricando purgatricem, multò minùs causticam in medulla ipsius conditam: quæ Arabum somnia videntur.

Alia virtute duplici, & interdum repugnante prædita, assando facultatem vnam vel perdūt, vel minuunt, alteram intēdunt, vt myrobalani & rha barbarum assando vim purgatricem amittunt, astrictoriā augent: & balanus myrepfica, id est, ben assando vomitoriam facultatem in humiditate nitrosa largiore positam deponit, deiectionaria remanet, vel hoc valētior, quòd à vomitoria motu contrario non impeditur.

Vt rara, aut virtutem imbecillam vel superfluariam sortiti decoctionem longam non sustinent: sic neq; longam assationem, quæ ex illis assanda veniunt, non autē vrenda sunt, ne ipsorum facultas corrumpatur.

## V S T I O.

**Q**uòd si assatio fiat maius quàm conueniat, à calore sicco adustio est *Ari.c.3.*  
 maioris tantum ratione ab assatione differens: nisi hoc etiam quis ad amborum discrimen congerat, quòd vrendis simplicibus multis, vt terreis, metallicis, alia quædam miscentur, quæ vel flammæ edant, vt sulfur, sal petrae, mel: vel ignis vim celerius in vrendum corpus deducat, vt pro sua na-

*li.4.mete.*

tura ipsum corpus alteret, hoc est, rarius, leuius, tenuius, purius, splendidius, acrius, siccius, calidius efficiat.

Vrendorum medicamentorum cause sunt variae: quædam enim vruntur, quò sicciora reddita & solutiora, læuigari & tenuissimè comminui possint, pili, lana succida, testa ostreorum, buccinorum, purpurarū, vngues & cornua multorum animalium, & ossa & coria, & alia, quæ vel ob terrosam duramq; corporis cōsistentiam & concretionē condensatā sunt fortita, & partes impēdio crassas, quia ab ea vim quandam cogendi, vel ob lentorem immodicum, aut humiditatē aliquā vsui esse non possunt. Sic enim rectè vngues caprarum vsti ex aceto alopeciiis illinuntur: & vngues asini, & cranium hominis vstum ad epilepsiam bibūtur: & ossium aliorū cinis ad arthritidem: & cornua cerui & capræ vsta veniunt in dētificia: & testæ ostreorum in emplastra: pompholix & hæmatitis in collyria. Nitrum si lapidosum est, vri vult Gal. libr. 8. metho. vt ad frictiōnem sit aptius.

Alia verò vruntur, vt essentiaē crassitiem deponāt, & tenuitatem induant, aliāsque facultates igneum calorem sequentes. Metallica vrendo tenuiora euadunt, sed etiam ignis commercio mordacia & rodentia: elota



elota autem rosionem deponunt, & lenia prorsus redduntur. Arsenicum vstum & non vstū est causticum, sed vstum tenuioris est essentiae.

Gypsum vstum tenuioris fit essentiae & siccantius, quā non vstum, & fit minū emplasticum. Pumex vstione tenuitatem & aliquid acrimoniae acquirit, quam lotionē deponit. Cornu cerui & caprae vstum terget. Cinis corij veterum calceorum *Hac lib. II. simpl.* siccet vlcera. Pili & lana succida vruntur, vt acris, calida sicca, tenuium partium fiat.

Testa ostreorum & cætera terrea vruntur, non modò vt in puluerem minui possint, sed etiam vt tenuioris sint substantia, & cogendi quandam facultatem deponant, & cōtrariam digerentem accipiant. Cinis radicis asphodeli magis calfacit, siccet, tenuat digerit.

Abrotanum vstū, anethi radix, & anethū *Li. 6. simplic.* ipsum, *κολοκύνθη* vsta siccandi vim magnam *Ibidem.* acquirunt, & abrotanum etiam mordendi.

Alia vruntur, vt vis quædam nostro scopo aliena in superficiem trahatur, postea lotionē separetur, quo fine hæmatitē & pompholygem sæpe vrunt, & lauant ophthalmici, & Galenus lapidem Phrygium, vt possit leges. *Li. 9. simplic.*

Alia vruntur, vt colorē nouum induant *plac.*

ægro gratiorem: sic ærugine vsta Galenus emplastra faciebat melina, id est, coloris mali cydonij, quòd viridis multos terreret. Sic cerussa trita vsta, rudicula ferrea mota trāfit in sandyca, & fit rubra, vt ochra & auri-pigmentum: & ossa multum vsta albissima fiunt, & cornua cerui potius quàm capræ vsta dentes dealbant sua substantia, non sola vi deterforia sine morfu, quam vtrunque vstum obtinet.

Alia vruntur, vt in aliā trāseant speciem: sic ex viperis vstis sal fit theriacus: ex cinere brassicæ aut betæ, & aliorū sapore nitroso præditorum, fit à quibusdam nitrū: ex calce vsta & fæce vini vsta cauterium: ex antimonio vsto, sulfure vsto, cerussa vsta, calciti vsta, oleum. Sunt qui aloën, acaciam, bolum Armeniam, opium, & alia quædam adurāt, sed paruo aut nullo successu.

Vrendi modus non est omnibus vnus: quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana, cornua, vngues, ossa coria, hirundines, & aues quædam aliæ, viperæ, & alia quædam pedestria. Et hæc in olla noua operculo foraminulento tecta sunt vrenda, præsertim cū cinefacta disperdi possunt: quæ verò etiam vsta manēt integra, vt vngues, ossa, cornua, hæc etiam viuuis carbonibus tradi possunt, nisi quædam

dam sunt addenda, quæ vim eorum mutant:  
tunc enim etiam in olla noua vruntur: sic vi-  
peras cū substratis quibusdam medicamen-  
tis Galenus vrebatur ad salem theriacum.

Alia materiam aliquam inflammabilem  
requirunt substerni, vel aliter misceri, ad-  
ipes, resinas, olea, ceras, mel, sulphur, & id  
genus alia, vt libro secundo Pharmacopœ-  
e ex Dioscoridis libro quinto & aliis  
abundè explicabimus. In præsens verò suf-  
ficere existimaui, causas vstionis, & mo-  
dum vrendi proponere, quem vno Gale-  
ni exemplo indicare nõ fuerit alienum ex  
libro 4. composi. pharmac. partic. Vritur  
(inquit) lapis Phrygius ad oculorum sani-  
tatem, in minuta confractus frustula, ma-  
gnitudine nucis auellanae, & in ollam re-  
centem iniectus, luto deinde extrinsecus  
circumlito, vbi operculum imposueris per-  
foratum, vel in solo vertice, vel (quod  
est melius) etiam pluribus aliis partibus,  
vt fumosi & fuliginosi effluxus eorum quæ  
vruntur, per ea foramina efferantur. Vbi  
iam lapis totus euaserit ignitus, in vas pu-  
rum ex olla traducto buryrum superfun-  
de recens, agitādo lapidis vsti particulas. Id  
fac, donec extinguantur omnes; & tunc ces-  
sa. Rursus ollæ redditū vires iterū carboni-  
bus perustis, vt nihil fumidū habeant, sem-

*Libr. II.  
simplic.*

per euentilando, vt citius combustio absol-  
uatur. Vbierunt igniti, nec vlla amplius fu-  
ligo emergit, effusos lapides restingue vi-  
no falerno, aut quodā rubro & odoro. Ter-  
tio vre vt prius, & vbi ignitus erit, extingue  
melle Attico non largo. Sic alia multa sunt  
comminuenda, & ollæ imponenda, non ta-  
men omnia toties vrenda. In quo exem-  
plo obserua operculum cum vase lutari, &  
ipsum esse foraminulentum, & carbones  
perustos, & à materia, in qua extinguitur,  
igni rarefactum corpus, vires quasdam ocu-  
larias in sese trahere.

## L A V A T I O.

**M**edicamentorum lauandorum scopi  
sunt quatuor. Primus, vt partes eo-  
rum impuræ tollantur, qua ratione herbe si  
puræ sunt, etiam si intybus est, aut sonchus:  
radices, multa semina, metallica lauantur  
aqua pura & fontana: nec metuas cū Mesue  
vim superficiariam dictarum herbarū hac  
lotione dissipari, quod in rosis & floribus  
aliis metui potest: sed hi ferè puri sunt, neq;  
lotionem requirunt.

*Lib. 4. cō.  
ph. part.*

Secundus, vt facultas eorū velut in pro-  
fundo merfa & parum efficax sit euidentior.  
In cadmia etiam non vsta, & aliis quibusdā  
tergendi vim occultam lotio detegit: sic  
aloë lota ventrem magis roborat.

Tertius

Tertius est, vt virtus medicamenti malefica, vel nobis in affectū præsentem incommoda tollatur, & quæ expetitur, maneat: sic vsta omnia si lauentur, moderatiora fiunt, & acrimoniam vstione acquisitam depouunt, ac minus mordacia redduntur, sed ignea illa natura in aquam deposita ipsam efficiunt tenuem & calefacientem: quod vero terrenum remanet, morsus expers vlceribus humidis fit epuloticum. Ob id æs vstū acre & subastringens lauari vult, vt cicatricem inducat in carne molli: in dura enim est epuloticum citra lotionem.

*Lib. 7. method.*

*Li. 9. simplic.*

Calcanthum vstum & lotum fit moderatius, lib. 4. comp. ph. part. & chalcitis, pompholyx, os sepiæ, & id genus alia sunt abluenda, præsertim cū vlceri, vel oculo, vel parti alij insigniter sentienti acrimonia mordax est noxia. Testa ostreorum, buccinorum, purpurarū, vsta & lota vlcera caua & fistulosa, & ob fluxionem diuturna carne implet.

Ceruinum cornu vstum lotumq; dysenteriiis salubre.

*Li. 11. simplic.*

Semen vrticæ succo tragacanthi lauat Mesues, ne deuorando fauces & œsophagum adurat, cū tamen non vehementer calfacit Galeno, neque mordicet, sed tantum essentie tenuitate & detergendi facultate titilet, ac ventrem subducatur. Quod ve-

*Li. 6. simplic.*



rò partes vrtica herba contextæ pruriant, id punctura fit aculeorum minimorum, quibus tota hæc armatur, magis & minùs, quos non sentias, si inferne sursum præhēdas: sed contrà sentias maximè. Eodem succo aloën

*Ibidem.* lauat, ne hæmorrhoidas excitet, vsu multo & crebro.

Lauantur eadem ratione plurima citra vstionē acriat: acaciam lauat Galēnus, vt acrimonia per lotionem deposita siccet sine morfu. Oleum quoque, picem, resinam, ceram, & alia permulta lauat (quod post audies) vt morsus & acrimoniæ sint expertia. Gummi Arabicum in aqua lotum ad arteriacen vult Andromachus, libr. 7. composir.

*Lib. 7. method.* pharm. part. Aloë lota minùs vacuat, magis ventrem roborat. Lacca lota minùs soluit, magis aperit obstructions ventriculi, hepatis, lienis.

Cyanus & lapis Armenius lotionē vim vomitoriam deponunt, & purgandi molestiam deiectionem retinent.

Quartus deniq; scopus abluendi medicamentum est, vt à liquore facultatem aliquā nouam acquirat: vt si succo tithymalli aut decocto medicamētum aliquod lauas, eius vires in se transferat: sic aloë lota decocto aromatum stomachicorum ventrē potētius roborat. Turbith decocto agarici lotum

aut

aut infusum valentiùs est purgatorium pituitæ: decoctum scammonij, tithymalloorum, & aliorum id genus in se lotis vim suam largitur. Aqua vel vino albissimo lauantur metallica ad emplastra alba. Aqua lauantur, si affluens in vlcus humor est acer & mordax. Vino austero, si humor affluit largior: aceto vel aqua marina, si vlcera sint tumida, & cum oris crassis & callosis attenuationem multā requirentibus: sicque in reliquis est liquor mutandus pro affectus & partis natura, & aliis indicationibus curatoriis. Sic calida succo refrigerante, vt cucurbitæ, lota frigiditatem deposita aut saltem diminuta caliditate induunt. Contrā verò frigida succo calfaciente lota & in cæteris ad portionem: quomodo in decoctionibus diximus.

*Lib. 1. cō.  
ph. gen.*

Lauandi autem modus is est Galeno, vt quæ calfacta liquantur, nec possunt aquæ misceri (qualia sunt oleū, cera, pix, resina, & alia quædā) modicè calefiant, ac mox infundantur in vas magnū oris lati, semiplenū aqua purissima omnis qualitatis experte (quādo scilicet medicamento nullam vim nouam addere volumus, sed in tantum purgare, aut facultatem eiusmersam detegere, aut noxiū tollere) sed quæ ex sole vel igne tepeat. Tum id corpus lauandum in aqua ipsa teritur,

*Li. 2. fin  
cap. 15.*

tur, tunditur, frangitur, subigitur manibus, ut vnaquæque medicamento abluendi particula aquam tangere possit, & in ea suam acrimoniam exuere. Denique aqua hac effusa, in synceram aliâ vasi infusam recalcata ipsa medicamenta immitte: rursus admodum diu contunde: mox idem tertio, quarto, ac sæpe deinceps faciendum, donec omnem suam qualitatem in aquam deponat medicamentum, seu donec aqua nullam ex loto medicamento qualitatem amplius recipiat, quam rem gustu, colore & odore cognosces.

Oleum hac ablutione non modò mordacitatem & fæuginem exuit, sed etiâ fit candidius, aquea ac rufa eius substantia separata ac deterfa: ipsum tamen lauâdo minus verberabis, quàm cerâ, picem, resinam, ne adeo aquæ misceatur, ut a grè postea separari possit: sed ita verbera, ut dum quiescere paulisper fueris, innatans detrahère possis: non falsum verò & omphacinum lotionem non admodum indiget.

*Ibidem.* Quæ verò lapidosa & dura sunt, ut cadmia, æris squamma, æs vstum, ea tenuissimè contrita ex aqua fontana & purissima multum diuque teruntur, ea aqua subinde effusa, & pura in eius locū affusa, quoad nihil sordium medicamento in aqua innat

innater, maneâtq; aqua medicamēti quali-  
tatum omnino expers. Quandiu enim ali-  
quid eius aquæ ipsi innatabit, aut qualitatis  
eius quidpiam sensui apparebit, tam diu re-  
rendum & effundendum. Sic lithargy-  
rum, diphryges, cerussam, misy, fori, stym-  
mi, & omnes lapides, prætereà calcē lauari  
vult Galenus lib. i. cōp. ph. gen. non tamen  
semper aqua, sed etiam vino, vel aceto, vel  
aqua marina, vel alio liquore, cui metallica  
& terrea ob innatā grauitatem facilē sub-  
sident. Vult autem hæc toto die cum liquo-  
re illo medicamentofo contrita per noctem  
in eo relinqui: postero die manē illum abii-  
ci, & alium mox superfundi: postea rursus  
similiter teri, & sequenti aurora liquorem  
iterum effundi: idq; fieri donec morsus sint  
expertia hæc metallica: & sordes nullas in  
aqua relinquant, sintq; pura & perspicua.

Quod si hæc æstate sub sole feruenti la-  
ueris, medicamentum potentiùs siccabit, te-  
nuius erit & albius.

Lauandi scopos quidā numero definiūt,  
vt pompholygem & hæmatitem vtendā in  
collyriis oculorū septies lauāt ophthalmici  
medici. Armenium lapidem & cyaneum  
etiam quinquagies Alexand. Trallianus &  
Mesues aqua buglossi lauant. Alia diutius  
vel parcius lauanda pro ipsorum facultate,  
subst

substantia, & medici indicationibus.

DESTILLATIO.

**D**estillatio est humoris alicuius à planta, animali, terreo, vi caloris facta extractio. Destillatio veteribus intentata, neotericis vsitatissima propter hominum huius ætatis mollietatem, aut nouorum morborum malignitatem, præcipuè inuēta naturæ imitatione, quæ in maiori mundo vi solis & astrorum & caloris in terra conditi vapores ex terra, præcipuè aqua & aquosis in mediā vsque aëris regionem educit, cuius frigiditate densati in nebulā coguntur, aut nubem, quæ soluta in pluuiam, niuem, grandinem destillat. Eadem in homine (vt animalia quædam alia catarrhis quoque obnoxia omittam) minore mundo, ex spiritu, humoribus, solidis partibus, cibo, potu, caloris aut natiui, aut etiam aduēritij vehementia vapores tollit in cerebrū, cuius frigiditate densati in pituitā coeunt, substantia, quantitate, odore, colore, sapore, tam variam, quàm vaporis elati & cerebri cogentis varia est natura: vt omittam, quòd ei ex morā in cerebro, & sæpe ex putredine vitium accedit. Tollitur autem vapor hic maximè à partium subiectarum, vt hepatis, cordis, ventriculi, sanguinis totius, calore: ex humore non minimum tamen trahitur



hitur & à capite calidiore, aut natura aut p  
tegmina multa, crassa, dēsa, aromatibus far-  
ta, perque solis & lunæ radios præcipuè per-  
pendicularares, aut his proximos. Collectus  
postea in cerebro hic humor, dum quanti-  
tate aut qualitate, aut vtraque ipsum mole-  
stat, à vi eius expultrice detruditur, nunc  
quà data porta in partes subiectas, nunc in  
nares, meatus purgādo cerebro à natura in-  
stitutos, nunc verò calore interno vt per fe-  
bres: nunc externo, vt per æstum liquatus  
fluit: nunc à frigore externo compressus.

Cum autem dixi, ex terra & solidis parti-  
bus tolli vaporem, ne terram intellige ele-  
mentarem, siccissimam, durissimam, & ossa  
iā planè terrea, aut partes alias in nobis con-  
tinentes siccissimas, sed terram nobis noris-  
simam, ex elementis 4. conflatam, & in qua  
humoris aliquid inest: partes item solidas  
nondum exuccas. Quando vapor mediæ  
inter aquam & aërem naturæ non tollitur,  
nisi ex corporibus humiditate aliqua prædi-  
tis, isque solum vi caloris alicuius.

Hanc separandi à re aliqua humoris ra-  
tionem imitata mortalitas, humida cor-  
pori (sic enim vocant latius vas, à quo va-  
por tollitur) imposita vi caloris tenuat  
in vaporem, qui capitelli, vel alterius fri-  
gidityate coactus in aquam alueolo in mar-  
ginem

ginem capitelli inferto ferè excipitur, mox per nasum (sic enim etiam vulgò vocant capitelli partem, naso nostro figura & vfu finitimam) in subiectum vas (receptorium & matellam dicunt) aliquod destillat: sed aliæ sunt & vasorum destillantium & humorum species, de quibus postea fusiùs.

Planta ergo aut corpore alio ad destillandum composito, pars eius quæ tenuari est aptior (quæ scilicet natura tenuior, leuior, rarior, liq̃dior, superficialia. magis) illa primùm vi caloris tenuata tollitur, postea alia illi natura propinqua: postremò id quod ceu humidum rei substantificum terreas partes glutinans, pingue & oleaginum vi ignis validiore separatur, integrumq; attollitur: quo omnino extracto, velut cinifactũ corpus & dissolutum cernitur.

Quomodo calor in nobis valentior spirituofam primùm humidamque substantiam, & recentem, tum carnem, tum adipem dissipat, deinde veterem, postremum insitum ipsum humorem absumit ignis modo in lignis vel candelis, cineritias ac terreas faciens reliquias.

A plāta igitur omni & animali ac omnibus vtriusq; partibus aqueum aliquid crudum, ac velut pituitosum excrementosumq; primùm extrahitur, mox coctius & tenua-

tum:

tum magis, postremo oleaginum, quod etiam ex ossibus ipsis extrahitur, non modò ex aliis partibus solidis, nisi quòd quædam essentia tenuioris vires propè vniuersas remittunt primas. Quin & chymistæ etiam ipsa elementa ex corporibus simplicibus sese vi ignis separare affirmat.

*Arnoldus de vil  
la noua.*

Porro hæc omnis humorū extractio calore perficitur. Nam quæ per licium, penicillū (filtrum vocant) arenas, vas figulinum crudum, cissimbium, id est, vas hederaceum, fit humoris transmissio, destillatio non fuerit, nisi abusiue loquentibus.

Calore enim propriè dicta destillatio perficitur, & eo vel à sole, vel ab igni, vel à putredine. Vidi & à vino in lacu feruente, & à puteis cellisq; vinariis, ac aliis locis subter raneis per hyemem elatum vaporem in operculo, qualiter in olla vsuuenit, concreuisse in aquam, quomodò per hyemem animalium exspiratio in proximis corporibus in pruinam cogitur. A sole flores magna quorundam industria aquam reddunt, floribus ipsis odore & gratis qualitatibus aliis proximam.

Ab igni autem, id est, à flamma, quæ ex aëre, & aëris corporibus producitur, vel à carbone ignito, qui fit ex terra vel terreis corporibus accēsis, destillatio fit vel nullius

alterius interuentu, vel mediis aquis feruentibus, vel etiam ab his vapore, cineribus, arenis tenuibus, scoria læuigata.

Flamma præterea ipsa vti & carbo non parum variat, non solum maioris & minoris ratione, sed etiam lignorum vel putrium, vel graeolentium, vel beneolentium, & integrorum vel viridium, vel siccorum. Adde quod clibani magnitudo, & figura, & connexio magnam vim habet caloris mutandi. Præter hæc carbo ex suffocatis & semiustis lignis graeolentiam & qualitatem quandam alienam rebus destillandis, vt coquendis & aliter præparandis imprimat: quomodo qui accenditur in panibus corticeis, quos coriarij confingunt, & qui ex carbone terræ, & qui ex cespitibus, & qui ex siccatis stercorebus etiam bubulis. Sicut igitur carbones omnino accensi & semiusti, vt ex eis malignitas antè expirauerit, quam his res destillanda committatur, præsertim si in corpus est recipienda. nam ad mouendorum ratio minor habenda est.

Præterea aquæ feruentes, aut ab his vapor mitius agunt in rem destillandam, quam vel ignis ipse per se, vel etiã per media alia sicca prædicta. Ob id vt Galenus in diplomate, id est, vase duplici (balneum Mariæ vocant cum chymistis pharmacopolarum) liqui

liquat, calfacit, coquit ea quorū vires ignis violentia dissipari non vult: sic quæ mitia integriora volumus, in aquis feruētibus imposita destillamus, vel earum vapore. Quæ quamuis minū duratura putantur, sunt tamen minū à sua natura mutata, quam rem odor pristinus declarat. Fornacem huius generis habeas, cui vas æneum grande superponatur aqua plenum: ei verò vasi æneo vascula in arcum superponantur quàm plurima possunt, in quorum fundo res destillanda infit. Alij aliter fornacem velut in arcem scilicet extruunt, & eius lateribus vasa inserunt terrea, longa, fundo latiore res destillandas continente intrò penetrante, ore foris tanquàm lagena operculato, in qua vapor per apertilem eius ventrē elatus concrefcit, per os eiusdem prælongum destillat. Talis est Godofredo Cochuo Medicorum Parisiensium viatori optimo, ac diligentissimo pharmacopola. Quæ denique destillatio à putredine fit vel fimi equini tam solius quàm cum calce paulatim irrigata & sæpe mutata, vel corticum humectatorum, vel aliorum putrentium, ut chymistis fuerit in multis utilis: medico tamen non est recipienda, propter causam in lignis putribus & ex putredine vel alia de causa graueolentibus, si præsertim intra cor-



pus est recipienda. nam admouēdorum minor habetur ratio.

Faciēda igitur destillatio medicis vel sole, vel igni per flammam lignorum integrorum, vel carbonum iam ardendo semiuistorum, maximēque in vase duplici, aut aquae bonae feruentis vapore, praecipuē quoties sumenda destillantur.

Quoniam praeter haec variāt multum ut cocta sic destillata vasorum ratione, magna in his cura est adhibenda, ut terrea sint vel vitrea potius quā metallicā: & quae terrea sunt, ex luto sint puriore, & diligēter cocto, qualia sunt figulina nobis Bellouaca, & Britonia, & Hispanica. Vitrea autem sunt praestatoria, quia puriora & densiora, sed etiam chariora & fragilia magis, nisi paulatim in calecant & refrigeretur. In quo etiam discrimine sunt terrea. Ob id utraq; luto sapientiae, quod vocāt, paulatim vndique circumlinunt, & siccant, quantum vasis eius, ignis violentiam attingere debet, etiam si cineribus, arenis, scoriis primū excipiēda sit. Nam quae aquis aut ipsarum vaporibus insident, vasa munimento nullo indigent.

Metallica verò, plumbea, ferrea, aerea, stannea, argentea, aurea, cur damnum, in promptu Galeni ratio est, in singulis prope horum metallicorum generibus. Si enim  
aqua

aquam plumbeis tubis delatā affirmat dysenteriam generare, quis metus ab aquis receptorio & capitello plumbeo destillatis?

Adde quòd cerussa non pauca in superficie iterna plumbei capitelli vt aceto destillando colligitur, sic vi empyreumatis cum vapore plerunque etiā acri, nempe ex plantis acribus, ascendentes, ea quæ aquas ipsas inficit, & magna parte lacteas reddit, donec subsederit. Ex cæteris metallis, quæ vel ferruginem vel æruginem gignunt vasa, tantum habent periculi, quantum ferrugo & ærugo nocetior cerussa. Purgatiore argento & auro facta vt sunt innocentiora, sic paratu ob sumptum magis difficilia.

Neque corporum quæ vocant, neque capitellorum ( quæ alembica dicunt ) vna omnibus ad omnes succos destillandos est forma. Nam aqua trahitur quibusdam ex vino imposito in vas æneum magnum igni incubans. Cui collum crassum tripedale inest, & collo huic insidens capitellū etiam æneum in pyramidē fastigiatum, ambiente id velut situla aquā frigidam continente, vt celerius vapor largus à capitello refrigerato densetur, & ne ignem sic referat aqua vini. Aliis loco colli & capitelli vaporem excipit fistula ex ferro albo vel alio metallo, prælonga in multos anfractus

mœandrorum modo & serpentum contorta (vnde ei vulgò serpentina nomen est) in aquam magna sui parte imersa,

Aliis alia quoque est forma. Sic quæ corporibus seu corpulentis vasis non erectis, sed velut cubantibus imponuntur capitella limbo carent, suntque lagenis terreis vulgaribus proxima.

Interdum capitelli forma est, ut dixi, in acutum pyramidis modo mucronata, interdum parte summa capitis modo latefcit, ut plus vaporis capiat, & largiorem aquam cogat, sed tunc ferè in vas corpulentum ex vertice relabitur.

Alij vtriculos vitreos aut terreos mutuò applicant (quos musas cornutas vocât) quorum alter lutatus igni infidet, materiam destillandam continens: alter ab igni procul abest, humorem recipiens, in ambobus collis concretum.

Est quando per descensum fiunt aquæ & olea quædam, quomodo ex resinosis arboribus vrendis pix.

Sunt verò formæ vasorum aliæ prope modum infinitæ, præsertim chymistis usurpatissimæ, de quibus plura dicere superse-  
deo, præsertim quòd intellexerim Ioan-  
nem Baptistam Montanum Veronensem  
medicum doctissimum in id opus magna

cura

cura præcipuóq; studio incumbere, vt habeat Medicus, quæ remedia ex metallicis corporibus, & aliis arte fusoria & sublimatoria vires habent præstantissimas & efficacissimas, ad morborum pertinacissimorum curationem.

Vidi & capitella duo, vt per inferius pertusum materiæ portio in superius ferretur, quod cum inferiore clauiculatim iungebatur, ne inferius lutatū esset auferendū, cum recens materia vasi corpulento erat infundenda. Hæc autē destillata vires simplicium à quibus separantur, retinent: nisi quod tenuiora & valentiora fiunt, quò frequentius destillantur: quod in aqua vini ferè experimur, rarò in aliis.

Huius liquoris vires quidam alterant vel illito capitello aliqua materia, vt melle, ladanò, aliis: vel ea naso imposita, quod ferè fit ad odoris gratiam: moschum enim caryophyllos, caphuram, id genus alia nodulo ligata summo naso impingunt, vt per has materias transmissus liquor odoris suauitatem contrahat.

Vt verò empyreuma quod his inest paulatim expiret, satiùs fuerit phialas, quibus hi liquores seruantur, apertas aliquādiu tenere: obseruando tamen, ne interim odoris gratia, & cum ea virium multum exhalet.

Haftenus quæ per ignē fit medicamentorum præparatio diximus, & quæ per lotionem obiter expreffimus, quòd vfta ferè lauantur, & quæ alia præter hæc lotionem requirunt, magna parte ignem aut solem quoque postulant. Nunc dicendum qualis eſſe ignis debeat, & ex qua materia.

Carbones iam peruſtos vult Galenus in vrendo lapide Phrygio, libro 4. compoſit. phar. part. ne quid fumidum habeant. Vtq; emplaſtrum ex lithargyro fit albius, eligit idem oleum purius, lucidius, & aquam puram & candidam, Eadem lignis peruri coëptis vel peruſtis antè carbonibus exactè incenſis coquit in aëre ſyncero, ſub dio, in ſole, quia oleū craſſum, aqua turbida, aër nubilus, vmbra, fumus, medicamēto nigredinem facile conciliant. Quæ cura in his ad-mouendis, & horum tantum colore naturam rei parum mutante, tãta Galeno adhibita, nos magnoperè admonet noſtri officij, vt ignis & aëris in coquendo etiam ad-mouenda, multò magis ſumenda, rationem magnam habeamus. Hac ratione theriacenſarmentis vitis percoquit, quæ etiam boni ſunt odoris. Sic antidotos ſtomaticas, ar-teriacas, ſtomachicas, & alia omnia coquit in lib. compo. phar. ſuper carbones accen-ſos, vel igni ex lignis ſiccis, & ob id ſine fu-

*Libr. 1. c.  
ph. g.*

*Li. theria  
ces ad Pi  
ſonem, &  
li. 1. anti.  
Libr. 7. c.  
ph. par.*



mò: quia fumi acrimonia præterquàm quòd nullius in his est vsus, etiam incommodat suo morfu.

Tali quoque igni mel despumat, & cum tenuissimo puluere trium piperū anisi, thymi, zingiberis ad finem addēdo percoquit, libr. 4. sanit. tuendæ. Est enim despumatio hæc non mellis solùm, sed etiam aliorum quæ coquuntur, præparationis species per ignem facta. Mel enim curiosius despumatum miscetur compositioni dia trion pipe- *Li. 4. san. tuendæ.* reon, & diospolitico theriacæ, Mithridatio, *Libr. 7. c. ph. part.* & aliis, quia verò mellis acrimonia est pauca, & utilis in arteriacis, retinetur.

Nec satis est ignem ex carbonibus accēsis omnino aut ex lignis ob siccitatē ἀκαρ-  
 वोῖς, id est, fumi expertibus fieri ad rectam medicamentorum compositionem, ne odor scilicet teter ex contrariis in medicamen-  
 tum transeat, sed in multis quoque & ἰμύ-  
 γωμα, id est, ignea vel qualitas vel substan-  
 tia vitatur, maximè in his, quibus vis est re-  
 frigeratoria. Vitatur quoq; virium in te-  
 nuī substantia positarum facilis per ignem  
 dissolutio. Ob id medicamenta, in quæ cau-  
 tiones hæ cadunt, in diplomate seu vase du-  
 plici (de quo postea quoque in instrumen-  
 tis pauca dicēda) coquimus: quod balneum  
 Mariæ vulgò cum chymistis vocamus.

*Ibidem.* Omnes arteriaca, quæ vim mitigandi, leniendi, digerendi habent, optimè in diplomate, id est, vase duplici coquuntur carbonibus aut lignis perustis, ut in magno lebetes aqua calidam infusam habente, vas alterum continens medicamentum coquendum collocetur: *Ibidem.* ut si arteriacam coquis ex melle & terebinthina coqui in vase duplici ad spissitudinem quam coalescat: deinde galbani obolos tres adde & coque donec manus non inquinet, deinde refrigerato lauia cætera misce.

Sic coquendum oleum anethinum Galenus vult, lib. 4. sanit. tuenda: & chamaemelinum, & acopum abietinum, & *δι αινέου*, Et semina, ac flores cum dies 40. vel duos, tres menses oleo maceramus, & ei ceram & resinam liquando miscere opus est, in diplomate miscemus.

*Lib. 5. c. 5. pha. p.* Oleum lentiscinum recens in vase duplici est tepesciendum ad sedandum dolorem phlegmonarum in gingivis, tunica linguæ, cute totius.

Aromatibus quoque ad saporis vel odoris gratiam, & sæpe vires maiores condiunt medicamenta, usque nunc simplicibus, ut amomo, casia, cinnamomo, ambra, moscho: nunc compositis, ut alipta moschata, gallia moschata, pulueribus aromaticis, electariorum quorum exempla non pauca in componendi ratio

ratione per ea quæ melius compositū reddunt, audiuiſti: multa quoque libro ſequenti auditurus.

**T** Erere ſeu tundere eſt cōminuere crebro percuffu, nō ſolūm humida, mollia, & virentia, ſed etiam ſicca, ſic vt hæc in puluerem abeant, vnde Plinio trita in farinam & tuſa cribratāq; dicuntur: quanquā hoc poſterius etiā de humidis intelligi poſteſt, quæ trita per cribrum vi cochlearis aut rudiculæ aut manus cernūtur: ſicca verò trita cribri ſuccuſſione deſcendunt. Vtrunque humidum & ſiccum ſcilicet λαίναν Græci dicunt, id eſt, læuigare, ſeu læue & politum reddere, & in puluerem tenuem cōminuere, & cum vino vel alio liquore multum ſubigere: vulgus batuere, pilare, piſtare, vt herbas, fructus, ſemina, radices, ligna, & cætera tam mollia, quā dura. Succī tamen lenti gummiū modo, vt galbanum, hammoniācum, ſub piſtillo dilatantur magis quā læuigentur. κόπην etiam, id eſt, ſcindere in pila, & tundere herbas, radices, & ſemina li. i. antidot. in theriacis præparatione.

Τρίβειν quoque, id eſt terere non tantūm in puluerem comminuere, ſed etiā de viſiſſis, de bdellio, & vino, & myrrha, & aliis ſimul tuſis & per ſe dicitur in libr. compoſi. phar. part. & g.

Vtq;

Lib. 6. cō.  
pha. part.

Vtq; illa patent latius, sic quæ ad purgationem horum pertinent: nam lib. 9. comp. phar. part. *σικκνίσας τὸ ὑγρὸν*, id est, vbi sacco transmiseris liquorē, quod hodie de farinis & siccis ferè vsurpatur, vti saccus pro cribro & incerniculo magis siccorum quàm humidorum. *τὸ ὑγρὸν ὀθονίῳ διηθείσμεν*, id est humidum scilicet oleum linteo percolauimus, lib. 4. sanit. tuend. in acopo ex femine abietis, quod etiam hodie ad sicca præcipuè terrea & metallica trāstulimus, idq; cicotrinizare speciatim dicimus, verbo opinor corrupto ex *λοσνίψαν*, id est cribrare & incernere, vnde & *λοσνίον ιατρικὸν*, id est cribrum medicum dicitur lib. 6. comp. ph. par.

Ducere pistillo scilicet per mortarium aut super marmor leui compressu thus, mastichen, & similia, quæ tundendo latefcunt: sic rha barbarum per se, sic lithargyrū cum oleo vel oxelæo vel hydrelæo nutritum, & alia permulta non humida modò, sed etiam sicca, quæ trituram illam verberatu multo faciendam non tolerāt. Quin etiam metalla vel aliud quidpiam elaboramus, & pluribus diebus, præsertim in sole cum aceto vel alio simili diu conterimus, vt lib. 1. compo. phar. part.

Li. I. sim-  
ph. ca. II.

Teruntur medicamenta præcipuè sicca, interdū & humida, multis rationibus. Nūc

vt prōprius quod potentia sunt, id actu fiāt, vt medicamenta potestate calida quo tenuius sunt trita, eò citius & facilius à nostro calore actu calida euadunt, & nos vehementer calfaciūt, cum integra ipsa aut nullā aut minimam calfaciēdi energiam assequi possint: quomodo ligna crassiora ægrius incenduntur, quàm eadem minutim concisa. Piper enim si integrum aut ore contines aut deuoras, parum id calfacere deprehendas etiam post tempus longum, cum eius puluis tenuissimus mox vbi linguæ impositus est, eam vehementer incendat. Eodem modo calida omnia potestate: sic folia plantarum calidarum tusa calent nobis & magis & citius quàm si integra vel fumantur vel admoveantur. Qua ratione succos plantarum, & liquores, & gummi, & resinas, & si qua sunt alia ex his liquidiora, tenuiora, calidiora reliquiis harum plantarum, ex quibus separantur, docet passim Galenus. Idem indicium tibi esto de frigidis potentia, quæ vti calida, à calore nostro accipiunt, vt actu frigida euadant. Sic vsta vt magis siccant, accuratè pollinis modo sunt læuiganda, & cribro tenuissimo cernenda.

Nunc ad misticionis necessitatem. Quæ enim trita sunt tenuissimè, & cribro tenuissimo creta, simul compositioni miscentur,  
cūm



*Lib. 4. fa-  
nit. tuend.*

cum partibus suis minimis se mutuò cōtin-  
gant, promptius & valentius se inuicē affi-  
ciunt, ac tandem compositi virtutem vnam  
rectius confluunt. Quæ terendi ratio in com-  
positis propè omnibus locum habet. Nunc  
medicamenta teruntur magis vel minus, vt  
facultatem acquirât à priorē diuersam. Quæ  
enim tenuissimè sunt trita, & cribro tenui-  
creta, maximè in totum corporis habitum  
digeruntur: ediuerso crassiora in vētre hæ-  
rent, quia angusta venarum ora subire ne-  
queunt: ob id diospoliticon crassius facio,  
cū aliu per id ducere studeo: tenuissimū  
verò & minutissimum pollinis modo, cū  
vrinas mouere. Cuius præcepti in omnium  
medicamentorum compositione meminisse  
oportet. Hæc Galenus. Eodem fine rha-  
barbarum, asarum, cymīnū, & alia permul-  
ta negligēter trita aliu subducunt: tenuius  
verò comminuta in corpus prōptè subeūt,  
& venas perreptant celeriter, vrināsq; mo-  
uēt. Eadem ratione facilius est impleri po-  
tu quā cibo: aqua item & oleum terebin-  
thinæ vel aliorum hepar, lienem, renes pur-  
gantium celerius munere suo funguntur,  
quā ipsa rerū corpora. Sic scammonium  
tenuissimè terunt, si medicamentis corpus  
peruadentibus miscent: crassius autē, si ca-  
tapotiis aut aliis, quæ diu in ventriculo ma-

nere volūt. Aerugo item chalcitis, misy, sori, chalcanthum, æris squama, & alia similiter valētia diu ex aceto trita morsum & rofionem obrundunt, vires augent: quia cū partium sint natura crassiorum, vim suam in altum vsq; corporis curandi non demittūt: ob id vt tenuiora fiant, diu ex aceto terenda sunt & dissoluenda, vt sic curiosè attenuata ad penitiora vsq; penetrent, & corporis meatus pertransēant, nusquā inter eundum retenta: & si calidioris sint naturæ, sine morsu munere suo fungentur.

Quomodò humores corporis tenues facile citra rofionem perspirant, crassiores retenti & obstruentes grauando aut rodendo: si acres sint, molestant. Ex multa autem tritura in solē cum aceto quippiam vstioni ab igne simile rebus ipsi accedit, tamen calorem igneum non assequuntur. Vsta tamen & sic trita ex aceto ac læuigata multò præstantiora sunt. Sic aromata (quæ *ἀρώματα*, id est, species Paulus & Actuarius sæpe appellant) negligenter tunduntur, cū vires eorum diu integræ sunt seruandæ: tenuissimè verò, cū his viribus in præsens est opus. Præstantius quoq; est dentifricium, quantò exactius simplicia sunt trita, Galen. lib. 5. comp. phar. part.

Terendorū verò nō vna est natura. Quæ enim

Lib. 2. cō.  
ph. g.

enim substantia sunt tenuia, si sunt sicca, promptè in partes minimas disteruntur, ut humida mox per se sparguntur, & altè corpus imbuunt: crassa verò contrà. ob id illa minùs diu, hæc longiori tēpore in eundem scopum terenda sunt. Quapropter metallica & terrea cætera quòd crassa sint, etiam post vstionem maximè diu sunt terenda, præcipuè quæ oculis sunt imponenda collyrio vel sicco vel liquido. Qualiter si tenuia & rara, & imbecilla ac superficiaria facultate prædita, parum diu sunt coquenda: contraria diutiùs.

Rara quoq; mediocriter & friabilia parum diu terenda sunt, ut rha barbarū, scammonium Antiochenum (quod laudatissimum Mesues existimat.) Accuratiùs densa & lenta mediocriter, ut aloë.

Rara mediocriter addidi, quòd quæ sunt immodicè rara, ut agaricus, colocynthis, per se in puluerē tenuem cōminui nequeūt, sed vel cū aliis sunt puluerizanda, aut priùs, in trochiscos fingenda, siccandaque. Tunc enim nullo negotio tenuissimè teruntur: quæ res facit, ne ventriculi & intestinorum tunica præ mole hæreant, humorèq; superfluo imbuta molestiam his partibus afferat magnam ex oppressione, & diuturnam ex pertinaci adhæsu.

Lenta

Lenta quoque mediocriter dixi, quòd quædam ex his etiam ob siccitatem medio criteriam dura, nondum tamen per se pulverizari possunt, sed sub pistillo lateſcunt. Quapropter aut vetustiora sunt eligenda, aut sole vel igni siccanda, aut cum aliis siccioribus & friabilibus & tenuioribus terenda, vel aliquo liquore idoneo sunt dissoluenda. Sic tragacantha, gummi Arabicum, thus, myrrha, mastiche, sarcocolla, styrax, bdellium, euphorbium, ladanū, succus glycyrrhizæ, & alia gummi, resinæ, liquores, succi, dū vetustate aut aliter sunt siccata in puluerē terendo, aut pistillo diu multūmq; per mortarium ducendo comminui possunt, vel per se, vel cum siccioribus: cū verò sunt recentia, melius aliquo liquore dissoluuntur. Eòdem pertinent semina quædā, ut cnicī, lini, canabis, cydoniorum, citri, bombacis, melonum, cucurbitæ cucumeris, citreoli, amygdalas utraq; & fructus quosdam, ut dactylos, baccas halicacabi ob lentorem & pinguedinem, quia etiam ducendo lateſcunt, nō terenda esse, sed vel scalp pro, vel cultelli acie identidem verberata minutim inciduntur, ut in compositiones veniant rota sua substantia,

Adde quòd ut coctione longa non modò vires imbecillæ resoluntur, sed etiam

empyreuma coctis rebus imprimatur: sic  
lōgo attritu corporū durorum pistilli, mor-  
tarij, & terendorum etiam cum humore (vt  
scriptum prius Galeni testimoniū probat)  
calorem in terendis præsertim diu medica-  
mentis vel gignit, vel auget, qui medicamē-  
torum facultatem mutat: & si imbecilla  
est, dissipat, difflatione adiutus per agitatio-  
nem illā excitata. Quam caloris ex attritu  
durorum generationem planē indicat fari-  
na, quæ ex breuissimo contactu molarum  
calida tamen in subiectam arcā decidit. Ob  
id thymum & hyssopum vt coctionem, sic  
trituram mediocrem sustinere scribit, & in  
aliis similiter.

## P U R G A T I O.

**P**urgātur, seu vt vulgò loquuntur, mun-  
dantur medicamenta quædā intus, quæ-  
dam foris, quædam intus & foris, quædam  
nusquā. Intus, à seminibus, vix passæ, si  
Medicus imperarit, myrobalani omnes (ex-  
ceptis Indis enucleatis, & magna ex parte  
emblicis) vix rhois, nisi in decoctū veniat,  
quando nec pruna passæ, nec myxa, nec zi-

*Semen ta* zipha purgantur à nucleis: nisi quòd expref-  
*mē cucu-* sa pruna nucleos in colo relinquūt: myxa,  
*meris are-* zizipha nō exprimuntur. Foris, quæ excorti-  
*factum et* cātur, vt semē cucurbite, cucumeris, citruli,  
*cōtusum.* melonū, cnici, ricini, dente, vngue, cultello,

forpi



forpice purgatur. Semen quoq; citri, limo- *& cribra*  
 num, aranciorū, proniae vtriusq; , staphidos *tum vsur*  
 agrię, & nucleus strobili, id est, pineoli, pista *pat lib. 8.*  
 ciorum, bombacis, cerasi, perfici, anacardo- *sim. Gal.*  
 rū, nucis Indicę, cultello, vnguibus, malleo.

Bacca lauri in emplastro de meliloto.

Ficus in diacnico Gal. li. 5. sanit. tuenda.

Amygdala vtraq; si in confecturas reci-  
 piuntur, aqua calida parum macerata, facile  
 digitis depellantur, vt strobili & pistacia, &  
 alia similia, sine aqua in marcipanes & con-  
 dituram recipienda. Si verò in oleo expri-  
 muntur, integra prius tūduntur: si in deco-  
 cta veniunt, integra iniicis: si verò foris ad-  
 mouenda sunt, cum cute teruntur: omnia  
 prædicta foris non purgantur. Hordeum,  
 triticum aqua calida parū diu maceratum  
 pistillo ligneo in mortario ateo promptè  
 deglubitur, zea & oriza, molis: zea iterum  
 vt hordeum purgatur. Radices quædam  
 solum recentes abluuntur, & circuncisis ra-  
 diculis seruantur vel vsurpantur, vt cicho-  
 rij, rusci, asparagi, buglossi vtriusque.

Aliæ vtendi tēpore cultello raduntur, vt  
 radix glycyrrhizæ, gētianę, rubię, proniae,  
 tormentillæ, & doronici, tunici, vt vocant.

Quarundam superficies tota circuncidi-  
 tur, & si quid intus inutile apparet, excidi-  
 tur, vt rha barbari, agarici, ireos.

Intus & foris simul, mala cydonia in dia cydonio. Dactyli etiam edēdi, colocynthidis fructus cortice & semine purgantur, vt sola maneat medulla seu caro.

Radices quæ intus habent substantiam lignosā, vt raphani, apij, petroselini, fœniculi, saxifragiæ, oxalidis, peucedani, ellebori vtriusq; pseudodictamni vulgaris, pityusq; id est, turbiti, esulæ, scillæ, capparis, tamaricis. Scilla etiā nucleis & agnatis purganda.

Lib. 9. cō.  
ph. par. in  
lienssis.

Tamen cyperus, enula, costus, acorus verus, integra teruntur aut coquuntur.

Ellebori radicū fibræ aqua paulum maceratur, post cortices extracti in vmbra siccantur in vsus: vt & zingiber, calamus aromaticus, casia, cinnamomum, galanga vulgaris.

Et baccæ myrti, iuniperi, interdū etiam baccæ oxyacanthæ, asparagi. Piper omne, carpobalsamum, cubebæ, cardamomum, amomum. Semina fœniculi, apij, cari, ameos, dauci, cumini, seseleos, cardui benedicti, lini, fœnigræci, anisi, anethi, papperis, portulacæ, lactucæ, cichorij, psyllij, milij vtriusq; & cetera semina parua nec intus nec foris mundantur à phar macopola, sed vel trita vel integra vsurpantur. Ex magnis item cicer, faba, lupinus, eruum, vicia, semē agni (manibus confricandum, vt deposita canicie

canicie nigrescat)hipposelini,cydoniorū.

Gummi quædam & succi solidi,& liquores,& resine,terra,foliiis,scobe,ligno,cortice suæ parentis adulterati purgatur liquore idoneo fusi vel dissoluti,postea colati.

Quorundam seminum sola medulla in compositiones recipitur,vt cnici lib. 5. sanita. tuendæ: melonum,cucumeris, cucurbitæ,citruli, & aliorum magnorum. Tamen solus cortex rhois est vsui,vt multarum radicū,apij,eleoselini,sceniculi,rhaphani corde lignoso execto. Semina illa sole siccata tere leuiter in mortario,frica manibus,cerne cribro medullā solam transmittēte,si non succedit,forpicibus, vnguibus,dentibus,cultello excortica. Semen tamē lathyreos,laphnoidis,& alia id genus non pauca vno die insolata,aut ignita patella parum affata rupto cortice promptè exilit. Amygdale,strobili,pistacia, nuces, aqua frigida per noctē,vel calida parum diu macerantur,aut ignita patella tosta excorticantur.

# INSTRVMENTA PHARMACOPOLARVM PRAECIPVA.

**O** *Am* & *θύγα* Gal.in præparatione theriacis,libr.1.antidotorū sæpe: *δυνάμις* Damocrati in cōpositione Cyphios,libr.2.

antid. Gal. est mortarium seu pila. Ea autē est lignea, terrea, lapidea, marmorea, eburnea, vitrea, aurea, argentea, ferrea, plūbea, stannea, ærea, multiplex, & ex quavis materia: magna est pila, vel parua, vel mediocris. Ex eadem materia esse possunt *ὑπίγον*, id est, pistilli, & in vsus eisdem *ἄλλοι*, id est, vctes, vt in præparatione theriacis Galen. & magnitudine proportioni pilarum respondent. Et suæ materiæ ferè applicātur lignei pilæ lignæ, ferrei ferreæ, plūbei plumbeæ: tamen lignei etiam pilæ lapideæ, eburnæ, æræ in quibusdam terēdis, aut frangendis, aut deglubendis applicantur. Ferrei autem propè soli mortario æreo hodie seruiūt ob vtriუსq; duritiem. Ob quā pilas Aegyptias commendat Galenus in præparāda theriaca: quoniam, inquit, cū durissimæ sint, nihil inter cōtundendum ex earum substantia in ipsa quæ læuigantur, exteritur. Quapropter etiā hodie margaritas & alia sic dura super lapidē porphyrium terunt, nō in mortario æreo aut ferreo, vt à quibus multum substantiæ in margaritas trahatur & deradatur. Lapidei, marmorei, vitrei fragiles maximè fuerint, vt & eius generis mortaria, quorum crassities fragilitatem penset.

*ὁ δοιδυξ*, id est, cochlear paruum, magnum, ad commiscendum, subigendum in

mort

mortario, vt in theriaces compositione, & *In fine li.*  
 ad eximendum trita, vt mox ex Critone di- *1. antidot.*  
 sces. Crito pilam in qua teruntur medica-  
 menta, pelle tegit duplici in medio forata,  
 quantum pistillo terenti, & hoc ablato, ma-  
 nui & cochleari satis pateat ad eximēda quę  
 trita sunt, vt incernantur. Altera illi ex su-  
 perna parte iniecta, quę foramē habeat mi-  
 nus, quātum scilicet soli pistillo satisfaciat.  
 Hęc autē tollitur, vbi tenuissima medica-  
 mēti portio in puluisculum soluta subsistit.  
 Item quod cretū est tegatur, donec motus  
 eius constiterit, tunc cribrum aperi. Quam  
 consuetudinem hodie vellem in vsu nostris  
 esse, præsertim cū pretiosiora terunt.

Sint autem tam pilę quàm pistilli & ve-  
 ctes puri exactē, & nihil æruginis habētes,  
 cū ferrei sunt, vel ærei, vel argentei. In pi-  
 lis per pistillos quassantur, terūtur, molliun-  
 tur, subiguntur, miscentur, ducūtur materię  
 medicę ad varias compositiones. Quę-  
 dam molis etiam exiguis sinapi & segetū  
 modo teruntur quibusdam locis.

Diabesasa stanneo vase reponi vult He-  
 ras, lib. 8. comp. phar. part. Theriacam verò  
 non ligneo, sed pretioso aliquo vase vult  
 seruari lib. antidot.

Medicamētum stomachicum vase cor-  
 neo reponitur, lib. 8. comp. ph. part. Tere-



binthina vase ex ferro albo aut vesica sicca melius seruat, quàm ligneo, lapideo, vitreo, terreo duro etiam seruat.

De his  
paulo an-  
tè.

Κόσιν & κοσινύειν ἰατρικόν, id est, cribrum medicum, Gal. lib. 6. comp. phar. part. σάκκ & σάκκος, id est, saccus Medicis, & hodie vulgo Gallorum dicitur, vti & Hebræis: vnde κοσινύειν, id est, cribrare, & σακκίειν, libr. 9. comp. ph. part. Cribrum est setaceum, stamineum, vt nobis dicitur, ex pilis caprarum, lineum, sericum, ex ea scilicet panni serici specie, quam tafetū vocamus: & ex his quedam rara, alia densa, alia amborum media. Item quedam parua, alia magna, alia mediocria.

Τὸ ὑγρὸν ὀθονίον διυθίσασμεν, libr. 4. sanit. tuend. id est, humidum linteo percolamus.

Vasa oris latioris & angustioris permulta sunt necessaria ad continendum, macerandum, infundendum, coquendum, assandum, vrendum, reponendum. cacabi, lebetes, pelues, patellæ, frixoria, hydriæ, pocula, & hæc lignea, lapidea, marmorea, ex alabastro, achate, terrea solum vel etiā plumbata seu vitrata, stænea, ferrea alba, ærea rubra, creta flaua, ærea stannata, argentea, aurea. Vasa tamen è stæno & argento parum purgato vitanda, quia illud plumbi mistura adulteratū est, hoc citò dūcit æruginē, Gal. libr. 1. antid.

Et

Et in his quædam vtrinque ansata, alia sine ansis, alia vnicâ ansam nacta, alia item caudata à manubrio his vocantur, alia sine cauda, alia denique magna, alia parua, alia mediocria.

Inter terrea vasa sunt optima Valentina ex Hispania, pocula intus candore, nitore, læuore alabastritis proxima, foris pictura nitenti mirè variegata, conseruis, syrupis destinata.

Præter hæc ἀγγίον διπλόν libro 1. antid. quod ibidem paulò post vocat τὸ ἰνιστικὸν ἀγγίον τῷ ὕδατι: in methodo autem vocat διπλωμα, nos ad verbum vas duplex, vulgus balneum Mariæ cuiusdā chymistidis, magni vsus ne frigida calore perdatur, aut pretiosa vrantur, virēsque eorum vanescant, quia calorem per vas aqua calida plenū & igni superpositum recipit. Lebetes prædicti præcipuè ærei stannati ad medicamēta coquēda fornaci exemptili incensos carbonēs habenti imponūtur, rudiculis (quæ σπάθαι Galeno dicuntur libr. 1. comp. ph. gener. vulgò spatulæ) nunc ligneis, frequētiùs ferreis magnitudine variis mouētur ac miscentur. Sic lebetem stanno inductum coquendo oleo Sicyonio adhibet Dioscor.

Tyrides medicamentis siccis seruādīs simplicibus & compositis ferè sunt addictæ, &

hæ sunt vitreæ, terreæ, plurimum lignæ ex trunco folido tornatæ & cauatæ, vel assiculis coagmentatæ, sed illæ semper rotundæ: hæ vero nunc rotundæ, nunc quadrangulæ: nunc etiam quadratæ, nunc ouales, nunc ex rectis lateribus in extremo rotundantur: at vero ambæ tam tornatæ scilicet quàm futiles magnitudine plurimum variant. Pyxidē lignea pulueres quosdam reponit Gal. lib. 6. compo. ph. part. Sub abaco supputatorio multæ cōduntur arculæ exemptiles, seminum multorū & aliorū velut loculamenta.

Sunt & stateres magnitudine varia plurimi, & mēsuræ, & pondera, capacitate & grauitate multum variātia, ac etiam forma inter se differentia, de quibus postea.

In marmor seu lapidem durissimum, alium, penidia & saccharum rosatum effusa paulatim concrescunt. In porphyrio lapide seu squama maris, vt vocant, seu vitro, margaritas & lapides pretiosos ducēdo paulatim comminuunt. Λοπάς ἑρυθρὰ χαλκῇ, id est, patella æris rubri, in qua Aescrion caneros vrebant ad morsus canum rabidorū. Cuminum frigit in vase fictili, quod quàm optimè sit coctum in camino. Quæ enim exactè penitūsque cocta non sunt, hæc lutosa potius quàm figulina sunt, & qualitātū suarum nonnihil medicamento imprimunt.

*Libr. II.  
Simplic.*

*Lib. 4. famit. tuend.*

## D E P O N D E R I B V S E T M E N -

*suris, quæ Galeno præcipiunt, & ætatis  
nostræ Medicis in usu sunt  
frequentiores.*



**M**EDICAMENTA ferè sunt sic-  
ca, aut liquida: illa magis ponde-  
re, hæc potius mēsuris metimur.  
Tam pondera verò quàm men-  
suræ, quanuis propè sunt infinitæ, etiam ho-  
die pro diuersitate regionum & consuetu-  
dine vtentium, tamen in ordinem ac nume-  
rum referre conabimur. Primùm autem  
pondera quanta poterimus maxima breui-  
tate & perspicuitate explicabimus, quòd ho-  
rū frequētior est vsus in medicamētis cōfi-  
ciēdis: ad mēsuras postea trāsibimus. Quo-  
niam autē medici fere Attica obseruatione  
vtuntur, vt lib. 21. cap. vlt. ait Plin. non alie-  
num à re proposita fuerit, pondera primùm  
Attica enarrare, & à minimis ad maxima p  
media ceu per gradus quosdam procedere.

*Λεπτήν*, id est, minutia omnium mini-  
mum & indiuisibile.

*Χαλκός*, id est, areolus vel areolum, pen-  
dit septem minutias.

*ὀβολός*, areola sex.

*ἡμιόβολος*, id est, semiobolus, & areola tria.

*γραμμα*, id est, scriptulum obolos duos.

*Δραχμή*, scriptula tria, seu obolos sex.

*Μνᾶ*, Latinis Mina, drachmas cētum, seu vncias duodecim cum dimidia. Hæc autem est mina maior seu Solonis, quem Plutarchus pondera & mensuras auxisse scribit, cū mina vetus & minor nunc abolita, esset tātū drachmarū quinq; & septuaginta.

*ἡμιμναῖα*, id est semimina, drachmas 50.

*Τάλαντον*, talentum, parū quidem, minas sexaginta: magnum verò, minas octoginta, seu libras octoginta tres & vncias quatuor. Nā mina Attica drachmis quatuor est grauior quàm libra Romana, licet Plinius *μνᾶν* Græcorum medicorum ferè libram verterit: quæ quatuor drachmæ octuagies collectæ libras tres & vncias quatuor complent. Hócq; modo est proportio sesquitercia, vt inter minam magnam & paruam, sic inter talentū magnum & parū vtrunque vsitatum Græcis. Romani verò talentum non habuerunt. Cū autem Comici & Virgilius talenti vtriusque meminissent, Græcos, à quibus sua sumpserunt, imitantur, vt etiam Liuius ex Polybio locum vertens, & Festus & Gellius: talentum autem Atticum minus hi intellexerunt.

*ἡμιτάλαντον*, id est dimidium talentum.

*Διτάλαντον*, id est, duo talenta.

*Τριτάλαντον*, id est, tria talenta.

Cū item Latini dicunt, talentum esse sex



sex milium denariorū, per denarios drachmas Atticas ( quarum sex milia Atheniensibus talentum complent ) intelligunt.

Hec verò pondera Atheniensibus etiam nummorum genera fuerunt, quæ si iusti erant ponderis, prædicta pondera æquabant. Nullum enim ferè ponderis genus tã Græcis quàm Latinis fuit, quo non etiã numisma, vel summa quædã rei nummariaë significaretur: sed *γράμματᾱ*, id est, scriptula ponderis tãtũ non etiã rei nũmariaë Atheniensibus rationẽ habuisse videntur. Hæc ordine compositorio recensuimus: resolvere contrà & diuidere potest, qui volet a summo talẽto per media alia ad ipsum vsque *λεπτόν* indiuisibile descendendo, quem nos ordinem iam in ponderibus medicis sequemur.

*Μνᾱ ἰατρικῆ*, mina medica vncias cõtinet sexdecim, vt docet Diosc. aut quisquis ille fuit, libro de ponderibus, & Galen. libro 2. comp. ph. gen. in emplastro Heræ, & emplastro quarto Andromachi: seu drachmas centum & viginti octo, libro 4. eiusdem in emplastro Philoxeni medici, & lib. 1. comp. ph. gen. Mina quibusdam videtur continere vncias viginti, aliis sexdecim.

Alia est mina maior vnciarum viginti, seu drachmarum cẽtum sexaginta: & hanc quidam Alexandrinam dicunt, ac ex emplastro

stro Moschionis, & ex emplastris albis & viridibus Andromachi, libro 1. & 2. comp. ph. gen. In usu fuisse medicorum apparet, praesertim eorum qui medicinam Alexandri exercuerunt. Vti Attica, quæ vnciarum est duodecim & dimidia, seu drachmarum centum in usu magis fuit medicis, qui vel in Græcia egerunt, vel antè scripserunt, quàm res Romana floreret. Medica verò (quæ est vnciarum sexdecim, seu denariorum centum 12. seu drachmarum Atticarum centum viginti octo) medicis Romæ agentibus, vel in Græcia, sed Romanas res iam florentes cognoscentibus.

*Lib. 3. cõ.  
phar. gen.*

*Λίτρα*, id est, libra medica, tam mensuralis quàm ponderalis, qua medici Græci pariter ac Latini vtuntur in suis compositionibus, estq; vnciarum duodecim, seu drachmarum sex & nonaginta, Gal. lib. 4. sanita. tuendæ, & in compositionibus pharmacorum passim, & Diosc. Sed negotiatoria est vnciarum sexdecim, non vtenda in compositionibus veterum. Libram & vnciam vnà cum impe-

*Vt li. 1. cõ.  
ph. gen.*

rio Romano Græci accepisse videntur, hisque vocibus parum: vt apparet, corruptis vtuntur, scribentes *Λίτρα*, id est lib. & *δυνία*,

*Lib. 1. cõ.  
ph. gen.*

id est, vncia, idem omnino pondus significantes quod Romani. Nā *Λίτρα* *ἑξήκοντα*, *δυνία*

*Ibidem.*

nomina sunt Romana.

ἡμιλίτρον Galeno pendit drachmas octo & quadraginta: Selibra dicitur Liuius & Celso: etiā libræ semis dicitur Celso & Scribonio.

Pondo per se seu absque alio pōdere scriptum, est libra, sed cum alio ponderis vocabulo, id significat quod Græcis σταμνῆ & ὀλκῆ, hoc est, pondere, ut pondo libra, pondo vncia, ut à libra & vncia mēsurali separatur, cui μέτρον, id est, mensura, eadem ratione Græci addunt, ut à ponderali separēt. Romani tamen vsu eius frequentiore, etiā his ponderibus, quæ ambigua non sunt, pondo addiderunt, ut pondo denarij duo, tres, quatuor in Celso.

Idemque & Scribonius, pōdo semis, pro selibra scribunt aliquando.

Dupondius, & dua pondo, & trepondo, ut bilibris, trilibris, sed etiam quadrilibris. Pondo dua etiā Scribonius aliquoties scripsit. Centum pondium item, & centū pondo, & centena pondo, pro massa ferrea aut plumbea centum librarum.

Libræ partes sunt: Vncia, pars eius duodecima. Sextans, id est, sexta eius pars, scilicet vnciæ dux, vnde à Galeno ἑκτον τῆς λίτρας dicitur, ut Quadrans, id est, tres vnciæ. τῆς τριῶν λίτρας: & Triens, id est, vnciæ quatuor, τὸ τρίτον τῆς λίτρας, τὰ ἑστὶν, ὁ γυγίαι δ. Galen. libro 5. comp. ph. gen. Quincunx, quin

quinque vnciæ. Semis, seu selibra, sex. Septunx, septem. Bes, octo. Dodrans, novem. Dextans, decem. Deunx, vndecim. nomina Celso, Scribonio, Columellæ frequentissima, & Latinis medicis vsurpanda.

οὐγγία, vncia, drachmis Atticis octo, seu denariis Romanis septem cōstat, Græcis & Latinis eaq; ponderalis, Gal. lib. 6. cōp. ph. part. & libro 4. sanit. tuend. vbi libræ vnus partem tertiam, id est, vncias quatuor dicit æquare drachmas triginta duas, & alibi sæpe in compositionibus medicamentorum particularium & generalium. Libro autem octauo compos. ph. part. in hiera Themisonis vnciæ tribuit drachmas argenteas octo, vel septem & semissem. Ibidem drachmam in Andromachō & Asclepiade pro drachma argentea accipiendā censet, vt recentiores medici propè omnes ætate sua nominare solebant, & drachmā appellare, quod Romani *Αννάγριπ*, id est, denarium vocabant: sed quid inter drachmæ & denarij pondus re vera intersit, paulò post dicemus.

Tamen qui vnciæ drachmas tantum septem tribuunt, per eas denarios intelligunt. Qui septem drachmas & dimidiam, hi drachmam leuiorem denario aduertisse videntur, non tamen exactè differentiam expressisse: quàm sunt assecuti, qui

vnciæ

uncia tribuunt drachmas octo, non autem denarios octo. Multò minus drachmas nouem cū face Arabica sua se opaca crassitie etiam nunc tegente. *ἡμιούγγιον* semuncia, id ex, uncia medietas. Sescuncia Celso, id est uncia vna & dimidia. Vncia partes præter dictam semunciam sunt Duella, seu binæ sextulæ. i. scriptula octo, uncia pars tertia. Nam uncia pendit scriptula. 24.

Sicilicus vel Sicilicum, quasi semūciam secās, vt festò Pompeio videtur, pars uncia quarta, nam drachmas duas valet.

Sextula est sexta pars uncia, id est, scriptula quatuor, quæ sexies iuncta complent scriptula 24. seu drachmas octo, seu uncia. Tamen Ruellius ætatis nostræ doctissimus medicus *ἑξάγγιον* in Actuario vertit sextulam in aurea antidoto Alexātri, quo loco eius antidoti scriptores barbari habēt omnes drachmam. Excusatur autem Ruellius vicinitate grauitatis, quæ sextulæ est cum drachma, quam vnico scriptulo superat, vt in drachma post & denario dicemus. Illa autem partium uncia nomina Volusio & Fannio in ponderibus, & Balbo de agrimensoria ad Celsum sunt usurpata, & Ruellio in Actuario, ceteris medicis non appellata.

Drachma denique est uncia pars octaua, vt denarius septima: de quibus dicere tempe



stium est. Ne Nicolao Salernitæ credas, vnciæ drachmas nouem tribuenti nulla veterū autoritate, cui & Seruitor nescio quis scriptor triobolaris subscribit: hōsq; duces magna nostrorum pharmacopœorum natio sequitur, nulla ratione alia, quā quod ab illis est hoc scriptū, nulla aut ratione aut scriptorum veterum autoritate sese tuentibus. In his tamē qui sunt humaniores, & iudicio meliore Græcorum placitum sequuntur. Quot enim drachmas Mesues vnciæ dederit, probari nequit. *Δραχμή* drachma Attica Atheniēsis, & denarius Romanus nummus erat argenteus, & ab eo pondus eiusdem cum suo vtrunque nummo grauitatis: quia tamen vnciam Græcis & Latinis æqualem drachmæ octo complent, denarij verò tantum septem, denarius est paulò, scilicet vna septima, grauior quā drachma. Vnde libra ponderalis Celso, Plinio, Scribonio est denariorum quatuor & octoginta. Nam libra est vnciarū duodecim, in quarum singulis sunt denarij septem, qui duodecies sumpti cōplent quatuor & octoginta denarios. Eadem libra Græcis est drachmarum sex & nonaginta. Libra enim vnciarum est etiam illis duodecim, in quibus singulis drachmæ octo, quæ duodecies iunctæ efficiunt drachmas sex & nonaginta.

Cum

Cū igitur paulo grauior denarius esset, quàm drachma Attica, pōdus autē vel numisma Græci interpretes nō haberēt, quod exactē denario Romano responderet, Latina in Græcū sermonem versuri, per id quod proximum esset, ac non multo leuius, drachmam scilicet pro denario reddiderunt, vt Plutarchus, Galenus in Scribonij medicamentis compositis, quæ citat lib. de compositione pharmacorum.

Contra Latini dum Græca verterunt, pro drachma Attica denarium tam pondus quàm numisma verterunt, quia pars vnciæ octaua apud Romanos nomine proprio carent (nisi cū Balbo & Latinis multis drachmam quoque Græcorum more appelles) vt Aulus Gellius, Festus, Liuius libro ab vrbe condita 44. Polybij locum recensens. Sic drachma Attica denarii argentei habere pondus dicitur Plinio libro 21. capitulo ultimo, & alibi, quoties medica transfert, pro drachma denarium vertit. Nec mirum est id eum fecisse in ponderibus minimum diuersis drachma & denario, cum *μνᾶν* Atticam (quæ vnciarum est duodecim & dimidiæ, seu drachmarum centum) verterit libram, quæ vnciarum est tantum duodecim seu drachmarum est tantum sex & nonaginta: drachmis scili-

cet quatuor leuior, quàm mina: & vnciiis quatuor leuior quàm mina Alexádrina.

Hæc enim differentia illis visa est parui esse momenti, nisi si qua essent validis admodum viribus. Non habet igitur drachma Attica denarij pondus, neque libra minam æquat. Quoties verò Romana tractat Plinius, aut denario vtitur, aut drachma pro pondere denarij: vt cùm ait, è libra denarios quatuor & octoginta signari: tot enim surgunt denarij vnciarum duodecim, seu libræ vnius. In mina autè Attica denarij sunt propè octo & octoginta, siue drachme centum. In aliis duabus minis medica, quæ vnciarum est sexdecim: & Alexandrina, quæ vnciarum est viginti, numerus maior denariorum & drachmarum. Et Liuius libro quadragesimoquarto ab vrbe condita, drachmas quatuor Atticas dicit trium ferè denariorum pondus habere. Nam tres denarij faciunt tres Atticas drachmas, & prætereà tres septimas vnius denarij, non tamen quatuor drachmas integras efficiunt: ob id Liuius rectè addidit, ferè. Quòd si vnciæ tribuas tantùm drachmas septem (quod Galenus quosdam facere scripsit, vt antè diximus) pro denario tunc est accipienda drachma, cùm drachmarū octo pondus idem faciat, quod septem denarij: hoc-  
que

que modo denarius drachmam explet, & præterea partem drachmæ septimam. Nec audiendus est hoc loco Cleopatras, dicens, Italicum *δραχμῶν* habet drachmam vnā, si exactum id velit: nec Scribonius Largus, qui in præfatione ait, æquē denarios quatuor & octoginta esse in libra Romana, quot drachmæ sunt in libra Græcorum, nisi drachmam pro denario vsurpet. Sic enim vnciæ dabit tantū drachmas septem, vt denarios septem alij omnes dederunt. Quam drachmæ & denarij differentiam cū nouisset Celsus, nec obolorum (qui sex drachmam complent) voce Græca vti vellet, vnciam in septem denarios drachmarum octo vice diuisit, quorum denariorum singulos in partes sex diuisit, quæ obolis sex, in quos drachmam Græci diuiserant, responderent. Has verò partes vocauit sextantes omnium primus & solus, quorum singuli singulis drachmarū obolis sunt paulò grauiores, tum quia ipsi sex diuidunt denarium pondus drachma in sex obolos diuisa grauius. Quibus denarij sextantibus & eadem ratione quadrantibus & trientibus denarij aut libræ quando vtatur Celsus, lectori cōiectandum ex simplicium viribus, affectus natura & ægri & medicamento componendi format.

Libr. 5. c.

17.

Drachma igitur Attica pars est octaua vnciæ Græcæ & etiam Romanæ, aut si paulo leuior est; ita vt drachmæ octo denarios septem non expleant, id autores nō curarūt.

Δραχμή etiam ὀλκή dicitur lib. 8. comp. ph. p. quamuis proprie ὀλκή sit pondus, vnde ὀλκή δραχμῆς, id est, pondus drachmæ libr. 8. c. ph. part. in hiera Themisonis, & alibi sepe. ἡμιδράχμον, Gal. lib. 4. comp. ph. gen.

Βιδράχμον, τριδράχμον, τετραδράχμον. id est duæ, tres, quatuor drachmæ Græcis in vsu sunt.

Drachmæ partes sunt. γράμμα Aëtio, Alexandro, Aretæo, Moschioni Græcis iunioribus vsurpatum, (nam veteres δισβολον vel ὀβολοὶ δύο eius loco dicebant) scriptulum ad verbum rectè dixeris: scrupulus tamen aut scrupulū dicitur Celso, Plinio, Columellæ, & recentioribus Medicis: Martiali quoque, nisi in his scriptulū legas. Drachma autem habet grammata, id est, scriptula tria: Simplicium scriptuli dimidium quidam ratiocinatores vocant.

ὀβολός obolus Plinio vsurpatus est dimidium scriptuli seu sexta drachmæ pars: nam oboli sex, drachmam constituunt: & oboli duo, scriptulum vnum.

ἡμιὀβολον vel ἡμιωβόλιον Andromachus apud Gal. lib. 7. comp. ph. p. pro obol. dimi.



Διόβολον vel ὀβολοὶ δύο , τριώβολον , τετρώβολον Soranus & Zoilus vsurpant apud Galenum lib. 1. 3. comp. ph. p. Διωβολιαῖ & τροχίσκος , id est, diobolaris, & τριωβολιαῖ , id est, triobolaris pondere, libr. 7. compo. ph. p. His enim nominibus veteres Græci sunt vsi.

Θερμὸς, id est, lupini semen, est drachmæ pars nona; nam drachma pendit nouem lupinos. Κεράτιον, id est, filiqua, est dimidiū lupini, Actuatio cū vulgo καρφοβία dicitur. Semen autem eius vt lupini, lētis, orobi, cicceris, fabæ, non tota filiqua intelligitur: & id mediocre non enorme & habitius, neq; strigosum & emaciatum, qualia hordei aut tritici grana viginti scrupulo etiam hodie damus, aurifabrorum grana omnino immutabilia, hisque omnino æqualia appensuri, vt ponderum fundamentum nobis certius sit quàm Atticis in suo λίτρο, Græcis in suo λεγάρω, vel chalco, vel lentis semine.

Χάλκς chalco Plinio dicitur, aliis areolus vel ereolū, est dimidiū filiquæ: nā filiqua pēdit duos chalcos: chalcus autē grana lentis quatuor, quæ minimum pondus faciunt, vt hodie grana tritici vel hordei: sed cū grana hæc pondere plurimū varient, ob variam magnitudinem, densitatem, raritatem, humiditatem, siccitatem, eligenda

sunt (vt diximus) mediocria, aut illorum loco grana aurifabrorum immutabilia. Alij chalcum oboli partem octauam faciūt, alij decimam, Attici sextam, vt prius dictū est. *Διναρχον*, id est, duo xreola Diosc. in cucumere agresti. Drachma igitur continet scriptula tria, obolos sex, lupinos nouem, filiquas octodecim, chalcos sex & triginta: secundum alios, octo & quadraginta.

Denarij partes sunt, Victoriatus. nūmus argenteus victoriæ nota signatus, dictus aliter Quinarius. Nam denarius decem asses siue libras primò valebat (vnde illi nomē) eius autem dimidiū victoriatus asses quinque: quia denarius in duos victoriatos diuiditur. Postea denarius fuit libræ pars octogesimaquarta: nam ex libra denarij octogintaquatuor signabantur, Plin. Victoriato autem pondere vititur Scribonius. Celsus passim libr. 5. capit. 18. dicere maluit semis denarij, vt p. \*. S. vel semis, id est, pondus denarij dimidij, & alibi p. i. \*. & semis, id est pōdus denarij vnus & dimidij. Galenus victoriatum Scribonij aliquando in duos obolos, id est, scriptulum vnum, rectiūs & frequentius in *τρίωβολον* vertit, cū Scribonij compositiones describit. Denarij vti libræ sunt sextans quoque, quadrans, triens, de quibus antè diximus.

NOTÆ PONDERVM RO-

manorum ex Volusio, Probo,

Celfo, Scribonio.

℞. libra. ℞℞. libræ duæ seu dupondium.  
 S. semis. v. septunx. —S—bes.  
 S—dodrans. S—dextans.  
 S—deunx. —trienx. —qua-  
 drans. —sextans. —vncia. ¼ fescun-  
 cia. ½ semuncia. ⅓ vel 6 binæ sextulæ.  
 ⅔ sicilicus. ⅜ sextula. ⅞ scriptulum.  
 \* vel ⅔ denarius. ⅕ victoriatu. z sex-  
 tans denarij & libræ apud Celsum — fescun-  
 cia, seu quarta pars semissis — drach-  
 mæ sex seu octaua pars semissis in Scribo-  
 nio leguntur. 3. drachma vna.

NOTÆ PONDERVM

Græcorum & Atticorum.

α μνās. αι, vel Λ, vel λ λίτρας. 50 δρ-  
 γμάς. 4 δραχμῆς. Δ δρχῆς, id est, drach-  
 mæ γρ γράμμα. —. ὀβολῶν,

—: δυοῖν ὀβολοῖν & λεγῶν. X χαλ-  
 κῶν. S" ἡμίσι, quæ duab' his velut accētū  
 lineolis differt à nota numeri nonagenarij.

In his ponderum tam Romanorū quàm  
 Græcorū notis ferè exprimuntur primæ pō-  
 deris literæ. In Romanis verò lineæ semissi  
 adiunctæ vnciarum numerum designāt vl-

tra semissem seu sex uncias. Reliquarum Romanarum notarum ratio est difficilior, & cur Græci per  $\Lambda$  obliquum  $\angle$  drachmā figurant, cum æquius fuisset ad aliarum notarum imitationem  $\Delta$ . id est,  $\Delta$  cum  $\rho$ , quæ duæ sunt primæ huius ponderis literæ: item in obolo,  $\alpha\beta$ .

Mina Attica, quæ est unciarum 16. Aui-cennas, Serapio, Mesues vti quibusdam putantur, aliis Alexandrina, quæ est unc. 20.

Vulgus medicorum iniquius pōdera hodie notat, præterquàm lib. librā : &  $\Theta$  id est, scriptulum, quod notam Romanā licet ratione mihi incōperta scriptā imiteretur, vt 3 drachmam : at  $\text{ζ}$  vel  $\text{ξ}$  vnciā cur significet, nō video. Iustius mea sentētia fuerit, ne notarū 3 &  $\text{ζ}$  affinitate amplius peccetur magno mortalium incommodo, drachmā & unciam primis suis literis scribere sic, dr. & unc. quod in mēsuris vulgaribus rectē fecerūt, M, pro manipulo, & P, pro pugillo scribentes. Faba Græca pendit duos obolos: eius meminit Gal. lib. 7. compo. ph. p. in arte riace 14. Andromachi cataportio fabæ magnitudine ibidē. Faba Alexandrina drac. vnam & dimidiā. Nucis iuglandis magnitudo siliquas septuaginta duas pēdit. Nux Pontica siliquas octodecim. Alia numero metimur, vt pruna, ficus, piper albū, li. 7. ph. p.

ph.p.in arteriacis (quod aliàs obolis, aliàs vnciis metitur.) Multa præterea metimur quantitate discreta seu numero, vt ficus, poma, myxa, zizipha, myrobalanos, tamar Indos, nucleis seu seminibus horū maioribus ferè exemptis, vbi scilicet ad viuum componendi ratio exigitur. Est tamen quando cum nucleis numerantur, vbi penduntur, vel etiam mensurantur.

**M**ensuræ Romanis & Græcis duplices fuerunt, liquidorum scilicet & aridorum. Liquidorum primò dicemus.

κῶλῖς Ionicè pro *κοῦλῖς*, culeus, mensurarū capacissimus, amphoras viginti capit, seu libras mensurales mille & sexcētas, Plin. lib. 14. cap. 4. & Fannius libr. de ponderibus.

Amphora urnas duas Columellæ, lib. 12. capit. 20. seu libras octoginta: olim etiam quadrātal dicebatur, quòd vas erat quadratum, pedis mensura in longum & latum.

Urna congios quatuor, seu libras quadraginta.

Congius sextarios sex Romanos, libr. 6. comp. ph.p. seu libras decem.

Sextarius quia est congiij sexta pars, dictus, capit heminas duas seu libram & bessem, id est, octo vncias viginti mensurales, non ponderales: nisi liquorem quē metiris,

vt



*Libr. 1. c.  
ph. 7.*

vt mel grauissimum, oleum leuissimum, vinum (præsertim fuluum: nam nigrum crassius & grauius) mediū expresseris, & sic tot sextarij sunt explicandi, quot sunt res metiendæ,  $\Xi\iota\varsigma$ , id est, sextarij, neq; mensura neque nomen erat apud Athenienses, quo tēpore scripsit Heras Medicus: nunc ex quo Romani orbi imperare cœperunt, nomen  $\Xi\iota\varsigma$ , id est, sextarij apud omnes qui Græca lingua vtuntur, extitit: ipsa verò mēsurā Romanæ æqualis nō est: nam alij aliam sextarij mensurā vsurpant. Apud Romanos sextarius libram vnā & semissem, & sextam illius partem pendit, vt omnes simul iunctæ sint vnciæ viginti, quas plurimū cornibus metiuntur incisīs extrinsecus lineis quibusdam orbicularibus. Nōnulli falsò sunt opinati, sextarium Romanum octodecim mēsuralibus vnciis valere, Galenus. Sextario Italico seu Romano proximus est chus Atticus, vt cadus Atticus, amphoræ Atticæ.

Vt as & libra vncias duodecim continet, dictis in libra nominibus appellatas: sic sextarius cyathos duodecim nominibus iisdē vocatos capit: vnde sextarij bes, id est, cyathi octo apud Largum compositione 116. & sextarius falerni Martiali, id est, cyathi duo: & seni sextantes vini, id est, cyathi duodecim, seu sextarius vnus Suetonio in Augusto:

sto: quadrans vini Celso in curatione quartanae, & Martiali, id est, cyathi tres. Eidem triens, id est, cyathi quatuor, ac etiam Propertio & Iuuenali. Martiali item quincūx, id est, cyathi quinque: septunx septem, bes octo, deunx undecim. Pro semillē verò hemina, seu sex cyathi, ut dodrans pro nouem cyathis, dextans pro decem.

Hemina quartarios duos capit seu uncias decem: dicta quòd sit ἡμισυν, id est, dimidium sextarij, autore Festo. Vox tamen Romana & mensura est: *λεῖβύλη* autem (quam Linacer & alij propè omnes heminam reddunt) Galeno & Plutarcho usurpatur, & Andromachō, quanuis Romæ agenti (quod Galenus miratur) et Catoni Romano scriptori: huicque diuersa est ab hemina. Prioribus verò *λεῖβύλη* Attica mensura uncias nouem libræ Romanæ capit. Eamq; mensuram in pharmacis, priusquàm res Romanorum creuissent, scriptis, *λεῖβύλην* capere coniecit Galenus. Videtur & Heras cū *λεῖβύλην* scribit, sextarij dimidium indicare: an verò uncias nouem ex librali cornu vel decem innuat, etiam ignoratur: licet nonnulli eam sexdecim uncias. & *διμοῖρον*, id est, duas eius partes habere statuunt: sed alibi *λεῖβύλην* cum libra Romana æquauit, *λεῖβύλην ἰταλινὴν ἂν δὴ καὶ λίτρας ὀνομάζουσι.*

*Ibidem.*

*Li. 4. san.  
tuend.*

Quart

Quartarius acetabula duo capit seu vnc.  
5. dictus quia est pars sextarii quarta.

ὄξύβαφϞ vel ὄξύβαφον, id est acetabulum,  
sesquicyathū capit, seu vncias duas & dimi-  
diam, ab aceto dictum, quod ad ciborum  
intinctus capiebat. Idem κοῦλης τεταρτον,  
id est, corylx, sex cyathos capientis quarta  
pars, libr. 1. compo. ph. part. dici Apollonio,  
& lib. 2. com. ph. gen. Serapioni, quibusdam  
videtur. Scribit verò Galenus lib. 9. compo.  
ph. par. in splenico Chrysermi, Αὐτὸς σπι-  
μα] ὄξύβαφον ὀλίγῃ 50. α. id est, quod est vn-  
cia vna, nisi mendum sit: aut oxybaphon  
minorem faciat mensuram.

κόχδϞ fescunciam capit & drachmam  
& scriptulum, seu cochlearia magna 4. (quæ  
& ligulæ dicuntur à cavitare simili linguæ  
contractæ) estq; sextarii pars 12.

Μυστρίον est κοχλιάριον magnū, capit drach-  
mas tres & scriptulum vnum, datur diacy-  
donion mediocris mystri modo, in fine lib.  
6. sanit. tuendæ.

Cochlearij parui pleni mensura in paruis  
corporibus: maximi, in maximis: in mediis,  
ad portionem datur diatrion pipereon, lib.  
4. sanit. tuendæ.

*Libr. 7.  
metho.*

Hieræ picæ sicæ modus maximus est  
duorum magnorū cochlearium cum aquæ  
temperatæ cyathis tribus: minimus parui

VNIUS

vnus cochlearis: mediocris est duorum par-  
uorum cochlearium. Quæ loca & alia pas-  
sim planè declarant saltem tres fuisse co-  
chlearis differentias.

Quæ pondera, quibus mēsuris, quorum  
liquidorum vel aridorum respondeant, Pau-  
lus in fine docet abundè.

Quauis enim libra sit & vncia mensu-  
ralis, id est, mensura molem decernens: &  
ponderalis, id est, rei grauitatem pondere  
declarans, Galeno libr. 1. 2. & 3. & sequenti-  
bus compo. phar. gen. & illa vncias duode-  
cim lineis circularibus in mensura cornea  
extrinsecus descriptis signatas semper ca-  
piat, hæc vncias duodecim semper pendat:  
tamen rarò libra ponderalis mensurali res-  
pondet: & contrà, ob varium rerum, quas  
metimur, pondus in eadem mensura. Quā-  
uis etiam libra frequentius mensuralis fuit  
Romanis, tamen etiam fuit ponderalis seu  
pondus librale, vt mensura libralis: ob id  
distinguit Galenus addendo *σταδμῶν* ponde-  
rali, vt *μέτρῶν* mensurali.

## R O M A N A E A R I D C -

R V M M E N S V R A F .

**M**odius à modo, id est, mensura dictus,  
sextarios sexdecim capit, seu libras  
26. vncias octo, non autem pendet. He-  
modius, eius dimidium. Sesquimodius

Varro

Varroni vsurpatur. Sextarius capit heminas duas. Schœni & Calami sextarius, Cato cap. 105. Salis & hordei sextarius. Columella lib. 12. cap. 5.

Hemina capit acetabula quatuor seu vncias decem. Iris aridæ contusæ hemina, Cato cap. 107.

Hemina salis, Columella lib. 12. cap. 49.

Acetabulum capit sesquicyathum, seu vncias duas cum dimidia.

Acetabulum melanthij, Cato cap. 107.

Acetabulum gallæ, seminis coriandrini, cnicorum, Celsus libr. 5. cap. 18. Salis acetabulum, Plin. lib. 18. cap. 7.

Cyathus cochlearia seu ligulas quatuor, vel fescunciam, drachmā & scriptulū. Cyathus seminis, columella libr. 2. cap. 11.

Gith cyathos tres, picis vnum, Celsus lib. 5. cap. de curatione papularum.

Ligula capit drac. tres & scriptulum, Columellæ vsurpatur.

Ergo mensuræ liquidorum tātūm Romanis fuerūt, Culeus, Amphora, Vrna, Cōgius, Quartarius. Aridorū solum Modius, Semimodius, Sesquimodius. Humidorum & ficcorum indiscriminatim Sextarius. Hemina, Acetabulum, Cyathus, Ligula. Hæc de mensuris Romanis. Arida autem metimur frumenta, legumina, semina alia, salē:

reliq



reliqua vt aromata frequētiùs appendimus,  
quàm metimur: metallica solùm appen-  
duntur.

Aridorum quæ metimur pondera maxi-  
mè variant, ob id omisimus, ne prolixitate  
odiosa displiceamus.

## GRAEGAE, SEV ATTICAE

*liquidorum & humidorum mensura,  
quibus maximè vtuntur Medici,  
ob id etiam medica  
vocantur.*

## LIQVIDORVM MENSURAE

*cum olei, vini, mellis pondere cuiq; men-  
sura respondente.*

**M**ΕΤΡΗΤΗΣ, siue μέτρος, siue λιράμιον cá-  
pit choas duodecim, seu congios Ro-  
manos duodecim, seu libras mēsurales cen-  
tum & octo, ἀπὸ τῆς μετρητῆς, id est, à metien-  
do: illud alterum ἀπὸ τῆς χάδου, id est, capa-  
cem esse. Sic metreten Dioscoridis in oleo  
cenanthino: & λιράμιον eiusdem in vino  
hyssopite, Plinius cadum vertit. Metreten  
præterea Italica in vino scillitico, & λιράμιον  
Italicum in vino absinthite Dioscorides vo-  
cat pro amphora Romana; quæ non paulò  
minor est Attica. Cùm autem Atticam am-  
phoram vult significare; vocat simpliciter  
μετρητὴν vel λιράμιον: cōtrà Latini ampho-

ram Atticam pro metreta dicunt, ut à Romana separèt, quæ ipsis absolutè est amphora. Vtraque Græcorum medicis in vfu fuit, postquàm Romani Græciæ imperare cœperunt. Metretes olei pendit libras Romanas nonaginta, vini centum, mellis centum & quinquaginta.

Χοῦς, siue χόιυς, chus seu congius, sextarios sex capit, seu cotylas Atticas duodecim seu libras nouem, ἀπὸ τῶ χιῶν, id est, à fundendo Plin. ex Dioscoride vertitur semper congius. Chus olei pendet libras septē cum dimidia: vini autem libras & & vncias quatuor: mellis lib. duodecim cum dimidia.

Σέτρυς, sextarius, cotylas duas seu libram vnā & dimidiam. Vox à Græcis ex sextarij nomine corrupta Andromacho, Asclepiadi, Heræ, Critoni, Dioscoridi, Galeno, & alijs Græcis, qui scripserunt, postquàm imperium Romanum acceperunt, vetustioribus Atticis scriptoribus incognita. Aceti sextarij tres Critoni apud Gal. & Galeno ipsi sæpe pro liquidi mensura in lib. cōpositiōnū. Sextarius olei pendet vncias quindecim, vini autem libram vnā, vncias quatuor, drachmas quinque; scriptulum vnum: mellis lib. duas, & vnciam vnā.

Καρύλη quartarios duos, seu vncias mēsurales nouē, vnde Heras lib. 5. comp. ph. part.

Galenī

Galenī dicit vncias olei Italicas nouem, seu cotylen pendere vncias ponderales septem cū dimidia: aceti cotyle Soranus apud Galen. libr. i. composit. pharma. parti. Dicitur etiam *ἡμίξιστον*, & dimidia sextarij pars Gal. libr. i. comp. ph. gen. & *τρύβλιον* Cleopatrr. Hemina dicitur Romanis & item Græcis, Romanas medicamentorum compositiones in suam linguam vertentibus, aliās autem cotyle vtuntur. Cotyle olei pendet vncias septem & dimidiam: vini autem vncias octo, drach. duas, scriptula duo: mellis librā vnā & semunciam.

*τέταρτον*, siue *ἡμικοτόλιον* Dioscoridi lib. 5. de thymoxalme, & Apollonius apud Gal. libr. i. comp. phar. gen. id est, quartarius vel semicotyle, capit acetabula duo seu vncias quatuor cum dimidia. *τέταρτον ξισ* dicitur Damocrati apud Gal. libr. 8. c. ph. part. Pendet olei vncias tres, semunciā, & drach. duas: vini autem vnc. 4. drach. i. & scriptulum vnum: mellis selibrā, & drach. duas.

*δξύβαρον* id est, acetabulū sesquicyathū, seu 3. duas & 3. duas, *τέταρτον κοτόλιον* dicitur Serapioni apud Gal. li. 2. comp. ph. gen. & Apollonio libr. i. ph. part. Pendet olei semunciā & drach. tres, seu drach. quindecim: vini autē vncias duas, & scriptula duo: mellis vncias tres & drachmam vnā.

Κύαθος cyathus cōchas duas seu mystra quatuor, seu chemas quinq;, seu cochlearia decē, seu fescuciam. Attici mellis cyathus vnus, aut drachmæ duodecim, Crito libr. 5. comp. ph. part. Attici mellis cyathus Philip po Medico dicitur apud Gal. lib. 4. ph. part. Pēdet olei vnc. & drach. duas, seu drachmas decem. Pōdus olei curæ Medicis præcipue fuit in emplastris: vini autē vnciam vnam, drach. tres, siliquas quatuor: mellis vnc. duas & scrip. duo.

Κίχλη mystra duo, seu chemas duas cum dimidia, seu drachmas sex.

Μύτρον, chemen vnam & quartam eius partem, seu cochlearia duo cū dimidio, seu drachmas tres. Mystrum magnum Cleopatræ capit drach. duas cum dimidia & quartam: paruum drach. duas, scriptula duo, siliquam vnam & vndecimam.

Χήμη cheme, cochlearia duo, seu drachmas duas, scriptulū vnum, grana quatuor, & quatuor quintas grani. Lithargyri chemen aut drachmas tres, lib. 5. comp. pharm. part. Gal. Crito.

Κοχλιάριον drachmam vnam, scriptulum dimidiū, grana duo, & duas quintas grani. Cochlear olei pēdet Cleopatrarū drach. vnā.

Hæc ponderū minorum nomina sunt vsurpanda, ad interpretandam mensurarum  
capac

capacitatem : & quomodò libræ & vnciæ mensurales non solùm ponderales sunt: sic hæc pōdera minuta possis mensuralia facere, vel saltem intelligere. Vinū nona parte excedit pōdus olei Galeno, Fannio, & Græcis quibuscūdam: vt coryle olei nouē vncias pendet, coryle vini decem, quod est nona parte esse grauius: sic olei sextarius octodecim vncias, vini viginti pendet. Mel autem tertia parte vino est grauius, ex Fannio, & Dioscoride, & Galeno, & experientia. Mel autem sit purum, è fauis destillatum: despumatum autem est grauius.

## MENSURAE ARIDORVM

*Attica, Medicis maximè in vsu.*

**M**ediv<sup>o</sup>, medimnus, capit chœnicas octo & quadraginta, Suidas: seu centum & octo libras, seu modios sex, non medicos quidem, sed georgicos. Medicis tam magna mensura rarior est in vsu.

Xoiv<sup>is</sup> corylas tres, vel sesquiseptarium, seu libras duas & quadrantem, id est, vncias tres. In vsu est Chrysfermo & Erasistrato in Galen. medicamentorum compositionibus Pro chœnicibus decem Dioscoridis in vino ex dactylis Plinius reddidit modium. cū decem chœnices corylas triginta, seu sextarios quindecim faciāt. Romanus autē



est sextariorum sexdecim: vnum igitur sextarium neglexit Plinius.

Ξεστῆς sextarius, cotylas duas, seu 3. octodecim, Galeno saepe vsurpatur in comp. ph.

ἡμιχόινιον vsurpauit Dioscorides in vino elleboricite.

κοτύλη ozybapha 4. seu vncias nouem, gallæ cotylas duas. Gal. lib. 9. c. ph. part.

ἡβύβαρον, sesquicyathum, seu vncias duas & drach. duas: piperis albi oxybaphon, Gal. lib. 3. comp. ph. part. & Dioscoridi vsurpatur in thymoxalme.

κόχλιον cochlearia decē seu fescunciam. Salis cyathus Diosc. in vino melicite.

κοχλιάριον drach. vnam, scriptulum dimidium, grana duo, & duas quintas grani.

## NOTAE MENSVRARVM

*Romanarum, ex Volusij Metiani libro de Asse.*

Culei nota desideratur. Quadrantal, id est, amphora q.

Vrna, q. s. id est, quadrantalis semis.

Congij c.

Sextarij o.

Hemina o. s. id est, sextarij semis.

Quartarij Q.

Cyathi cy. In aridis verò modij, μ.

Semodij μ. s. Acetabuli & Ligulæ notæ adhuc desiderantur.

NOT

NOTAE GRAECARVM MEN-

*surarum medicu frequentes, ex lib. de pon-  
deribus & mensuris, qui Gale-  
no tribuitur.*

κ<sup>α</sup> λικράμιον, tribus primis consonanti-  
bus expressum. Χ χοῦς. ξι. vel ξ ξις, ης.  
ζ. λισύλη. Τρυ. Τρυβλίον. ξο. οξύβαλον.  
κ<sup>β</sup> λισάδο. Χ. μύτρον. κ<sup>γ</sup> χήμη.

In aridis vero, μ. μέλιμ, Χ. χοῖνιξ.  
cum duabus primis consonantibus.

Cum igitur tam varient pondera & men-  
suræ, in veterum compositionibus diligen-  
ter observa miscendorum & totius misturæ  
vires, ut inde pondera quædam dubia con-  
iectes. Noscas etiam in id patriam medi-  
ci, & si extra patriam, in qua regione, & quo  
tempore scripsit.

Cum item pondera medicamentorum  
mensuris nō semper responderint (ut osten-  
dimus) diligenter est aduertenda maioriū scri-  
ptura, si iubet nos medicamenta πλίθ<sup>η</sup>, id  
est, copia seu mensura, & ὄγκω, id est, mole,  
vel ταδμῶ, id est, pondere metiri, Gal. lib. 6.  
comp. ph. part. Adhæc felicius pondera &  
mensuræ, & amborū numerus integrè ex-  
primuntur, quàm notis representantur ob  
lapsum facilem. Ob id Galenus Androma-  
chum iuniorem & Damocratem laudat,

quòd medicamētorum compositiones carmine scripseriut, integra hæc omnia recipiente.

Idem Galenus libr. 2. comp. pharm. part. *ἐκ τῶν, ὀκδομήν τε, ἐννώνων τε ἀρχαῖς* aloës in hieræ compositione integra scripsit: & alibi passim.

Horum de ponderibus & mensuris scriptorum partem plurimam ex Galeni libris de compositione medicamentorum secundum locos & genera collegeram, sed meliora & auctiora reddidi lectione Georgij Agricolæ medici hac in parte doctissimi & diligentissimi. Neque tamen semper ponderibus aut mensuris utimur in componendis medicamentis aut utendis, sed herbas manipulis, semina & flores pugillis sæpe metimur.

*Li. 5. fan.  
tuenda.  
Ibidem.*

Terebinthina resina sumitur nucis vnius ponticæ, aliquando duarum triumve magnitudine. Diacnici sumitur duarum triumve caricarum modus, pro cuiusque natura magis minusve medicamentis obediens per experientiam exploranda.

*Li. theriac  
es ad Pi-  
sonem.*

Pulvis capitis milui potatur ex aqua, quæ tribus digitis capi potest.

Alia eius generis plurima apud medicos tum Græcos tum Latinos inuenies.

EXER

EXERCITATIO  
PRAEDICTAE METHO-  
DI IN ALIQVOT

*veterum compositis  
celebribus,*

LIBER IIII.



ABSOLVTIS vtcunque tribus  
instituti nostri partibus, iam  
quarta eaq; postrema super-  
est adiicienda, de medicamen-  
tis aliquot compositis, qui-  
bus ceu particularibus exēplis exercere tra-  
ditas prius methodos visum est. Neq; enim  
omnia veterum composita in vnum coge-  
re placuit: id enim operis fuisset infiniti, &  
parum profuturi: neq; item omnia vsu quo-  
tidiano celebrata, sed tantum sumenda tan-  
quā prācipua adscribemus: admouenda  
pleniū tradituri in Mesuæ Antidotario,  
quod cum canonibus & simplicibus à no-  
bis quāta potuimus, maxima cura deter sum  
& politum & clarum redditum propediem  
emitteremus. Non improbo tamen, si quis o-  
mnia quæ à viris ratione & experiētia insi-  
gnib<sup>9</sup> scripta sunt, enumerare velit Galeni  
exēplo, vt ex his quisq; illa potissimū prae-

*In libr. de c. ph. phar. part. et g.* parare queat, quorum materiæ copiam habet, modò diligenter curet, vt quæ miscentur, probata sint & vigentia. Mistis quoque & compositis tunc solùm vtatur, cum vires expetitas habent summas. Nam multa vetustate exanimata sunt igni absumenda, non vtenda. Quibusdam autem vetustas vires addit, vt theriace: aliis minuit, vt Philonis antidoto, quæ tamen ante annum à compositione non vtendum: aliis adimit, quorum maxima turba est in syrups, catapotis, & aliis, vt simplicibus, sic compositis. Quapropter syruporum vere & æstate rarus est vsus, si rerum illos constituentium est potestas frequentior apozematum quæ tunc solùm Pharmacopola componit, cum iubetur à medico, vt etiam eclegmata, exoletis iam Arabum locis præstantiora, quia recentia. Cætera item quæ omni propè hora est componendi facultas composita non habet pharmacopola, vt linimenta, frontalia, embrochas, cataplasmata, collyria. Sed tempore vtendi parantur, quando facilis & prompta rerum in hæc necessariarum materia est, quæ autem omni parte anni parari nequeunt, rerum tunc vigentium penuria, illa semel in annum totum confici possunt: cura tamen diligenti adhibita, ne etiam ante annum vires eorum

elang



elanguerint. At cum vnum medicamentum etiam vni morbo omnium agrotorum competere non possit ob temporum eius & ægri naturæ varietatem, & alias indicationes, nec medicus tantam varietatem in vnoquoq; genere ad manum habere possit, medium aliquod habeat ad mediā naturam compositum, cui addas tempore vtendi quæ voles, pro affectus & ægri natura, vt in diamoro Gal. in comp. ph. part. vel simplicissimum pares, quod vtendi tempore arbitrato tuo intendas. Ob id syropos omnino simplicissimos ex succis scilicet, vel decoctis simplicibus saccharo aut melli incoctis ad saporis gratiam, sed magis ad conseruationis necessitatem perferimus.

Pauca quædā explicaturus sum, quæ rudi adhuc lectori remoramento esse possint, cuiusmodi hoc est: quæ ratio nos mouerit, vt præter omnium consuetudinem pondera & mensuras, & vtriusque quantitatem integris propè nominibus expresserimus. Id autem quo consilio est à nobis factum, libro superiore in ponderibus & mensuris docuimus: *ἀνα* quoque & *ἰσχυ* Galeni more & Arabum scribimus. Neque etiam accusandi sumus, si quando pondera aut mensuras, quæ vno numero comprehenduntur, tamen ipso identidem repetito expressimus.

*Lib. I. c. c.* mus. Sic enim & Gal. myrti nigre sextariū  
*phar. par.* vnum, seminis api sextarium vnū, summi-  
 tatum ramorum myrti sextarium vnum: &  
 ibidem, adianti sextarium dimidiū, ladani  
 τὸ ἴσον, id est, tantundem: quum vtroque  
 scribere potuisset, enumeratis his omnibus,  
 ana vel ἴσον, id est, æqualem portionē. Hu-  
 ius ταύτης λογίας exempla sunt plurima apud  
 Græcos & Latinos medicos. Præterea quæ-  
 dam compositiones huius libri eiusdem rei  
 multiplicem habent mensuram aut pōdus  
 multiplex, ob id quòd ex magnis ceu portio  
 tantum aliqua sint diminutæ. Quomodo  
 apud Gal. emplastrus alba ariobarzani in  
 tegra, recipit lithargyri drachmas ducētas,  
 cerussę drachmas octoginta, cerę drachmas  
 quinquaginta, olei veteris heminas tres, ce-  
 rebinthinę drachmas triginta, cineris buc-  
 cinorum drachmas decem, thuris drachmas  
 nouem & decem, aquę cyathos duodecim.  
 Quę Heras sic ad tertiã partem diminuit,  
 lithargyri drachmas 66. obolos 4. & cetera,  
 lib. I. c. ph. g. & alibi exēpla hui⁹ rei plurima  
 inuenies. Nec te moueat, quòd eiusdem  
 simplicis doses varias secundum scriptores  
 varios in eadem compositione interdum  
 adscribimus, cū nec Galenum id facere pi-  
 guerit etiam in ponderibus diversissimis &  
 simplicium validissimorum, vt libr. 3. comp.  
 phar

phar.part.in fine. Mānæ thuris drachmas quatuor, alij drachmas quindecim: & paulo post calcis viuæ drachmas octo, alij drachmas quadraginta: gypsi tosti drachmas quatuor, alij drachmas octo. Aromata item nonnunquàm species etiam cum vulgo appellamus, Paulum & Actuariū sequuti, qui *ἡ Ἀσ* illa passim appellant. Adde quòd composita cum *διὰ* declinantur secundum terminationem per primam aut secundam declinationem Latinorum, vt per secundam & tertiam Græcorum, Diacalaminthe, thes, thæ, then. Diacydonion, nij, nio. Diamoron, ri, ro, & cætera, non autem cum medicorum vulgo, diacydoniō, nionis: diaphœnicon, diaphœniconis: diarhodon, diarhodonis, vt anasarca, cæ: hyposarca, cæ, vt ex Galeno lib. sanit. tuendæ, & compo. pharm. part. colligere est facile. Imperitiū idem faciūt in catholico cathartico, quod diacatholicō, conis, etiam qui se aliquid putant, quotidie scribunt. Si verò illa separatim & sine compositione scribantur, non mutata voce manet in genitiuo singulari vel plurali, quem *διὰ* tunc postulat, vt diacydoniῶν, dia morῶν, *διὰ τριῶν πιπιζῶν*: sic nos Arabum antidorum *διὰ τριῶν σενῶν* potius, quàm cum vulgo tria fantali. Ad horum imitationem ex Græca voce & Latina præfici

Atici quoque; diaprunum, ni, no, cōposuerunt, ut epitogium Quintilianus, & *ἐπιτογιόν* id est, aqua rosarum Simeon, quam *ἐλετάρια* Actuarius vocare maluit.

In compositionibus quoque vulgi nomenclaturas nō paucas immutavi, partim quòd ineptiores viderētur, partim, quòd veterum & in quibusdam recētorum appellationes tanquàm puriores & magis naturā rei nobis exprimētes, sequi potius placitum est. Nam quæ isti hodie nomina medicamentis tribuūt, confectiones, electuaria, opiata, lohot, rob, suffuf, & alia quædam vel Barbara sunt, vel rei dicendæ non convenientia. Confectio siquidem compositio est, ut conficere est componere, & in quam significationem hi cōtrahunt, sibi non constant: nec minus inepti sunt in re & nomine electuarij, quod electarium, id est, electa quædam simplicia continens medicamentum dicere alij malunt. Sed cū id omnibus compositis commune sit, ut in methodo componendi probauimus, cur quædam horum sic, alia aliter vocarunt? neque omnes rem eadem vocant electarium, sed hic solidam & siccam cōfectionem sic appellat, alius etiam liquidiorē. Opiatas rectiūs appellarunt medicinas, quæ scilicet opium recipiunt, quibus consistentia similes

les etiam opiatas vocant, quæ nos veterum more in antidotos reiecimur. Quas autem appellationes cuique composito medicamento hîc declarando aptiores esse putemus, partim docebimus in singulis compositorum formis & differentiis, partim nunc ex Actuario subiiciemus.

Cum causæ salubres sint quatuor summis generibus Galeno comprehensæ, sumendorum, admonendorum, educendorum, faciendorum, duo prima hîc docemus, neque hæc tota, sed in ambobus medicamenta tantum formis & viribus diuersa. Nam eorum quæ ingeruntur: quædam sumuntur trita solùm & læuigata: alia conuenienti humore subacta: alia in trochiscos, id est, circulos cōplanata: alia in catapotia, id est, globulos deglutiendos efficta: quædam aqua ad tertias coquantur, colantur, & decocti iure iam medicamentofo sumuntur, nunc per se, nunc cum vino, sapa, melle, saccharo: alia cum horum posteriorum alterutro cocta, donec concrecant, quod serapion & *σουλάπιον* Barbara voce solemus nominare: alia prius trita, deinde cum melle subacta, donec in vnitatem coëant, antidota vocamus. Fructus autem aliquot fugaces, aut iam coctos, aut in salgama plana redactos, ex melle aut saccharo tatisper

*Actua.*

*σουλά-  
πιον etiā  
Simeon  
vocat.*



tisper excoquimus, dum iustum crassamentum obtineant, & in bellariorum formas fingimus.

Ex admouendis verò quædam formantur in vnguenta, quæ solum illita auxiliantur: alia in emplâstra, quæ linteis extēsa, vel alutis tenuibus aut pittaciis induc̃ta superponuntur: alia vocâtur epithemata, quæ tanniis vinctâ hærent non suo lēto: quædam

*De his  
Paulus  
libro 7.*

velut *τριμματα*, id est tritura, & *ἐνγία*, id est, sicca & pulueres dicuntur, suntq; ea vltima & simplicissima omnium quæ sumuntur, quædam ceu collyria fingentes, quibusdam liquoribus diluimus, & ad coteri terminus, tanquam ocularia medicamenta: alia aliter pro ægrorum conditione, morbi & partis affectæ natura. Quas autem vires medicamentum quoduis habeat, ex simplicium natura & totius forma suis locis post audies.

*Actuar.*

Antidōta ex herbis, succis, lacrymis seminibus, radicibûsq; congestis, & operosè tritis, & in vnum cum melle coactis fiunt, mittis magna ex parte calidis, frigidis interdum, & etiâ sensum stupefaciētib; interdum & purgantibus, quæ etiâ serapiis & zulapiis miscentur.

Medicinas quæ non foris admotæ corpori, sed in corpus receptæ affectibus medentur antidota, ab *ἀντὶ τοῦ σώματος*, quasi

contra

contra affectus data, & fœminino genere antidotos medici appellant. Vnde cephalicæ, stomaticæ, stomachicæ, cardiacæ, splenicæ, hepaticæ, nephriticæ, colicæ, hedricæ, mithridatios, theriacæ, Galeno propè semper dicitur, sæpe substatiuo antidotus adiecto, sæpe non expresso. Eadem ratione apud eundem cephalicum, stomaticum, stomachicum, & cætera sæpe leges, antidotum scilicet. Horum quædam a lueris deleteria & lethalia pharmaca dantur, alia contra feras virulentas, alia affectibus ex prauo victu natis succurrunt. Sunt quæ vsum hunc triplicem promittunt, vt Mithridatios, Theriace, de quibus tanquam præstantissimis primùm nobis dicendum.

Antidota granissimis casibus opitulantur, maximè autem vtilia sunt aduersus venena corporibus nostris inserta morfu, ictu, cibo, potu: rectè etiam dantur in viscerum, laterum, faucium, interiorumque partium doloribus, & collisis ictu vel casu ab alto.

Quia antidoti etymon attigimus, subiit nobis in mētem docere, vnde de medicamenta composita nomen acceperunt, quæ nominis ratio magni est momenti ad rem intelligendam. Ab actione & effecto in morbum vel corpus totum athanasia, quòd immortalis, hoc est, maximè longæuos ho-

*Ga. initio  
Libr. 1. de  
antid.*

*Celsus li.  
5. cap. 22.*

mines facit. *ἰκκωγωνὸν* Andromachi ex aloës vnc. ii. croci, mastichis ana vn. vna. li. 7. comp. ph. p. vt aloë eccoprotica, li. 6. sim.

Sic cephalica, ophthalmica, stomaticā, arteriaca, stomachica, hepatica, splenica, colica, & id genus alia medicamenta, harum partium affectibus salubria, quæ etiā à parte vocata videri possunt.

Acopa, quia lassitudinem tollunt.

Ab inuentore.

Philonis antidotus, Philonium vulgò dictum, de qua in Mesue ex Galeno audies.

Mithridatios, à Mithridate Ponti rege.

Multa similiter cognominata sunt, vt Theriace Andromachi, ab Andromacho constituta.

Hiera picra Ga. q. eā vsu multo celebravit. Diarhodon abbatis, Puluis ducis, in horum gratiam à Medicis inuenta & appellata.

ἰὺς medicamentū ad ischiadas, li. 10. c. ph. p.

Diospolites seu diospoliticū, Iliis emplastrū.

Diadictamnū sacrum, quòd ex sacris Aegypti locis afferuntur, lib. 2. comp. ph. gen.

Cyphi heliacum & selenicum.

Antidotum *σωτηρια*, Paulus lib. 7.

A medicamento simplici vel præcipuo quæ Basis dicitur, vel copiosiore.

Diacalaminthe. Diacyminum. Dia trion pipereon. Diaphœnicon. Dia margar.

Opiar

Opiata antidotus, quod opium recipit.

Theriace, & pastillos theriacos recipit, vel  
& vipere moribus præter cætera auxilietur.

Hiera diacolocynthidos. Diaromatum.

A numero simplicium.

Tripharmacum ex lithargyro, oleo, aceto.

Tetrapharmacum. Theriace δια τριάρων.

πεντάμυρον, ex quinque, lib. 7. Pauli, cui ta-  
men quædam accesserunt.

Δεκάμυρον ex decem.

Dodecatheon, ex duodecim & melle.

Hecatombe Pauli, licet tantum simplicibus  
oëtoëdecim constet. A qualitate.

Cygnus Gal. & cygnus alb<sup>9</sup> & ruber Paulo.

Albæ & melinæ & virides emplastri, libr 1.  
comp. ph. gen.

ἑυχρώα, id est, boni coloris.

ἰσχυρῶν μίγμα in theriace.

δίχρωα, vel διχρώα, id est, bicoloria.

ἑυνώδεια, id est, beneolentia.

δυσνώδεια, id est, maleolentia. πικρὰ δὲ ἀλόνε,

quæ & hiera picra Galeni dicitur: est tamen  
ea multiplex, vt in hieris antidotis leges.

A modo vtendi.

Epithema ventriculi, hepatis, lienis, capitis  
aliarum partium quibus imponitur, quale  
quod scutum hodie vocant.

Hypoglottides, quæ sub lingua tenentur,  
vt paulatim liquata sensim deglutiantur.

*Ibidem.* Arteriace ἐκλεκτῶ 14. Andromachi lib. 7. comp. ph. par. ἐκλεκτῶν φαρμάκων, καὶ ἐκλεκτὰς δυνάμεις, καὶ ἐκλεκτὰ, id est linctus, quod lingēdo deglutiantur. ἱερὴνα ἢ ῥινέγχυστα, quæ naribus infunduntur. λεῖτα πότια ἢ λεῖτα πῖσσω id est, deuoro.

A forma compositi.

Τροχίσκοι, quod rotulæ formam habeant: iidem λυκκίσκοι à figura rotunda, & ἀγρίσκοι à panis exigui forma Galeno dicuntur.

A nota.

Sphragis Lēnia, id est, sigillū ex terra Lemnia, in cuius locum supponūt terrā sigillatā.

A loco, vbi componitur, celebratius.

Oleum Sicyonium, à Sicyonia regione Peloponnesi Dioscorid. Galeno autem & Paulo à cucumere agresti, vt in Mesue docem<sup>r</sup>.

*Ga. initio  
libri 1. de  
antid.*

**M**ithridates Ponti ac Bithyniæ rex omnium propè simplicium pharmacorum experienti i habere studuit, quæ lethalibus aduersantur, vires ipsorum in facinorosis hominibus morte damnatis cōprobās, vt Galeni tempestate Pergami rex Attalus. Quædam igitur ipsorum phalāgiis peculiariter resistere deprehēdit, quædam scorpionibus, alia viperis, alia cōtra aconitum valere, alia contra leporem marinū, alia contra alia deleteria. Quibus omnibus cōtemperatis, vnum cōfecit medicamentū Mithridates, nomina  
tum



tum ab ipso Mithridation, sperans se præfidiū aduersus omnia lethalia habiturū. Nec spes eū fefellit: vsu enim ei⁹ quotidiano corpus à deleteriis securū sic effecit, vt cū exitio fo & violento potius veneno (quo filia eius enectæ sunt) bis poto interire, quàm viuus in Romanorū potestatem venire statuisset, nullū inuenerit venenū, quod eū interimere potuisset, ob id gladio transfixus interiit.

Mithridatios antidotus ab Andromacho sic describitur. ad deleteria efficax, & internos omnes affectus.

Acori, phu pontici, hyperici, acacię, gummi ana drachmæ duæ.

*Gal. 2.*

*lib. 2. anti  
do.*

Scinci drachmæ duæ, oboli duo.

Anisi drachmæ tres.

Folij, \* nardi Gallicæ & Indicæ, rosarū siccarū, fœniculi seminis, meu athamātici, cardamomi, gētianæ, ana drach. quatuor, aliis trium, poltremorū drachmæ tantum duæ.

\* *νάρδος  
λευκός  
καὶ ἰνδικός.*

Opij drachmæ quatuor, oboli duo.

Petroselini drachmæ quatuor, oboli tres.

Cassij, polij, seseleos, costi ana drach. quinque, oboli duo.

Gallij drach. quinque, oboli tres: aliis drachmæ sex.

Styracis drachmæ quinque, oboli quatuor. Myrrhæ, castorij, thuris, hypocisthidis succi, ana drachmæ sex.

Ναρδορά  
xvθ.

Spicæ nardi, opopanax, scœnu anthus, resina terebinthina, scordij, cypheos, ana drachmæ sex, oboli duo.

Dauci seminis drachmæ sex, oboli tres.

Opobalsami, thlaspeos, ana drachmæ sex, oboli quatuor.

Galbani drachmæ septem.

Croci, cinnamomi, zingiberis, ana drachmæ septem, oboli duo.

Glycyrrhizæ drachmæ septem & dimidia, & oboli quatuor,

Vini chij quod satis est.

Mellis Attici cocti quantum sufficit, hoc est, libram vnam in pulueris vnc. tres, vel si delicatius vis, sed minùs efficax, in pulueris vnc. duas. Eadem ratio est quantitatis mellis seu sacchari, & puluerum in cæteris antidotis.

Mithridatis theriace, qua semper vsus est Mithridates contra venena lethalia, & qua vtebatur Andromachus, scribitur Galeno libr. 2. antid. ab hac diuersa, vt dimidium theriaces post dicendæ videatur.

Mithridatios à Damocrate aliter sic describitur versibus apud Gal. lib. 2. antidoto. Myrrhæ Arabicæ Trogloditidis, croci, agarici, zingiberis, cinnamomi, spicæ nardi, thuris, thlaspeos, ana drachmæ decem.

Opobalsami, seseleos, scœnu anthus, stœchad

chados, terebinthinæ, galbani, costi, piperis longi, castorei Pontici, hypocisthidis succi, styracis boni, opopanax, foliorum malabathri noui, ana drachmæ octo.

Cassia nigre, polij, piperis albi, scordij, seminis dauci Cretici, carpobalsami, cyphEOS, bdellij (quod quidam addunt) ana dra. 7.

Nardi puræ Celticæ, gummeos, petroselinij, succi papaueris, cardamomi, fœniculi seminis, gentianæ, foliorum rosa, ana drac. 5.

Distamni Cretici paulo amplius, vel æqualis portio.

Anisi, arij, acori, phu, sagapeni, ana dra. 3.

Meu athamantici, acaciæ, scinci ventris, hyperici seminis ana drach. duæ & dimidia.

Vini mediocris modus, & mellis similiter quod moderatū fuerit. CyphEOS compositio à Damocrate eodem hæc describitur. *ταπίδι*, id est, vix passæ pinguis

(à qua cortex ac semen totum sint exempta) carnis læuigatæ probè, terebinthinæ \* *κελευμίνος* legerem potius cum

\* *υστε* ana drachmæ Atticæ vigintiquatuor. *Διοσκ. in Cyphi, στήτινος ἀπο*

Myrrhæ, schœnu anthus, seu iunci rotundi, ana drachmæ duodecim. *κελευμίνος, τε*

Cinnamomi drachmæ quatuor. *σινάβαρμύνης, τε*  
Bdellij lacrymæ, spicæ nardi, cassiæ bonæ & puræ, cyperi, baccarum iuniperi grandium & pinguium, calami odorati ana drachmæ tres. *σινάβαρμύνης, τε*

Aspalathi drachmæ duæ & dimidia.

Croci drachma vna. Mellis & vini modus mediocris. Bdellium, myrrham, vinū in mortario tere ad mellis liquidi crassitiē, melle superaddito vuam cum aliis tere. Omnia vbi erūt læuia, fac cyclos paruos. His Aegyptij sacerdotes diis suis propitiādis suffitu vtūtur. Sic Rufus vir optimus, & in arte exercitus, parandum prodidit. Permultæ enim eius compositiones etiam Dioscoridi, quarum vnā describit ab hac diuersissimam, tamen quam in antidota quoque misceri ait. Paulus quoque libr. 7. describit cyphi magnum *ἡλιακόν*, id est, solare dictum, ex rebus triginta sex confectum: & *σεληνιακόν*, id est, lunare, quod ex rebus viginti octo constat: vtrunque ab hoc etiam maxime differens: tamen etiam ad conciliandos deos odore grato compositum, & naribus nostris admoēdum, vt destillationes à capite in partes subiectas cōcoquat, & grauedine obstructioneq; nos liberet, & cerebri ventriculos purget, & pestilentibus morbis resistat. Per os etiam cyphi sumitur tum ad hæc, tum ad eaquæ pectori inhærent coquenda, necnō ad frigidos hepatis affectus. Miscetur medicamentis præcipuè epithematibus & antidotis, quæ inde Cyphoidea vocantur, Paulus lib. 7.

Mithridation autem Andromachi à ple-  
 risque Romanorum imperatoribus proba-  
 tissimam antidotum ex simplicibus circiter  
 quadraginta duobus & cyphi constantem,  
 meritò prætulereis farragini nescio cui Ni-  
 colai ex simplicibus centū & octo constare,  
 eadem promittenti, sed verbis plurimis ad  
 capitis, aurium, oculorum, dētium, pulmo-  
 num, vētriculi, intestinorum affectus frigi-  
 dos, hoc est, pituitosos, melancholicos, seu  
 ad stuporē, paralyfin, apoplexiam, epilepsiā,  
 spasmus, tetanū, cephalæā, hemicraniam,  
 maniam, melancholiam, grauem auditum;  
 oculos lacrymantes, odontalgiam, cynan-  
 chen, asthma, sputū sanguinis, perineupmo-  
 niam, lienteriam, dysenteriā, siue sumatur,  
 siue admoveatur: prætereā ad frangendos  
 calculos, menses ciendos, omnia vteri vitia,  
 scirrhus, podagras, morsus & ictus venena-  
 tos, morsum canis rabidi, ad febres quoti-  
 dianas & quartanas initio accessionum, co-  
 cta iam materia, in modum auellanæ cum  
 vino vel aqua, cui saluia vel menta sit inco-  
 cta. In aliis autem vespere sumpta & admo-  
 ta, quæ omnia per internos omnes affectus  
 intelligit Andromachus.

Mithridation autem priorem theriace  
 descripsimus, quòd hac prior tempore fue-  
 rit, & quòd ex ipsa theriacen excerpserit



Andromachus, vt mox audies : adde quòd ad pleraq; deleteria est efficacior quàm theriace: qua tamē inferior est in morsus viperæ curatione, Gal. initio lib. 1. & 2. antidot. Populis autem septentrionalibus Gallis, Germanis, Anglis, Scotis cū rarissima sint venefica, & malefica animalia, contra hæc mithridatio aut theriace non egent, sed cōtra alios affectus nuper dictos, quos magnopere antidoti istæ profligant, vt paulò post audies. Ad theriacam antidoton transeamus, in qua vt cæteris medicamentis nosse misturam, facultatem, vtendi tempus, & mensuram oportet. Quapropter de his est nobis nunc dicendum.

*Libr. theriacæ ad  
Pisonem.*

**T**heriaca autē dicta est, quòd ferarum & viperarum moribus medetur, & quòd viperas recipiat. Eam verò ex optimis & plurimis medicamentis cōposuerūt contra morsus venenosos & pharmaca deleteria (quæ duo sunt mala in tota vita grauissima) & cū perpenderēt hominum naturas permultum inuicem differre, & aliud alij medicamentum esse idoneum, meritò exactam ipsius & variā fecerunt misturam, vt omnibus prodesset. At cū tantus sit *ἀν-  
πίων*, id est, ferarum numerus, vipera, basiliscus, hæmorrhus, dipsas, scorpius, aspis, cerastes, phalangium, hydrus & aliæ permultæ,  
sola

sola tamē ex his vipera eligitur, quod ceteræ maximam vim noxiam in suis corporibus totis habeant, vt docet Galenus libr. de theriaca ad Pisonē, vipera eā vim noxiam in capite & cauda solū habet, carne reliqua natiuam habet virtutem ad salutem, vt animalia pleraq; de quibus in his quę agūt à tota substantia fusiùs egimus lib. 2. Porro viperarū in theriacam paratarū vis tabifica & corruptrix largior tollitur cauda & capite amputatis. Quæ si qua in carnibus remanet, obtūditur coctione, sale, anetho, reliquis præstantissimis medicamētis, ac dissoluitur: sic vesicæ per se noxia cantharis, & succus papaueris per se potus lethalis: mista verò aliis, ex præparatione plurimū virtutis auxiliatricis acquirūt illa ad vrinas innoxie mouendas, hic ad somnum conciliandū & vires insomnia deiectas reficiendas.

Theriaceæ antidotus ab Andromacho Crētēsi Medico Neronis primario ratione & experientia absolutissimo, ex Mithridatio decerpta est, quibusdam ademptis, quibusdam adiectis, potissimū carne viperarum non exigua, ob quam appellata est theriace ἀπὸ τῆς οὐφίως, id est, à fera omnium fæuissima ἰχθυῶν, hoc est, vipera, ad cuius morsus est præstantior mithridatio, quā ob id ex hominum usu magna ex parte deie

deiecit. Porro Theriace ob simplicium  
probitatem, & horum virtutis inter se pro-  
portionem fit præstantissima, vt cætera me-  
dicamenta composita: tamen qui Philoniũ  
antidotũ aut aliud quoddam exigũ com-  
ponit, non adeo summè bonis medicamen-  
tis eget, vt qui Mithridation aut Theriacẽ,  
aut aliud multæ misturæ & cinnamomum  
recipiens, conficit: hic enim omnium præ-  
stantissimis eget: qualiũ copia Romæ Cæ-  
saribus facilius quàm alibi gentium suppe-  
ditabatur. Ob id in ea non Medici soli, sed  
etiam myrropolæ præsertim diuites præstā-  
tissima hæc medicamenta componebāt. In  
quibus tamen sæpe (quia inuentu difficilia  
omittebant) non leuiter peccabant. Cæsa-  
riani verò Medici nullo destituti ad probā  
compositionem, soli perfectissimè talia cō-  
ficiebant. Quæ res profectò facilis potētissi-  
mo Regi nostro Francisco fuerit nauiga-  
tionibus, suorum quidem, Alexandria: Ve-  
netorum verò, ex tota propè asia: Lusitano-  
rum autem, ex Aphrica & India, optima  
quæq; consequi medicamenta. Demus igi-  
tur operam, vt singula his cōpositionibus,  
necessaria habeamus optima ab integræ fi-  
dei amicis ex regionibus, in quibus sunt præ-  
stātissima: quæ libris nouisse non satis est,  
sed horum notas omnes oculis aliisq; sensi-  
bus,

bus,ter,quater,frequentius accuratè explorabis,ne te fallant institores tam callidè omnia adulterantes,& veris assimilantes, vt etiam exercitatisimis imponant. Tamen vt ad explorandum veniat instructior, paucis notas optimorum quorūdā simplicium ad Theriacen necessariorum perstringam, vt cognitis optimorum notis,quisque deligat optima,quæ apud suos,aut vicinos, aut alias gentes existunt:vt primùm habito singulorum delectu, deinde præparatis quibusdam,legitimè tandem ipsam Theriacen componas.

Quoniam alia aliis locis & abundant & *Libr. 3. c.*  
meliora sunt simplicia, ex quauis regione *ph. part.*  
prestantissima eligantur, quibusdam his indicationibus adhibitis.

Radices sint cortice intento, non rugoso aut rancido: id enim macræ radicis est indicium.

Fructus sint optimi, multi cum surculis & germinibus,& aliis,quæ ipsis inhærēt foliis, inuolacris, floribus.

Semina, vt radices, sint bene nutrita, hoc est procera, & plena, quod intentus cortex indicat.

ὄπῆς & χαλᾶς non siccatos tempore, nec suis qualitatibus, & viribus inualidos gustatus & olfactus indicabunt.

Herb

Herbæ autem in Theriacam recipiendæ sunt, scordium, nepita, prasion, stœchas, dictamnus, polium, chamædrys, chamæpitys, hypericum, centaurium tenue.

Radices, zingiberis, ireos, rhei, pētaphylli, costi, nardi Indicæ, nardi Gallicæ, Gērianæ, mei, acori, plu, aristolochiæ tenuis.

Semina buniadis, id est, napi, Ruell. in Actuar. petroselini, thlaspeos, ameos, anethi, fœniculi, dauci, cardamomi.

Chamæpityn, chamædryn, thlaspi, centaurium, hypericum, polium, & alia eiusmodi florentia accipies, non sole æstiuo, siccata, neque dum fructus horum adhuc crudi sunt & imperfecti.

Mel theriacæ idoneum sit dulcissimum, & acerrimum sapore, pallidum colore, aut flauum, odoratissimum, substantia nec crassum & grumosum, nec impensè liquidum, sitq; totum sibi vnitum & lentum, vt digito si tollatur, visci modo longissimè seruet continuitatem, quale est Hymettium, vel Thasium, vel Atticum, vel aliud simile, sed mediocriter coctum sit, vt terreum & flatulentum coctione separetur. Mel item bimum vetustiore & recentiore est melius, modò non sit amarū, aut vinosam aliquam qualitatem odore & sapore referēs, siue vetustate, siue coctione & despumatione lon-



ga vtrunque contingat, id quod sola experientia probatur.

Vinum quoque sit phalernum, acre, laudatissimum, vel simile: non phalernum faustianum dulce, non imbecillum aut recens, & crudum adhuc ob nouitatē. Melius enim est verus, nōdum tamen amarum: sit etiam tenue substantia, perlucidum *λίπρον*, id est, fuluum, non album, non rubrum, non nigrum: sitque odoratissimum, & suauissimum, non quōd id theriaces aut mithridatij virtutem reddat meliorem, sed quia has antidotos alioqui ob multa amara (nam amara sunt omnia medicamenta, quæ longo vsu virulētis bestiis aduersari sunt iudicata) ingratas, gratiores efficit. In omnibus enim medicamentis, quæ deglutiuntur, ratio est habenda & sollicitudo de saporis gratia, vt in methodo medicamenti componendi abundē probauimus.

Vinum ergo misce firmissimum, & validum imprimis, & quod pluribus annis non ampliùs mutari probaris: vitabis autē valde imbecillum, aquosius, valde austerum, facilē acefcens, vetustate amarum.

Opium Thebaicū, vel illi bonitatē proximum. Marum sit valde amarum, minùs acre, odoratius, amaraco acri & minùs amaro. Vtraque sint Cretica.

Rosæ præstantissimæ sînt omnium suavis-  
simæ, & aliis rubicundiores.

Scordium Creticum optimum: tamen  
nō malū in aliis regionibus potest inueniri.

Napi seu rapæ syluestris semen Creticū.

Iris Illyrica, & ex ea vt cæteris medica-  
mentis, odoratior: vnumquodque enim est  
præstantissimum, quod proprium generis  
sui odorem, vt & saporem habet valentis-  
simum: non Libyca, quæ ab Illyrica tantum  
abest, quantum corpus mortuum à viuo.

Agaricum leuissimū est laudatissimum,  
densum, graue, lignosum est deterri-  
mum.

Cinnamomum sit odoratissimū, seu in-  
dicibilem quandam odoris gratiam super  
alia omnia referat, gustanti calidum admo-  
dum percipiatur, non tamen vt molestè ro-  
dat. Colore aut tale, ac si quis lacteū colorē  
cū *φάφ*. i. fusco & modicè cyaneo misceat.

Succus glycyrrhizæ Creticus præstantis-  
simus, vt cretica glycyrrhiza.

Opobalsami Iudaici, id est, optimi, notas  
omnes repere ex simplicibus. In quibus etiā  
fusiis horum singulorum proborum indi-  
cia legas licet.

Myrrha optima opocalpaso aut liquore  
aliquo non vitiata: sit autem Troglodyris  
aut Minæa, à regionibus, vbi præstantissi-  
ma gignitur.

Crocus fit Corycius, à Corycio antro, in quo nascitur: vel potius ali' odoratissimus. & longo tēpore in vigore suo persistens, ac flauissimus. Nā robore odoris præsentanei, & diurnitate; & flauitie optimus est iudicandus, non proceritate Corycio præcipua.

Zingiber non pertusum, sed siccum & acre esto.

Rheon densum contractumq; substantia validè astringēs, si viget ac integrū est: nam citò perforatur. Quod autem coctū est, rarius est, ac nihil aut minimum astringēs: huius loco rha barbarum Auicēna substituit.

Pentaphyllum siue fit tormentilla vulgaris, siue aliud, interea tamen dum lis dirimitur, cape tormentillam.

Calaminthe Cretica montana melior.

Prasiū albū & Creticū, vel ex editis locis.

Petroselinum fit Macedonicum: idem amarissimum est atque acerrimum.

Stœchas Cretica, vel ex Stœchadibus insulis: sic enim lego in Gal. non Cycladibus.

Costus fit, qualem ex Diosc. in simplicibus pinximus.

Piper longum natium. ob id in aqua insolubile, album in simplicibus.

Dictamni herbæ Cretensis folia, nō cum vulgo radices fictirix.

Iūcus odoratus fit Arabicus. Flos melior,

sed rarus aduehitur, quòd eum in viis Arabiæ frequentissimum iucundissimè pascant cameli: solo odoris vigore discernitur. Illius enim odoris gratia citò vanescit.

Thus sit *ἀμντεν* masculúmque.

Casia optima, q̄ surculis, & corticis tenuitate, gustu, odore sit cinnamomo simillima.

Indica nardus radix est, quæ tamen à spicæ similitudine spica nardi dicitur.

Polium, chamædrys, chamæpitys, hypericum, gentiana, thlaspi, nigrum veratrū, & alia quædā Cretica paulò præstantiora sunt Italicis. Si tamē ver totum siccum fuerit æstatis modo, Cretensisbus Italica non multò sunt inferiora, Sefeli Massiliense.

Styrax sit, qui in arūdinibus ex Pāphyliā affertur, & paucissimus gignitur, tāq; diuersus ab hoc copioso styrace, quàm falernū vinum ab eo quod in tabernis venditur. Cape calidissimum, odore & sapore valētissimū.

Thlaspi Creticum, colore *ὠχροξανθον*, figura rotundum, multò minus milio. Præstat verò ex Cappadocia alterum, multò nigrius, & maius prædicto, nō exactè rotūdū.

Ami Creticum, vel ex regionibus siccis & altis.

Hypocisthis

Malabathri folium

~ Vtrūq; quale Diosc. describitur.

Terebinthina sit Chiapotiū, quā cū Androma

drumacho Libyca: aut cū aliis Pōtica. Chia enim oībus aliis odore & sapore præcellit.

# VIPERARVM DELECTVS,

*ex huius ritè paratis pastillorū theriacorum compositio, ex Galeni libris.*

**V**iperæ deligantur magnæ, bene nutritæ, corpore toto & ventre crassiore, subflauæ, collo valde prominenti, capite latiore, oculis rutilis ac subrubētibus, interterritis, trucibus, ac ferino aspectu, præsertim irritatæ, meatu magis ad extrema caudæ vergente, cauda non inuoluta sed potius conuersa, validæ, bene mobiles, tamen incessu quieto & tardo. Hac enim re fœmina differt à masculo: & quod ea caninos & acutos dentes habet, plures duobus masculo propriis in capite acuminato: ad delectum quædā præter hæc tēpus venationis harum, & in his enecādis apparētia, de quibus mox dicam, pertinent. *Engix*, id est, viperas Crito vult capi in fine veris, aut titygeto, id est, autumnī medio: cauendam verò æstatem ab initio ad canis ortū. & huic succedentis oporæ tempus, cū fructus fugaces eduntur, & bilis hominibus copiosissima suboritur. Galenus quoque viperas venatur exacta hyeme, veris initio, vbi latebris relictis in apricū prodierint, & nemora petunt, ac subdiales semitas, & semine ma-

*Nicander  
in theria.*

*Gal. in fi.  
lib. I. anti.*



rathri oculos recreant, suntq; iī audaces & celeres, nec virus tam maleficum retinent. Nam delitescentes maligniorem vim tabificam in se contrahunt, quia nulla ex parte digerūtur, tuncq; serpens omnis solet vocatum *γῆρας*, id est, senium & exuium colligere, quod est crassissimū quoddam tegumentum tempore quo delituit contractum magis quā ætate animalis. Non statim igitur vbi latebras egressæ sunt, capiendæ, sed permittendæ aliquandiu, & aëre frui, & consueto vesci cibo, hoc est, herbis quibusdam & animalibus, vt buprestibus, cantharidibus, pityocampis: hæc enim idonea ipsarum sunt alimenta. Nec te moueat, quod Crito in fine veris capit, Galenus initio veris: lib. autem simplicium vndecimo, ineunte æstate optimam viperarum carnem pro-  
dit. Nam hæc tempora sunt finitima, & parui momenti est horum differentia, si ceteras conditiones ante venatum necessarias, quas nuper dixi, obseruaris. Ne autem capiantur æstate media, quia tunc caro earum fitim efficit, vt semper earum, quæ in locis maritimis, aut aqua salsa. Neque capiantur mox, vbi latebras reliquerunt, quod tunc earum caro frigida est & sicca, ac malè nutrita, sed tempore inter hæc medio, desinēte scilicet vere, nondum verò inchoata æstate:

æstate : vel si ver admodum hyemale extiterit, æstatis initio non longè à Pleiadum ortu. Non capiendæ item prægnantes, quia emaciatae sunt. Capiendæ autem sunt notandæ magnitudinis viginti, aut paulò plures. Hęc enim quantitas medicamento non erit nimia, vt ad totius confecturæ copiam sufficiat, vel pro quantitate compositionis accipiendæ sunt. Capita & caudas recens captarum & adhuc viuentium præcide, vt cum sanguine virus effluat. Præcides verò in magnis viperis ad digitos quatuor: Damocrates autē capita ad tres digitos prius, postea caudam ad paulò maiorem quantitatem præcidit apud Galenum, quòd hæ partes sunt virulentæ magis & duræ, & modicæ carnis. At Gale. lib. vndecimo simplicium caudam negat præcidendam, quòd quæ ad hanc excremēta tam liquida quàm sicca esse possunt, exenteratis viperis facillè eluantur: quod autem in ore est venenum, ineluibile est. Idem verò in libro de Theriaca ad Pisonem aliorum sententiam sequutus caudam tollit, quod sordidiorem (inquit) substantiæ portionem pars hæc magis exercita plenius trahit, vt quæ piscium caudis proximæ sunt partes, ob frequentem motum magis nutritæ sunt. Quòd si post amputationem dictarum partium

protinus exangues ac immobiles & mortuæ fiant, tanquàm theriacæ inutiles reiciantur. Contrà quæ aliquandiu post præcisionem motum aliquem retinent, & sanguinẽ diutius fundunt, præstantissimæ, quia virtutem habent *πρὸς τὸ σώζειν*, id est, ad seruandum non ignauam sed validam.

Partibus his resectis, intestina exime, quia sunt excrementorum receptacula. Cute deinde vt anguillis detracta, & tota pinguedine ceu inutili exempta, corpus reliquum aqua pura probè lotum in fistile vas elegantissimè constructum, vel ollam, vel cacabum, vel leberem probè extersum & splendidum immitte cum aqua fontis pura, anethoq; viridi, tunc enim viret. Fasciculum verò mediocrem anethi sicci Damocrates imponit. Coque mox igni ex carbonibus perustis, aut lignis ob siccitatem *ἀνὰ πνοήν*, id est, sine fumo, aut potius ex vitium farmentis, cum pauco salis recentis, si apto tempore cepisti viperas: sin estate, sine sale. Hūc autem salẽ statim initio imponit Gal. libr. 11. simplic. dum coquitur verò, miscet lib. 2. ad Glauconẽ, quæ tenui discrimine distant. Id autem fit ad compositi suauitatem, quæ etiam causa pastillis theriacis ad leuorem tussis & cribratis vtendi tempore salem miscet, libr. 11. simplic.

Vbi iam percoctæ sunt, vt caro ossa & spinas promptè relinquat, & edi posset, de-  
pone ab igni, aqua exime, carnes a spinis vi-  
rus olentibus & abiiciendis, accurate secre-  
tas, ac probè tritas cum pane friatq misce,  
& pastillos forma.

Panis sit purissimus ex purissima semida-  
li, id est, similagine & flore farinae, falsus,  
fermentatus, non hipnites, id est, coctus sub  
testa, sed clibanites, id est, coctus diligenter  
in clibano, alioqui medicamentum facile  
acesceret. In sicca domo tã bene sit sicca-  
tus, vt in mortario ad leuorem tundi possit.

Panis momētum miscet Andromachus,  
id est, partem dimidiã, vel tertiam, vel quar-  
tam, interdum quintam, quantum scilicet  
pastillis formandis sufficiat. Panis vnciam  
vnam carnibus viperarum sexdecim accu-  
mulatis miscet Crito. Panem triticeum  
pulum æquali pondere miscent Damocra-  
tes & Magnus. Eum panem maximè  
friatum & læuissimè in mortario tritum  
misce cum carnibus accuratè, & subige, vt  
nulla viperinæ carnis portio non læuigata  
maneant. His probè tritis affundunt parum  
iusculi decocti plerique, & Galenus in The-  
riaca ad Pisonem, & Actuarius: libro au-  
tem simplicium vndecimo, panem requi-  
rit siccum, vt contundi in mortario pos-

fit: tamen tundendo non miscetur carni, sed decocto viperarum maceratur, & caro in mortario coquorum teritur, donec sit levis, tuncque pani miscetur, sic ex pane non sicco, sed per viperarum decoctum irrigato, diu se, & Casarianos ante se medicos præparasse Galenus scribit: sed quia ægrè siccescebant, & caro putrescebat, panis verò acescebat, cognitum errorem Galenus emendauit, & iusculum miscere desinit. Quum ex pane sicco facilius siccentur pastilli, quàm irrigato, & panis per se in læuorem tritus carni viperinæ etiam per se prius exactè læuigatæ melius miscetur, & fiunt cycli vel cyclisci, id est, orbiculi, vel ἀγρίσκι, id est, pastilli, (quæ alio diminutiuo λυκλίσκι καὶ ἀγρίσκι vocat Damocrates) vel τροχίσκι, id est, rotulæ tenues mel mediocres opobalsamo modico subacti. Nā crassi, ut qui cum iure sunt facti, antequàm siccescāt, carnem viperarū putrescere, & panem acescere permittunt. Mox ubi erunt formati trochisci, siccentur in domo calida sicca, & in eadem reponantur. Sit autem domus hæc sublimis, & meridiem spectet, aut saltem non septentrionem, ut bona diei parte domus accipiat solis radios. sicutamē ut pastillos in vmbra locatos solis splendor & radius non attingat. Sic enim facilè siccabuntur, &

Li. II. sim  
plic.



& si continenter verteris, utraque parte æqualiter. Nisi autem vertantur, parte superna plus iusto siccantur, inferna humidiores, dum diutius manet, putrescere periclitantur. Siccati in eadem domo etiam extra solis radios condantur, continuè vertendo aliis diebus plurimis ut quindecim: post donec theriacen sis præparaturus, repone vase vitreo, vel aureo potius quam stanneo, ut quod plumbi mistura adulteratur. Quod autem ex argento non purgato fit, celerimè huic ærugo obnascitur. Ob id ex utroque metallo, stanno inquam, & argèto non purgato, vasa non in hac solum, sed in cæteris quoque antidotis vitabis. Præstaret tamen non multò post his pastillis uti. tamen efficares adhuc sunt post annum, & post tempus etiam longius. Nam probè initio siccati & repositi annis tribus & quatuor in vigore permanent, si modò pulverem ipsis obductū linteis puris aliquoties abstergas. Cuius diu adhærescentis occasione perforantur, tuncque inutiles euadunt, alioqui utiles, etiam si plurimum inueterentur.

*Lib. I. antidot.*

PASTILLORVM SCILLI-  
ticorum confectio.

*Pastilli  
scillini li.*

**S** Cillam bonæ magnitudinis (non tamen admodum magnam & enormem) bene habitam & nutritā, albam, recentē ex terra

*I. anti. &  
lib. de the.  
ad Pison.*

fumes, cū folia eius & caulis exactè inaruerit, seu vt Crito iubet, quando triticum metunt: tunc enim potissimū viget. Corticosa eius parte & radice lignosa omni adempta, corpus reliquū maza seu farina tritici optimi, recentis, fermentata & subacta circumline (quidam etiam cum cortice maza circundant) non autem gypso aut luto cum Critone: id enim sordidum est. Deinde in calido cinere copioso vel clibano calido, si quis adest, cum panibus quoque, vel *ἰωνῶν*, id est, testa furnacea, vel cacabis, vel patinis quibus panes coquuntur. Coques autem æqualiter, & donec maza bene ficcata in crustum omnino dure scat & abrūpatur, ac festuca in scillę corpus per rimas demissa pròptè recipiatur.

Crusto abiecto, scillę medullam cū Critone, id est, scillę ipsius partes interiores tenerrimas, exactè tritā misce cū farina crui candidi (non albū enim est vehemēter amarum) parum torrefacti. Farina autē hæc sit optima, recentissima, adamussim leuigata, tenui cribro creta, vt sit vna farine pars, scillę duplum cum Critone & Damocrate & Magno: vel cū Andromacho minore, duæ partes farine, vt 3. nonaginta: scillę verò tres, vt drach. centū viginti. Sed largior hæc farina, vt parciore est dimidia cum Damocrate

crate & aliis. Portio autem farinæ & scillæ æqualis Galeno magis placet, ceu fingendis pastillis aptior.

Quidam huius farinæ penuria micam panis friatam, vt in pastillis theriacis addunt. Formantur autem trochisci mediocres, & ficcantur ac reponuntur vt theriaci.

## HEDYCHROON MAGMA

*sic conficit. Andromachus.*

Mari, amaraci ana drac. duas.

Asari, aspalathi, schœnu an

thus, calami aromatici, phu } ana drach.

Pontici, xylobalsami, opo } tres.

balsami, costi, cinnamomi.

Myrrhæ, folij malabathri, costi, casia, nardi

Indicæ, ana drach. sex.

Amomi duplum.

Mastiches Chia drachmam vnam.

Omnia vino falerno sparge, fac magma.

## HEDYCHROI MAGMA

*is compositio alia ex Magna Galeni.*

Aspalathi radiceis corticis, ca

lami aromatici, schœnu an } ana drachm.

thus, phu, costi, asari, xylo- } sex.

balsami, casia, mastiches, fu-

liorum malabathri.

Nard

Nardi Indicæ drach.sexdecim. Croci drachmas nouendecim. Amaraci drachmas viginti. Cinnamomi, amomi, myrrhæ ana drachm. vigintiquatuor vino falerno excipe, & opobalsami contactu. Pastillos finge, sicca in vmbra. Pastillos Hedychroos iisdem propè componit bis Actuar. sed ponderibus, vt hîc quoque, mutatis, & quibusdam omisissis, quibusdam additis.

## T H E R I A C E S

compositio.

\* Piperis  
lōgi 3.24  
ponit An.  
pater : cui  
credēdum  
magis quā  
filio ponē-  
ti tantum  
drac. sex.  
Illius e-  
nim pōde-  
ra carmi-  
ne elegia-  
co scripta  
de praua-  
ri non po-  
tuerūt: fi-  
lij prosa  
scribentis  
potuerūt.

Pastillorum scilliticorum drachmæ quadraginta octo Andromachus, & cum eo cæteri: sed Demetrius tempore Galeni factus etiam archiatros, tantum drachmas quadraginta sex miscebat.

Pastillorum theriacorum

Magmatis sicci hedichroi } ana drach. vi-

\* Piperis nigri Damocra. }

Opij

ginti quatuor.

Ros

Rosarum siccarum folio-  
rum

Scordij Cretenfis

⁂Buniadis dulcis seminis,  
gongilidis agrestioris  
seminis alij

Iridis Illyricæ odoræ

Agarici albi Pontici

Cinnamomi.

Hæc duo omittit Andro-  
machus pater, addunt fi-  
lius & Damocrates.

Succi glycyrrhizæ, ficci  
addit Damoc.

Opobalsami Iudaici bo-  
ni

Singulorum  
drachmę duo  
decim.

⁂Napi

Ruel.

Act. A

mic.

Rap. Ni.



	Myrrhæ Trogloditidis	
	Croci Corycij, vel potioris	
	Zingiberis sicci & acris	
*Rhabar bari.	*Rhei Pontici integri	
	Pentaphylli radices	
*Aui- cen.	Calaminthes siccæ, hoc est, nepithæ Romanis dictæ.	
	Prasij seminis, vel cum Da- mocrate,	
	Σφαίρειον, id est, verticillo- rum marrubij	
	Petroselinij Macedonici mō- tani, tenuis seminis	
	Stæchados Creticæ, vel à Stæchadibus insulis	Singulo- rū drach. sex.
	Costi candidi	
	Piperis albi & longi. Cyanei Andropater.	
	Dictamni herbæ Cretensis.	
	Σχοίνου ἄνθεος Damocrates:	
	λαγφίον alij, id est, iunci odore floris, σχοίνου ἰνώ- δους alij	
*ἀμύρον. masculi alij.	Thuris * infecti,	
	Cassie fistulæ nigræ corticis	
	Nardi Indicæ	

Polij Cretenſis comæ

Sefeleos

\*Styracis Pamphylij

\*Thlaſpeos tenuis Cretenſis, vel potius Cappadocis magni

Ameos

Chamedryos } campeſtris

Chamepityos } Cretenſ.

Hypociſtidos ſucci flauētis

Malabathri foliorum

Terebinthinæ

Nardi Gallicæ puræ

Gentianæ radicis

Aniſi ſeminis torrefacti

Mei Athamantini

Succi acaciæ adhuc humidæ

Damo.

Fœniculi Cretenſis ſeminis

Terræ Lemniæ

Chalcitidis toſtæ

Amomi vuæ

Acori

Phu pontici

Carpobalfami

Hyperici Cretenſis ſeminis

Gummeos

Cardamomi

\*liquida

Amic.

Calami-

te Nic.

\* δαάσ-

πiⓄ λs.

π/ῆs.

Singulo-

rū drach-

mæ qua-

tuor An-

dromac.

drachmę

duæ Da-

mocra-

tes.

Lacrymæ

alię.

Carda-

mi, id eſt,

naſturtij.

Dau

*Auicē &  
Nicol.*

*Mumia*

*Nicol.*

*Belzeaz.*

*Auicēna*

*addit.*

*Aristolo.  
lōgē Nic.  
rotundē*

*Auicēna.*

Dauci puri Cretici seminis  
Galbani, χαλβάνης, χαλβά  
vidis

Andromachus senior.

Sagapeni recentis & veri  
Opopanacis

Bituminis Iudaici

Castorei seu castoris testi-  
culorum

Comę centaurij Cretici te-  
nuis non recentis

Radicis tenuis aristolo-  
chię propè siccataę

Singulorum  
drachm. duę  
Androm. 3.  
vna Damo-  
crates præ-  
stantiss. Me-  
dicus, in lib.  
de antidoto-  
rū cōpositio-  
ne versibus  
scripto. Cæ-  
tera Andro-  
macho con-  
sentit.

Mellis Attici drachmas cētū quinquagin-  
ta, seu libras decem Androm. vini falerni,  
quod sufficit. Aliā ordine contrario scribit  
Galenus, incipiens vbi alij desinunt: à mini-  
mis enim pōderib⁹ incipit, & desinit in ma-  
xima, à quibus alij incipiunt. Incipit enim  
Dauci fructus, opopanacis, &c. ana drachm.  
duas. Polij comę, seseleos &c. ana duplū, id  
est, drach. quatuor. Myrrhę, croci &c. ana  
drach. sex, vbi etiā χαλαμν additur: reliqua  
eodem ordine, duplā tamen proportionē.

Ex his patet Adromacho per omnia cō-  
sentire Damocratē, præterquā in duobus  
dictis pōderibus. Xenocrates etiā studio se  
in componendis medicamentis versatus, per

om

omnia Andromacho cōsensit, præter quàm quòd sagapeni drachm. tātūm duas miscet. Magnus tempore Galeni etiā Imperatoris archiatros sagapeni etiam drachmas tātūm duas, & chalciteos miscet. Cinnamomū autem duplicat, & duos vini falerni sextarios infundit. Alij autem qualicunque vini mensura vtuntur, vt postulat vsus. Cetera omnes Andromacho consentiunt.

Modus componendi Theriacen.

Pastilli theriaci, scillini, magna hedichroi dicta prius tria genera, scilicet, herbae, radices, semina. Piper\* album & longū, rosæ siccae, agaricum, crocus si ficcus fuerit, sphragis Lēnia, chalcitis tosta, amomū, cinnamomū, casia fistula, opobalsam. acacia (præterquàm si mollis sit & liquida) castoreum. \*aspalathus, sicca hæc terātur in pila Aegyptia, vel alia quoq; durissima, ne aliqua huius substantia inter tundēdum extrita, cum his prædictis remisceatur. Læuigata hæc cribro renuissimo incernātur, vt in corpus prōptius penetrent. Myrrha autem & crocus si non sit ficcus, vino macerata læuigentur, si tibi ita fieri tutius videbitur, vt crocus natura humidius non teratur. Omnes item opi, vt sagapenum, opopanax, opium, acacia (si liquidior est, & tundi contumax) succus hypocisthidis, succus glycyrrhizæ, vino per

*Ad verbum hac omnia ex Galen.*

*mutuatur*

*Actuar.*

*\*nigrum addit*

*Act.*

*\*ἀσφαλ-*

*θός. Ac.*

fusi soluatur, & ad læuigationē fiat idonei.

Sed thlaspi & gongilidos semen satius est per se in pila tūdere (quia cū aliis tusa mortario hærent) deinde vinum affundere, quoad exactè dissoluantur, tunc misce his quæ vino macerata & læuigata fuerunt. Sic thus per se in mortario terere præstat, sed leuiter ne late scat : & cretum in prōptu habere, vt inspergas his quæ vino læuigata sunt. Gummi vino infusum macerari potest, ac ipsum vel per se vel cū thure læuigare. Sic quædā ex vino, alia per se læuigāda. Cū hæc omnia vniēdi tempus erit, in vase duplici liquetur cum melle, prima resina therebintina, post hanc styrax & galbanum prius confecta & contusa in pila pistillis aut vectibus ferreis, paucissimo mellis crudi addito. Vbi hæc nostris digitis dilatata fuerint, iam liquata in melle resinæ excipiantur, & operculo vasi aquæ insidenti imposito dissolue & coque. His enim vasi iniectis satius est mel nō amplius commouere his liquefcentibus, arida immitte his quæ læuigata ex vino fuerunt, & misce denuò, dum abundè crassescant. Atque ita paulò post his quæ in mortario sunt, cochleari magno quæ liquefacta sunt paulatim affunde tepida, & vir aliquis robustus ipsa in vnitatem cogat.

Vbi probè coierint, & crassamēta adepta fuerint,



fuerint, crassamq; massam ostenderint, mel  
 lis cocti mediocriter & despumati nonihil  
 iniice: mox aliquam tritorum & cretorum  
 portionem: deinde rursus mellis quippiam:  
 postea liquefacta misce tepida, & omnia in  
 \*mortario grandi, cochleari magno valen- \* *δύναμις.*  
 ter contere, & adiiice quæ ex aridis super-  
 sunt, & mel. Vbi omnia in mortario per  
 cochlear vnita fuerint, omnia è mortario  
 tunc in \*pilam coniicere oportet, ac vecti- \* *πλῆμον.*  
 bus ferreis omnino puris & nihil æruginis  
 habentibus, continenter tundere, illinendo  
 vectes extremos opobalsamo, donec totam  
 eius portionem absumpseris: sic enim prom-  
 ptè opus absolues: siquidem lentore medi-  
 camenti vectes detinentur, & ægrè à tun-  
 dentibus leuantur. Præstat autem in sole  
 tundere: sic enim citius omnia in vnitatem  
 coguntur. Postea pilam quæ medicamen-  
 tum continet, tege, & post quatuor aut  
 quinque dies similiter in sole contunde, at-  
 que id iterum & iterum post sex aut septem  
 dies, vsque ad duos menses, aut omnino ad  
 qua dragintra dies feceris.

Tunc manu opobalsamo pauco intincta  
 in vasa pretiosa reponatur: sic tamen vt illa  
 non repleantur, sed spatium aliquod relin-  
 quendum, quo perspiret. Adhæc oper-  
 culum sæpe detrahendum est, vt liberius

exhalet, & maturior ipsius vsus tibi cōtingat: longo enim tempore ad coctionem sui antidotus indiget, vt postea dicitur.

Color eius quia virtutem non mutat, paruifaciendus est: nigricat autem nisi propter chalcitidem malè vstam, flauum aut fuscum fiet, quæ quanuis pauca sit (nam drac. quatuor) aliorum tamen colorem superat.

Sic autem componit Damocrates:

Succos, lacrymas, metallica ex vino terit, ad mellis crassitiē arida cetera tusa, & creta tenui cribro protinus iniicit, & miscet probè melle adiecto. Postea bis tēve feruefactum, vbi rursus rigauit, imponit vasi vitreo, argenteo, aureo, stanneo, corneo: vel ollæ densæ, non vasi ligneo.

Omnia ad theriaces compositionem necessaria sunt abundè exposita. Tamen temerarius fuerit, qui ex sola lectione theriacem cōponere aggredietur: semel enim cōpositionem spectare omnino est necessarium. Descriptiones verò theriaces ab Andromacho patre, Damocrate, Critone versibus expressæ magis recipiendæ sunt, quòd memoria faciliùs tenentur, & quòd mensuræ & pondera in eis adulterari nequeant.

Vires antidoti Theriacæ ex Andromacho seniore primo libr. antid.

Gal. & Damocrate.

Effic

Efficacissima est Theriaca contra potum papaveris, cicutæ, hyoscyami, aconitum, Medææ pharmaca, cantharidas, morsum viperæ, ceraſten, dipſadem, dryadem, hæmorrhoon, phalangia, hydrum, epichersum, amphisbenam, rubetam, cherſydrum, canis rabidi morsum, potionem veneni. Valida etiam est ad stomachum æſtuantem flatus stomachi, colicū dolorem à flatibus, phthiſim incipientem, asthma, pleuritidem, empyema, icterum, hydropem, spasmus, teranum, opisthotonon, emprosthotonon, vesicæ vlcus dolens, ischuriam, satyriasin, renum dolorem. Pestem, & alia propè innumerabilia, quæ scribuntur in lib. de commodis thariaces.

## V S V S T H E R I A C E S.

Datur Theriace vt Mithridatios, & cæteræ antidoti, ad præcautionem quidem fabæ Aegyptiæ magnitudine semel cum tribus aquæ calidæ cyathis.

Ad curationem verò sumpti iam veneni *Li. 1. ant.* quotidie bis detur quadruplo vel quintuplo aucta. Capitur autem hora somni, vel manè, vel utroque tempore. Manè quidem his, qui die ægrotant: vesperè verò his, quibus nox est molestior.

Da autem potui nec recēs nimis, nec vetustate peraridum, quale si fuerit, cum pauco *Damocr.*

melle iterum feruefac, & diu tere, tandem habebis vtile, quod valebat nihil, sed inualidius, eò quòd semel tantum miscuisti. Recens verò præpollentem adhuc habet opij frigiditatē, eòq; stupefacit, nec præstat quidpià promissarum prius virium, quoad fuerit percocta. Tempore autem longo, plurimum annis duodecim ad coctionem eget antidotus: vigentior autem validiorque est ab anno quinto, sexto, septimo, præsertim in his, qui à virulentis feris, aut canerabido morfi sunt, & pharmacis lethàlibus petiti. Hi enim omnes cum grauem noxam ab his venenis acceperint, potentior etheriace indigent. In aliis verò affectibus vbi tanta noxæ causa non est, sufficit vel sexagenaria theriace. Potens enim est ad annos triginta.

Valida autem & vicens iudicatur, si data post medicamentum aliquod purgatorium, sua virtute, medicamento purgantis efficaciam euincat, & medicamentum purgare prohibeat. Quòd si purget, perinde ac si homo theriacem non sumpsisset, liquidò constat adulterinam esse, ac vires eius inualidas: aut vetustate confectas esse, vt ne medicamento quidem virtutem superare potuerit. Quam tamen Marco Antonino Imperatori ex recte cinnamomo primi generis parauit Galenus,

Ienus, sumpsit statim Imperator, non preteritis adhuc mensibus duobus integris, non expectata medicamenti coctione, Galen. i. antidotorum.

Theriace ut Mithridatios singulis diebus sumpta, omnino à deleteriis & lethalibus pharmacis securos reddit: sumitur autē ad fabæ Aegyptiæ quantitatem ex aqua, aut vino, aut melle, aut per se.

Huius quotidiano usu Aurelius Antoninus Romanorum Imperator (cui etiam medicus fuit Galenus) à graui sopore, quo in actionibus suis cum premebatur, sanatus est, adempta papaueris lacryma. Cum autem postea bonam noctis partem duceret insomnem, tum ob siccitatem naturalem (erat enim siccioris temperamenti natura) & ex longo usu medicamenti siccatis acquisitam, tum ob omissum consueti & soporiferi medicamenti usum, coactus est etiam theriacam cum papaueris lacryma compositam, sed inueteratā adiicere. Nam in huiusmodi medicamenti opium vetustate mitescit.

Morsus ab animali venenato sumpta theriaca omnino euadit, & hac præsumpta si post mordetur, non moritur. Quod sæpe pretores in noxiis hominibus probarunt. Gal. in aliis animalibus. Quotidie tota vita sanis



salubriter sumitur Theriace, siue venenum metuant, siue vt diuus Marcus Imperator, corporis iuuādi gratia, hoc vsus etiam affatim, & veluti alimento quodam. Vnde initium magnæ estimationis Theriaces, & vires actionis eius hominibus innotuerunt, & sub illius seculi maximis Imperatoribus in publicum vsus eius prodiit.

Antidotus Esdræ (quisquis is fuerit) eadē propē pollicetur, quæ Theriace, sed hac multo est ad omnia imbecillior, ob id obscurata euiluit quouis modo parata. Nam Actuario ex 27. cōponitur: Aëtio & Paulo ex 47. nec iis omnino iisdem nec eodem pondere: Nicolao ex centum quadragintaquatuor.

Ambrosiam & Athanasiam à iunioribus Medicis nominatas esse antidotos, docet Gale. libro 8. meth. hāsque calfacere & siccare, vt Theriacen. Has quoque tres antidotos, Ambrosiam, Athanasiam, Theriacen, sumptuosas esse dicit li. 14. meth. & salubriter sumi contra internos abscessus, præsertim viscerum, vt collectum humorem in halitum resoluant, & digerant, & in libr. fanit. tuendæ harum meminit.

Antidotum Mithridatis Athanasium triplex, libr. 2. antidotorum. Est & Athanasia hepatica Alexandri Tralliani, & Athanasia Oribasij apud Paulū, & Ambrosia Philippi

lippi Macedonis, lib. 2. antido. quarum nulla est hodie in usu, aut non admodum frequenti, quod harum loco Mithridatios aut Theriace recipiatur, adeo magna omnium fide & summis successibus probata, ut myropolæ quidam circumforanei in Gallia questum vicatim faciât suis, nescio quibus, compositionibus, quas tamen Mithridatij & Theriaces nomine diuendunt. Hæ igitur Athanasiae, Ambrosiae, Acharisti, Hadriani, Hæmagogi, & aliarum quarundam Arabibus celebratarum compositionum loco fuerint, ut veluti postliminij iure in usum redeant, cum eadem omnia præstent, multoq; felicius, quam Arabum compositiones ex istis excerptæ, additis aut ablatis quibusdam, neque his magni momenti.

AVREA ALEXANDRI  
ANTIDOTOS.

Recipit asari	}	Ana drach. duas & dimidiam. 55. Had.
Carpobalsami		
Seminis hyoscyami		
Caryophyllorum	}	Ana drac. 2. 36. Had.
* Myrrhæ omnes legunt,		
Ciperi		
Opij Thebaici		

\* *Μύρρα*,  
id est, bac-  
cas myrti  
*Actua.*

Opobalsami  
 Cinnamomi  
 Folij  
 Zedoariæ  
 Zingiberis  
 Costi  
 Corallij rubri  
 Cassiæ lignæ  
 Euphorbij  
 Tragacanthi  
 Thuris  
 Styracis  
 Nardi Celticæ  
 Mei  
 Cardamomi  
 Seseleos  
 Napeos, seu semi-  
 sarxiphagi Act.ra-  
 dicis saxifragiæ alij  
 Anethi  
 Anisi

Ana drachmam  
 vnam. 18. Had.

nis sinapi. Eius loco  
 selinō. i. apium Act.

Hoc Actuarius o-  
 mittit.

Xylaloës  
 Rhei Actuarius. Rha barbari &  
 Rei Pontici Arnaldus.  
 Luphiæ compositæ Actua. Aliptæ  
 moschata, quod idem est, alij.  
 Castorij  
 Spicæ nardi  
 Galangæ Actua. & cæteri.

Opop

Opopanax	
Anacardij	
Mastiches	
Sulfuris viui, omnes.	
Pæoniæ radicis	Ana
Eryngij	exa-
Rosarum Actuar. omittit.	gium
Thymi Acori	dimi-
Pulegij. Eius loco habet Actua-	dium,
rius Halicacabi.	Actu.
Aristolochiæ longæ Actuarius	dr. di.
vtriusque alij.	sed
Gentianæ	dra. r.
Corticis radicis mandragoræ	& di-
Chamædryos	midj.
Phu. Act. radicis Valerianæ alij	Arnal
Baccarum lauri	du.
Dauci Cretici, Ameos	
Macropiperis	
Leucopiperis, oēs præter Actua.	
Xylobalsami	
Carui, omittit Actuarius	
Amomi	
Petrofelini seminis	
Libystici semin. Actua. lenistici	
Seminis rutæ (alij.	
Seminis sinonis. Eius loco hyf-	
sopi habet Actuarius, & addit	
electri, id est, succini	

Auri

Auri	}	{	Lima- turæ tenuif fimæ	} Ana exagia duo & dimidium A- ctuarij: alij fin- gulorum grana quatuordecim tantum.
Argenti				
Margaritæ, Act. am- barum margarita- rum non pertusa- rum & pertusarum alij.				
Βλάτῃς, Actuar. id est, onychis.				
Ossis cordis ceruini.				

Eboris	}	Ana ℥. s seu drach. sex, Actuar. alij tantum grana 9. vel 8.
Calami		
odorati		

Pyretri  
Mellis quantitatem sufficientem: mellis de-  
spumati libras tres, Arnald. Mel tacet Act.

Hæc antidotus aurea, vel ab auro quod  
recipit, vel à pretio & virium præstâtia di-  
citur. Cuius autem Alexâdri an Philosophi, an  
Medici, vel alterius, compertum non habeo.

Efficax est contra defluxiones capitis fri-  
gore conceptas, oculorum lacrymas exsiccat,  
dentiū dolores lenit, & capitis omnes cru-  
ciatus à frigido vel humido illita frōti. Co-  
mitiales, insanos, vertiginosos, paralyticos,  
apop



apoplecticos mulcet. Tabidis, tussiculosis, asthmaticis, sanguinē screantibus, cardiacis, ischiadicis, colicis, nephriticis, dysuriæ, straguriæ, ischuriæ præsentī est auxilio. Calculos renum & vesicę cōminuit. Quotidianis & tertianis febrib⁹ circa accessionis initiū cū decocto stœchados eximiē medetur. Has eius vires ab Actuārio celebratas fusi⁹ explicat Arnaldus in lib. de antidotis: sed si ad Mithridation & Theriacen spectes, vsu plurimo maiorū nostrorū probatissimas antidotos, & omnia hæc ac multò plura felicissimè præstātes, nihil est, quòd Arabū Aurēā, Hadrianum, &c. antidotos laudes. Initio, stupefacit vt theriace, inueterata, coctis simul omnibus calida euadit, affectibus ob id frigidis salutaris hæc aurea. Aurū, argentū, ebur albū tenuissimè limatū vult Arnald. Balsamū melle modico dissolutū miscetur.

Dosis est quantitas auellana.

Adscripserā quoq; his alias antidotos *διὰ τῶν βαφικῶν: διὰ μόσχου διὰ ἀρομάτων, διὰ λιμνῶν, διὰ μαγράων, διὰ ἀνθων, διὰ ἀνανάγδων*, arteriacas, thoracicas, stomachicas, catharticas, hieras, tryphas, & alias reliquas vsurpari hodie consuetas. Catapotia quoque mitiora, valentiora, mediocria. Trochiscos item atq; condita & syropos, in quibus sumendorū materia ferè continetur. Sed cū mihi

mihi Mesuæ antidotarium esset in manibus, plurimáq; iam dictorum ex Mesue ipso descripsissem, æquius putavi ea omnia ad Mesuem referre, ne dictum dicerem.

DE SVCCIS MELLE, AVT  
SACCHARO CONDITIS.

**Q**Voniã facilius est impleri potu quã cibo, tam sanis quã ægris, & potus ob liquiditatem linguam promptius & altius afficit, ac os ventriculi ceterásq; partes, quas celeriter permeat, maximè solliciti fuerunt maiores nostri de potu ægris iucundo & salubri: partim ad sitim extinguendã & partes principes roborãdas: partim ad liberandas obstructions, finiendámq; alterando putredinem: partim ad tenuandum crassa excrementa, incidendum, & tergendum lenta: partim ad ea vi naturæ iã secreta vacuãdum per urinas aut sudores, interim per vomitum & deiectionem, si præsertim cõ natura vergebat. Quam rem indicat potio ptisanæ, vinum ex aqua, hydromeli, oxymeli Hippocratis libr. 3. rat. victus in morbis acutis. Idem declarat Galenus suo oximelite in sanitate tuenda, & methodo mendedi, & suo hydromelite, cui interdum ad crassa tenuandum, & lenta incidendum, tergend

gendum, vt promptius purgarentur, inco-  
 quebat hyslopum vel thymū, vel pulegiū, *Ap. 24.*  
 vel calaminthen, vel origanum, vel satu- *libr. 1. &*  
 ream, vel aliquam ex his similibus. Idē Ori- *libr. quos*  
 basij, Aëtij, Pauli, Tralliani, ἡδία ὠρίλιμα, *purgare*  
 πώματ'α, προπόματ'α ἀποδ'αματ'α, id est, suaves, *oportet.*  
 vtilēs potionēs, propinationēs, deferuefacta  
 ex herbis vel radicibus, & decocto moliun-  
 tur. Idem Actuarij portiones febricitantium.  
 inscriptę. Idem recentiorum præcipuē Ara-  
 bum promittunt, & præstant syrupi, vel  
 quasi ex Syria delati primū ὁπωί, id est, suc-  
 ci conditi, vt Hermolao videtur, vel συρῶν-  
 τ'α ὁπωί, id est, trahētes succi, quāquā pau-  
 ci facultate trahendi sint præditi: vel corru-  
 pto nomine pro σύνωποι, vel pro σιγάπια,  
 qua voce Actuarius & Simeon vtuntur. De  
 quibus & aliis egrorum potionibus cur hīc  
 fusiū non scribam, paulō antē docui: mihi  
 nunc satis est, pauca quædam stomatica &  
 stomachica ex Galeno adscribere, quæ sy-  
 ruporum typus quidam fuerint.

Diacydoniω Galeni appetentiam lan- *Lib. 8. c. 5.*  
 guentem excitat, coctionem ciborum iu- *pha. part.*  
 uat, iecur & vētrem totū roborat, ventricu-  
 li dispositiones propē omnes, exceptis quæ  
 ab æstu vehemēti fiunt, modicē iuuat. Re-  
 cipit carnis malorum cydoniorum, mellis,  
 aceti albi, ana li. tres. Piperis, zingiberis ana

vncias tres. Petroselini Macedonici vnciam vnam. Paulò aliter in fine libr. 6. sanit. tuenda. Succi malorum cotoneorum, struthiorũ (quæ maiora sunt & dulciora) mellis boni Attici ana sextarios Romanos duos, aceri sextarium vnũ & semissem, aut si abundè sit acre, satis est sextarius vnus. Vbi modicè super prunas coxeris ad mellis Attici spissitudinẽ, & despumaueris, adde zingiberis vncias tres, piperis albi vncias duas. vnc. j. libr. 8. f. partes : deinde igni simili recoques, ad mellis crassitudinẽ. Si id astringere magis voles, fac ex cotoneorum succo. In calido autem ventriculo aut bilioso aufer piper & zingiber: in frigido & pituitoso zingiberis vnc. quatuor, piperis vnc. tres, vel duas & dimidiam. In mediis temperamentis dimidium misce. i. zingiberis vnc. vnam & semis, piperis vnc. vnam, libr. 6. sanit. tuend. vnum aut duo cochlearia sunt danda, libr. 8. method.

Diacydoniõn medicamentosius est apud Nicolaum tale: Carnis cydoniorũ excorticatum, exēteratorum, in aqua elixorum li. tres tere, cerne: deinde in mellis despumati lib. quatuor & semisse, coque semper mouēdo rudicula, donec crassescat, nec digitos inquinet. Ab igne deposito misce paulatim rudicula semper ducēdo cinnamomi vnc. i.

&amp;

& semiss. zingiberis vnc. vnam piperis, galangæ ana semunc. caryophyllorum, nucis moschatæ ana 3. tres, spicæ nardi, xylaloës, macis, cardamomi ana 3. duas, zeduaris 3. vnam. Est apud Mesuen eius descriptio triplex inusitata. Dia cydoniorum, *μύλον*, catharticum Alexander ad podagram describit. Hodie succum & carnem cydoniorum saccharo cōdîmus sine aromatibus, ad mensæ dona secundæ præcipuum, & alium cohibendum.

Nicolaus ex succi mororum hortensium lib. semiss. succi batinorum libra vna, mellis lib. semiss. sapæ vnc. trib. coquit donec marmori affusum ipsi inhæreat, & digito tactū parum sequatur, mox in se resiliat, ad palatū excoriationes, ardorem faucium & gulæ, ac initium synanches.

Mesues amborum mororū succi ana lib. i. semiss. & sapæ & mellis ana lib. vna, coquit ad mellis spissitudinem. Cōpositius fit addendo aluminis, myrrhæ, croci, omphacii ana, si opus est. Succus per se initio est efficacior, etiā aliis astringentibus, rho, balaustio, rosis: mistus post principiū cum melle est melior succus.

Dia moron Galeni stomaticum seu ad partes oris inflammatas dum affluit materia. Succi mororum libras quinque coque

*Lib. 6. c. 2.*

*ph. para.*

*Heras.*

*tiam.*



*succū per* per se ad sordiū consistentiam, postea cum  
*se praco* mellis libra vna. Id medium est, ac plurimus  
*quit, sta-* admodum placet, vt neq; de mellis dulcedi-  
*tim cum* ne, nec de succi austeritate cōquerantur.  
*melle.* Iubre initio phlegmonarum oris: quas si va-  
*Sapam ne* lētius vis repellere, succi rhois vel omphaci  
*adde cum* 3. vnā, vel duas, vel tres toti symmetria mi-  
*Arabibus* scebis, vel florem rosarū, vel rosas ipsas, ba-  
*diamoro,* laustium, cytinum, malicorium, gallam im-  
*etiā si fal-* maturam, piceæ aut thuris corticem, succū  
*zō astring-* hypocistidis, aut lentisci, & alia astringētia  
*gat sapa* nō corruptitia, qualia sunt misy, fori, chal-  
*Dioscori-* citis, chalcāthum: nisi quod huius 3. vna to-  
*d: nec ad-* ri medicamento miscetur, vbi in ore, gula,  
*ditur à* stomacho, vētriculo vlcerosa est dispositio:  
*Gale. A ē-* plus autem chalcanti ad vlcus malignum  
*tio, Pau-* & putridum dictarum partium. Vbi autem  
*lo, Tral-* constitit fluxio, misce toti compositioni  
*lano.* croci, myrrhæ ana sesquidrachmā ad phle-  
 gmonem coquendam. Crocus enim astringēdo myrrham multo se tenuiorem & ca-  
 lidiorē intrò in altum impellit, vbi succos  
 tenuat, & à croco foras citius efferri p̄hibi-  
 ta digerit. Addit Andromachus croci, myr-  
 rhæ, aluminis scissi ana 3. vnā, alij huius 3.  
 duas. Idem probè addit glycyrrhizæ 3. vi-  
 ginti, quæ asperitatem ex austeris ori inna-  
 tam mitiget. Eiusdem succus stomacis o-  
 mnibus antidotis mistus præstantiores eas  
 reddit.

reddit. Coquunt eandem gargarismata ex ficis pinguibus, ex mulsâ aquosa, ex calenti sapa, oleo lentiscino in vase duplici calfacto, vel ex aqua calente. Coquentibus autē his in statu vtendum, in declinatione valenter digerentibus.

Cocta phlegmone vel etiā scirrhusa digerens aliquid toti medicamento incoque, vt nitri, vel spumæ nitri  $\mathfrak{z}$ . semis, vel sulfuris viui sextantem, vel sapam, cui incoctū sit origanum, hyssopum, pulegium, saturia, thymus, calamintha sylvestris & domestica, seu mentha odorata, quā à grato odore Græci veteres hedyosmon vocarunt. Medium facultate hoc remediū mediocribus phlegmonis & maiorum statui confert.

Crocus autem & myrrha, & si qua alia aromata miscēda sint, adde in fine coctionis, & cū ab igne es medicamentū sublaturus, agitando, donec omnia pulchrè cogantur. Nam largior ipsorum coctio vires eis adimit.

Multiplex igitur est diamori compositio, quia affectus per tempora varius est. cui medetur. & ob id quod non omnes eadem mistionis mensura delectat.

Diabatinon, id est, succo mororum bati seu rubi est valentius diamoro, infirmius diacaryo. Ob id Mesues & Nicolaus

ambos succos miscent, succi mororum domesticorum lib. β. succi mororum batinarum lib. vnam, mellis lib. β. sapæ vnc. tres.

Si verò simplicem illā habeat medicus, sufficit in omne tempus phlegmones, additis tunc quæ vnumquodque postulare videbitur. Multiplex etiam est Alexandro: cui etiam & Actuarius diacaryon describitur, sed Galenum sequimur.

Dia *λαγύριον* stomaticon suaue, paratu facillimum, omnium efficacissimum ad oris phlegmonas ob essentia tenuitatem, Galeno inuentum & consuetissimum.

Cortices exteriores nucum virētium & vigentium finita æstatetere in pila, succum per linteum cola, cum melle coque, despumando ad melleā crassitiem: hoc in partes quatuor diuide, vt Galenus semper diuisit, primam serua syncerā, pueris, mulieribus, viris delicatis vtēdam, ob eius dulcedinem. Id etiam solum mediocres phlegmonas interdum persanat celerrimē. Secundæ parti astringentium aliquid misce, ad repellendum affluentem adhuc initio phlegmones sanguinem. Tertiæ croci & myrrhæ portionem ad coquendū vigentem iam phlegmonem, cū scilicet fluxio cessauerit.

Quartæ sulfur viuum aut nitrum, & acria quædam ad digerendum, quod ex humore phlegm

phlegmonem faciente fuerit impactum: quoniam ea quæ affluerunt, vacuationem postulant.

Cum autē pauper medicus has quatuor cōpositiones propter sumptum parare nequeat, nec qui iter agit, has secum circumferre, satius est facere cōpositionem vnā mediam, ex succo mole aut mensura quintuplo ad mel, quale diamoron fecimus, & tēpore vtendi pro varia indicatione à morbi tempore & ægri natura hæc prædicta adiungere.

Similia his stomatica sunt, sed viribus inferiora *διὰ γλίνκι* ☉, id est, ex musto & sapā, *διὰ ρόιον*, id est granatorum succo, *διὰ ἀρχάδων*, id est, ex pyris sylvestribus, *διὰ μύλων*, id est, ex cydoniis. Et ex cestianis, mespilis, cormis, & aliis fructibus astringentibus tritis, pressis, residēdo depuratis, colatis, cum melle coctis. Sunt autem hæc omnia non modò stomatica, sed etiam stomachica & eustomacha, id est, quæ degluta iuuant stomachum. Diacarion autem caco stomachum est, ac stomacho noxiū, plurimo melle eget: post id Diabatinon, Diamoron, sed *διὰ μύλων*, *διὰ ρόιον*, *διὰ ἀρχάδων* parciorē. In horum medio est succus mespilorum, cornorum, *βραβύλων*, prunorum. Succo igitur cydoniorum & pyro-

rum syluestrium, & plurimorum fructuum  
 misce æqualem mellis portionem. Succus  
 autem astringentium insigniter, vt corno-  
 rum duplicatum, & interdum triplicatum  
 mel requirit, Gal. libr. 6. & 8. comp. ph. part.

Διὰ γλύκε fit ex mensura quauis mu-  
 sti austeri, quod ex vuis amineis postremū  
 fluxerit (nam quod primum fluxit, est liqui-  
 dius & aquosius) & melle, additis his, quæ  
 diamoro & diacaryo misceri posse diximus  
 astringentibus, coquentibus, digerentibus  
 eadem proportionem. Διὰ γλύκες Crito-  
 nis etiā ad aurium & sedis vitia utilis com-  
 positio est, Gal. libr. 6. comp. phar. part. Si  
 autem ex musto dulci fiat, mitigat quidem,  
 sed minùs repellit: ex musto autem austeri  
 & dulcis medio, vim mediam obtinet. Co-  
 quit id Andromachus ad quartæ partis con-  
 sumptionem: alij ad melleam crassitiē, de-  
 inde colant, & mel simul coquunt, præfer-  
 rim vbi succus est liquidior: vbi verò cras-  
 sus, mel ei statim coctionis initio miscēt: &  
 valet phlegmonarū oris initio, incremēto,  
 & statui: ad declinationem verò tedas pin-  
 guetufas incoque. Si sumptuosius vis medi-  
 camentum aliquod ex his, adde cassiæ corti-  
 cem, vel nardum Indicam, vel folium ma-  
 labathri, vel singulorū trium ana ʒ. vnam  
 vel sesquidrach. pro libra vna mellis. Si di-  
 uitibus



uitibus paras, amomum misce quātum cro-  
cum, aut myrrham, aut alumen, percolato  
stomachico mastichen Chiam interdum  
miscuit Galenus. Hæc stomatica vel gar-  
garizantur, vel illinuntur, vel ore sape &  
diu continentur, vel etiam horum quædam  
prædicta deuorantur, & stomatica fiunt.

Stomatice *ἀνὰ πόντον*, id est, granatis auste-  
ris acidis, dulcibus, maturis & integris equa-  
li portione tritis cum corticibus, coctis cum  
melle, stomacho resolutis & cibos auersanti  
idonea est.

Crito autem aliter granatorum dulcium  
cum corticibus \* tritorum & expressorum \* *κεναι-  
μύων.*  
sextarios sex, mellis boni sextarium vnum  
coquit ad mellis crassitiē, deinde addit alu-  
minis scissi vnc. vnam, myrrhæ semūciam.

Alia eiusdē ad vlcera oris & aphthas, id  
est, oris pustulas, succi granatorum dulcium  
heminas sex: coque igni lento in vase æreo  
ad tertias, deinde adde cinnamomi, casia,  
myrrhæ, ana drachmas, vnā omphacij, cro-  
ci, nardi Indicæ ana drachmam semissem,  
mellis heminam. Vtraque suo tempore præ-  
stantissima. Paulo diuersus Andromachus  
apud Galenum stomachicē hanc compo-  
nit, sed viribus propè iisdem.

Medicamenta stomatica ex succo moro-  
rum, batinorum, granatorum, cydoneorū,

cornorum, corticum nucum multa, ut  
 vides, medici scripserunt, ponderibus &  
 mensuris variantes: alij enim omnia vel a-  
 stringentia, vel digerentia, vel utraq; ini-  
 ciunt, nonnulli adimunt, alij aliud. Item hi  
 plus illi minus indunt. In quibus confide-  
 randum est, quod copiosius est inditum, an  
 astringēs ac repellēs est, an lenit, & coquit,  
 an digerit: ita nanq; licebit ipsis probē vri.  
 His affines sunt & succi per se siccati sole vel  
 igne, vel cum melle, aut saccharo, aut  
 utroque cocti: hiq; tam herba-  
 rum quā fructuum, quos  
 iure meritissimo sy-  
 rupis multis nul-  
 la saepe  
 ratione compositissi-  
 mis prætuleri-  
 mus.

FINIS.



# INDEX RERVM OMNIVM

QVAE HOC OPERE CON-  
TINENTVR.

## A



<i>Bortum prohi-</i>	<i>Acidus sapor</i>	265
<i>bentia</i>	<i>Acorus</i>	20
<i>Abrotanū</i>	<i>Acorus verus, galanga</i>	
<i>Abscessus co-</i>	<i>maior hodie dicitur ibid.</i>	
<i>quentia</i>	<i>Acorus palustris</i>	21
<i>Absinthium</i>	<i>Acorus verus vnde adue-</i>	
<i>Absinthij facultas</i>	<i>hatur</i>	<i>ibid.</i>
<i>Absinthium Pōticum vi-</i>	<i>Acorus videtur quibusdā</i>	
<i>detur esse Romanū Me-</i>	<i>calamus aromaticus</i>	
<i>sues</i>	<i>ibidem</i>	
<i>Absinthiū nostrum ibid.</i>	<i>Actiones secundas &amp; ter-</i>	
<i>Acacia</i>	<i>tias ex primis &amp; simpli-</i>	
<i>Acacia vulgò dicta nullo</i>	<i>cibus colligimus</i>	252
<i>errore vsurpatur pro ve-</i>	<i>Adeps omnis</i>	180
<i>terum</i>	<i>Adiantum</i>	52
<i>Acantha</i>	<i>Adiψ</i>	96
<i>Acer sapor</i>	<i>Admouendorum varius</i>	
<i>Acerbus sapor</i>	<i>applicandi modus</i>	624
<i>Acetabulum</i>	<i>Adulteria simplicium à</i>	
<i>Acetum</i>	<i>quibus sunt</i>	501-504
<i>Achoras curantia</i>	<i>Adr quando causa salu-</i>	

<i>bru</i>	344	<i>necesse est composito medi-</i>	
<i>Aëromeli</i>	127	<i>camento uti</i>	209
<i>Aerugo</i>	163	<i>Agallochum</i>	112
<i>Aes vstum</i>	162	<i>Agaricus</i>	21
<i>Aentes</i>	176	<i>Agarici facultas</i>	22
<i>Affectus species à quibus</i>		<i>Agarici dosis</i>	22. 424
<i>indicatur</i>	488	<i>Agaricus dictus ab Aga-</i>	
<i>Affectus parvus, recens,</i>		<i>ria Sarmatiae regione</i>	
<i>superficiarius, mitiora po-</i>			22
<i>stulat medicamenta: in</i>		<i>Agaricus quomodo corri-</i>	
<i>contrario, contrà</i>	391	<i>gitur</i>	ibid.
<i>Affectibus applicanda me-</i>		<i>Agaricus servatur quin-</i>	
<i>dicamenta equalia viri-</i>		<i>que annis</i>	ibid.
<i>bus</i>	392	<i>ἀγγῶν δίαλον</i>	585
<i>Affectus quando plures</i>		<i>Αγν</i>	53
<i>sunt implexi, virgentio-</i>		<i>Agrimonia</i>	58
<i>ri maior vis remediorum</i>		<i>Allum magnetis vim ob-</i>	
<i>in composito opponenda</i>		<i>tundit</i>	286
<i>ibidem</i>		<i>Aloë</i>	130
<i>Affectus præter naturam</i>		<i>Aloës dosis</i>	424
<i>quomodo facilius pellun-</i>		<i>Alopecie quomodo admo-</i>	
<i>tur</i>	433	<i>uentur medicamēta</i>	485
<i>Affectus in ore ex fluxio-</i>		<i>Alopeciam difficile quo-</i>	
<i>ne curantia</i>	104	<i>modo curamus</i>	344
<i>in Affectibus compositis</i>		<i>Alopecias sanantia</i>	77.
<i>virgentioris est habenda</i>			181. 286. & 470. 379
<i>ratio</i>	208	<i>Alphos. sanantia</i>	32. 47. 77
<i>in Affectibus compositis</i>			85. 173
<i>eiusdem nature minus</i>		<i>Aliterci succus</i>	129

<i>Alibae</i>	23	190.187	
<i>Alibae facultas</i>	23	<i>Animalia et eorum par-</i>	
<i>Alibae unde dicatur ib.</i>		<i>tes</i>	178
<i>Alumen</i>	169	<i>Anisi semen</i>	83
<i>Aluum emollientia</i>	92	<i>Anodynum quod</i>	258
<i>Aluum subducentia</i>	107	<i>Anthera</i>	78
130.142.170		<i>Αντισαλλόμενα simplicia</i>	
<i>Alyssos</i>	34	<i>ordine alphabeti</i>	520
<i>Amaracus</i>	62	<i>Antidoton quid</i>	342
<i>Amaracinum vnguen-</i>		<i>Antidotus Esdra</i>	664
<i>tum</i>	ibidem.	<i>Antidota ante siue post</i>	
<i>Amaracinum vnguen-</i>		<i>deletaria quomodo su-</i>	
<i>tum diuersum à sampsy</i>		<i>menda</i>	430
<i>chino</i>	ibidem.	<i>Apiastrum</i>	64
<i>Amarus sapor</i>	266	<i>Apium satium</i>	23
<i>Ambrosia antidotus</i>	664	<i>Apium vulgare est Eleo-</i>	
<i>Ameos semen</i>	83	<i>selinon</i>	ibid.
<i>Anianthus lapis</i>	176	<i>Apiorum genera omnia</i>	
<i>Amomum</i>	82	<i>idem pollent</i>	24
<i>Αμπαρ</i>	153	<i>Aphthas curantia</i>	106
<i>Αμπιλα &amp; λιμήν</i>	27	<i>Appetitū excitātia</i>	28
<i>Amphisbena</i>	286	95.147	
<i>Amphora</i>	63	<i>Arabistarum componen-</i>	
<i>Amygdala</i>	93	<i>di medicamenta ratio</i>	
<i>Anacardus</i>	ibid.	<i>damnatur</i>	299
<i>Anasarcæ auxiliāt.</i>	293	<i>Arancium malum</i>	99
<i>Anastomoticū quod</i>	255	<i>Argentum</i>	156
<i>Anebum</i>	54	<i>Argentum viuum</i>	ibid.
<i>Anginis quæ profunt</i>	75	<i>Ari radix</i>	24
		<i>Ari</i>	



<i>Ari masculi succus</i>	129	<i>Asparagus</i>	27
<i>Aristolochia</i>	24	<i>Asparag<sup>9</sup> Regius et He-</i>	
<i>Aristolochia triplex radi-</i>		<i>lius.</i>	ibid.
<i>cis figura Gal. distincta</i>		<i>Asparagus Petreus</i>	ibid.
<i>ibidem</i>		<i>Asperæ arteriæ affectus</i>	
<i>Aristolochia quando effo-</i>		<i>&amp; laringis quomodo cu-</i>	
<i>diēda, &amp; quomodo ser-</i>		<i>rantur</i>	474
<i>uanda</i>	25	<i>Asperitates arteriæ leniē-</i>	
<i>Armenia terra</i>	177	<i>tia</i>	34.147.155
<i>Armenius lapis</i>	173	<i>Asphaltos</i>	178
<i>Arnoglossum</i>	64	<i>Asphodelus</i>	22
<i>Aromata quæ sunt</i>	191	<i>Asphodelus autumnus le-</i>	
<i>Aromatica medicamen-</i>		<i>gitur</i>	ibid.
<i>ta</i>	114	<i>Asphodelus muribus ve-</i>	
<i>Aromata tenuis essentia</i>		<i>nenum</i>	ibid.
<i>facile exanimatur</i>	192	<i>Assando quomodo medi-</i>	
<i>Aromata sunt miscenda</i>		<i>camēta preparatur</i>	545
<i>ad finem coctionis</i>	380	<i>Asthmaticis quæ prosunt</i>	
<i>Arrhenicon</i>	160	<i>86.135.146.187</i>	
<i>Arthritis in plethorico</i>		<i>Asthmaticis quæ obsunt</i>	
<i>corpore quomodo curan-</i>		<i>89</i>	
<i>da</i>	467	<i>Astrorū ortum &amp; occa-</i>	
<i>Arthritica</i>	276.293	<i>sum negligit Galenus</i>	
<i>Arthriticis quæ prosunt</i>		<i>in vsu medicamentorum</i>	
<i>35.182</i>		<i>454</i>	
<i>Asarum</i>	25	<i>Astrorū ratio in quibus-</i>	
<i>Asarum quando fodien-</i>		<i>dam plantis colligendis</i>	
<i>da</i>	ibid.	<i>observatur</i>	19.312
<i>Aselli</i>	188	<i>Attrahens quod</i>	255

- Aurea Alexandri antidotus* 665 *tur quid sciendum ibidē.*  
*Aurea Alexandrina vires* 668 *Basis ipsius coctio, assatio, tritura, vstio, lotio, &c. etiam rationem Sine quo obtinent* 354  
*Auribus purulentis conuenientia* 70.293 *Basi adduntur quæ toti parti sunt familiaria.* 355  
*Auribus quomodo medicamenta infunduntur.* 470 *Basi adduntur quæ ipsam in partes remotissimas conuehant.* ibidem  
*Aurium dolorem sedantia* 47 *Basis ob quatuor ad partem aliquam deducitur* ibidem  
*Aurum* 156 *Basi adduntur quæ ipsam deductam ad partem eam affigant* ibidē  
*Austerus sapor* 265 *Basis sine quibus affectus profligare nō potest ibi.*  
*Autoris ratio in utendis nominibus medicamentorum, & ponderū scribendis* 620 *Bases congeneres miscentur, nempe mite aliquod vehementi, ut habeatur medium* 320  
**B** *Alanus myrsifica.* 27.94 *Bases diuersæ quare miscentur* 317  
*Balanstium* 72 *Basi adduntur medicamenta, quæ in suo vigore consistunt* 354  
*Balsamum* 101 *Basibus admiscenda non solum*  
*Basiliscus* 286  
*Βασίλικον ἀργύρεον* 84

Solum que ipsam ad	Borago	ibidem	
partem familiarem du-	Bombacis semen	84	
cant, sed etiam que in	Branchos sanantia	151	
ea retineant	381	Brassica	55
Βάτ & ἰλαῖ &	109	Brassica succus	128
Bdellium	151	Brassica marina	55
Bechica que	262	Bryonia radix	26
Behen	27	Bubonas coquentia	180
Ben	94	Buglossus	55
Bersilium lignum	112	Buphthalmi flos	72
Besanum, Besasa	67	C	
Beta	57	Cabaret Gallorum	
Betonica	ibidem	Cest Asarum	25
Bilem atram purgantia		Cacochyma que	263
97.110.173.281		Cadmia	165
Bilem atrā facientia	125	Κάλλ &	609
Bilem flavam ducentia.		Calaminthe	57
140.107.95.96.132		Calamus aromaticus	28
Bilis flava coquēda	278	Calami aromatici electio	
Bilem vtranque vacuan		ibidem.	
tia	32.42.281	Calculos renum confrin-	
Bilem vtrāque & pitui-		gentia 45. 85. 103. 151.	
tam ducentia	282	174	
Bilem & pituitam ducen		Calculos frangentia	29.
tia	283	34.54.147.178	
Biliosis convenientia	125	Calculos vesicæ diminue-	
Biliosis contraria	132	tia	70
Βλάτ & βύζαντ &	190	Calor quas actiones edat	
Bluturn	55	224	

Calx viva	173	Cari semen	86
Cancanum	146	Carice	103
Canceris quæ profunt	166	Carpesium	102
167.173		Carpobalsamum	101
Cancrorum cinis	188	Κάρυον βασιλικόν	105
Canella nostra quid	181	Caryophyllum	73
Cantharides	189.185	Casia	103.108
Caphura	146	Casia fistula	102
Capillos tollētia	147.161	Cassia fistula dosis	426
Capillos redd.	52.95.136	Castorium	185
Caput quæ roborant	154	Catharrhos sanātia	90
Capitis dolorem facien-	151.177		
tia	187	Cathartica quæ	261
Capitis dolori ab æstu		Catheretica quæ	259
quæ profunt	340.460	Catheretica quomodo	
Capiti quomodo admoue-		adhibenda	464
mus medicamenta	458	Cauētica	86.137.161
Capiti quales cucuphæ ap		Cauētica quomodo adhi-	
plicentur	ibid.	benda	465
Capparis radice cortex		Κεχράμειδες	81
23		Centaurij magni radix	
Capparis flos & fructus	28		
ibid.		Centaurium minus	ibid.
Carbunculos perrumpen-		Cephalica	266
tia	70	Cephalalgicis profunt	
Cardamum	86	30.71.96.154.148.188	
Cardamomum	ibid.	Cera	128
Cardiaca	269	Cera liquabilibus ut ma-	
Carduus bened. et us	56	teria miscetur	178
		Kip	

# INDEX.

Κισάμιν	609	Χυλὸς ῥόϞ Pontice	129
Cerasi gummi	147	Χυλὸς δάκρυον, ὅπως Gre	
Cerati Galeni vsus	480	cis confunduntur	134
Cerebella passerum	182	Cicatricem quæ inducūt	
Cerebri roborātia	33. 136	162	
Cerebri meningum vul-		Cichorium	56
nera glutinantia	58	Cicuta	58
Cerussa	167	Cimolia terra	177
Cessatio à vacuationibus		Cinnamomum	115
aliis, causa est saepe per		Cinnamomi etas	ibid.
accidens. huius vel hu-		Cinis hirundinum	190
ius vacuationis	336	Cinnabaris	179
Calcanthus	164	Cirsium	55
Chalcitis	ibid. & 165	Citrage	64
Χαλιουῖς	587	Citrum	99
ΧαμαβάτϞ	109	Clarificatio succorū quo-	
Chamadrys	57	modo fit	538
Chamapitys	58	Clyster largior sine par-	
Chermes	190	cior quib⁹ infundit⁹	538
Χέρμιν	612	Cnici semen	87
Chæradas sanantia	90	Cnici seminis dosis	425
138		Coccali	98
Χοϊνίξ	613	ΚόκκϞ Orientis	25
Cholagoga	280. 281	Coccus baphica	87
Chondrilla	57	Κοχλιάριον	613. 614
Χοῦς	610	Coctio propriè quid	278
ΧρυσοβάλανϞ	95	279	
Chrysocola	172	Coctiois signa unde su-	
Χυλὸς	112. 133	mantur	279
		Coct⁹	



<b>Coctio expellendorum humorum abusuè apud</b>	<b>201</b>	<b>Composita medicamenta</b>	
<b>practicos dicitur</b>	<b>278</b>	<b>Composita medicamenta</b>	
<b>Coctionem iuuantia</b>	<b>33</b>	<b>unde nomina sumpserunt</b>	<b>625. 626</b>
<b>95. 119. 120. 671</b>		<b>Composita non cognosci</b>	
<b>Coctiones medicamento-</b>		<b>distinctè, nisi simplicia</b>	
<b>rum quomodo fiunt</b>	<b>540</b>	<b>noscantur</b>	<b>220</b>
<b>Cœliacis quæ prorsus</b>	<b>113</b>	<b>Composita si nobis satisfaciunt, quò simpliciora, èd meliora</b>	<b>203</b>
<b>114. 132. 179.</b>		<b>Composita veterum noscuntur, cognita simplicium facultate et q̃litate</b>	<b>122</b>
<b>Κόγχι</b>	<b>612</b>	<b>Compositi forma ad quid utilis</b>	<b>405</b>
<b>Cognatio quedam est in sonis &amp; corporibus sonoris</b>	<b>297</b>	<b>Compositi forma variatur interdum, vt sit efficacius medicamentum ibid.</b>	
<b>Cognatio quedam inest rebus, naturarumq; similitudo, ob quam alia trahant, alia auersentur</b>	<b>284</b>	<b>Compositi forma ad quos scopos constituatur</b>	<b>406</b>
<b>Colicum affectum sanantia</b>	<b>96. 290. 291</b>	<b>Compositorum vires tempore mutantur</b>	<b>419</b>
<b>Colletica quæ</b>	<b>260</b>	<b>Compositionem mediam vnâ habebit, qui alias parare non potest, aut circumferre</b>	<b>675</b>
<b>Colocynthe</b>	<b>100</b>	<b>Compositiones particulares faciendæ, quæ in</b>	
<b>Colocinthidis dosis</b>	<b>429</b>		
<b>Color medicamentum gratius reddens</b>	<b>363. 364</b>		
<b>Colorem cõmendantia</b>	<b>147</b>		
<b>Colophonia</b>	<b>144</b>		
<b>Cõmunia de pprio cuique medicam. vsu</b>	<b>420. 421</b>		

maiores recipiuntur	600	Cortices	114
Congius	603	Cortices radicū meliores	
Cuni	98	sunt earū medullis	310
Conseruatio medicamen-		Coryza sanantia	151
torum	386. & seq.	Κόρυς & Κασίνιος	
Conseruationi medica-		ιατρικῇ	584
mentorū locus idoneus		Costus	19
eligendus	388	Κοτύλη	611. & seq.
Conseruat omnia quae sic-		Κοτύλη etiā vid. ē dimi-	
cāt, et humiditatem ex-		diū sextarū sig. 605. 614	
cremētosa absumit	387	Κουλιός vel Κολιός	603
Consistentia non solum		Crassa & lēta ex pecto-	
ad gratiam, sed ad me-		re ducentia	31. 36. 41.
lius agendum facit	374		60. 71. 87. 88. 93. 98.
Contraria in compositio-		Crassantia	153
ne quae dicantur	315	Crassos & lentos humo-	
Contraria contrariorum		res purgātia	33. 60. 67
remedia	214	Crocus	73
Conuulsioni, quae reme-		Croci electio	74
dio sunt	287. 293	Crocus quō obseruā.	ibid.
Corroborantia	31. 73. 87.	Cretica terra	177
	153. 182. 187. 190	Crustas facientia	160.
Cordis palpitatiōni con-			164. 133.
ferentia	31. 34. 153	Cubeba	102
Corallus	176	Cucumeris semen	85
Coriandrum	86	Cucumeris fructus	100
Corui cerui et capra	183	Cucumeris agrestis re-	
Cornu rhinocerotis	ibid.	dix	30
Corrēda	26	Cumini semen	87

Cupressi pilula	99	Dia liagúwp stomaticum	
Curcuma	29	ibidem.	
Cyanus	172	Diacydonium Gal.	671
Κύαθ & vel cyathus		Diacydoniō Nicolai	672
607.608.612.614		Diacidonium quibus de	
Cyclamini radix	29	tur, & qua mēsurā	456
Cydonia	99	Diacnici dosi	429
Cynanchis illinitur	30	Diacodij dosi	ibid.
Cyperus	28	Διά γλύνκι & cōposi.	67
Cyperus Indicus	29	Διά λιανών pulvis	455
Cyperus Babylonicus ibi.		Diamoron Galeni, &	
Cysheos compositio	631	eius vsus	673
Cystica	274.292	Διά πόινw stomatice	680
D		Diarrheas sanantia	61
<b>D</b> Asypodium	76	70	
Daucus	30	Diatrion pipereō ad que	
Deletaria quantitate so-		sumitur	456
la	152	Dictamni radix	30
Denarij partes	600	Dictamni radix vulga-	
Δινάρι &	592	ris est pseudodictāni	31
Densans quod	255	Διοσμύς quid, & ad que	
Dentes puros eff.	122.183	à Gal. refertur	485
Dentalis lapis	173	Diospolitici pulvis quo-	
Dētiētes pueros iunā.	288	modo sumitur	456
Dentium dolori idonea		Diphryges	163
71.146.480		Dissoluendo quō, & que	
Destillatio quid, & eius		preparantur	530.531
diversi modi	558	Διτάλαντρw	588
Diabatuon	676	Diniubus sumptuosifica-	

remedia miscemus quā	Ebrietati resistentia	285	
pauperibus	346	Ebur	183
Δοῖς	582	Eccatharticū quod	257
Doli & adulteria medi-	Ecphrastica	ibid.	
camentorum	499.500	Ecstatica quæ	262
Dolores sedantia	54.59	Elaterium	30.100.132
Doronicum	31	Elenij radix	31
Δραχμὰ	587	Elephantiā curāt.	173.293
Drachma	594	Elleborus duplex	32
Drach. partes	592.593	ἡμιχοῖνον	614
Dracunculi radix	31	ἡμιόβλιον	611
Ducere pistillo medica-	ἡμίλιτρον	501	
menta quid	572	ἡμιμναῖα	588
Duella	593	ἡμιούγγιον	593
Dulcis sapor	265	ἡμιώβολον	587
Dupondius	591	ἡμιτάλαντρον	588
Durum	253	ἡμίψιον	611
Durū, molle quotuplici-	Empetri facultas	428	
ter dicatur corpus	ibid.	Emphrastica quæ	257
Durū corpus, id est, seipso	Emplaston medica.	206	
dum sanū erat, durius,	Emplasticum quod	256	
quot modis fiat, & quo-	Emplastrum diachalci-		
modo mollescat	254	teos quomodo componen-	
Dysenterii conferentia	dum, & eius vsus	478	
43.61.64.70.77.13.	Endimia	57	
132.177.179.183.288.	Enterocælas sanātia	174	
289	Epiceraistica quæ	263	
<b>E</b>	Epilepsiā excitātia	188	
<b>E</b>	Epilepsiam curantia	54.	
Brietatē faciēt.	154		

92. 146. 182. 287. 294  
*Epilepsiam ex atra bile*  
*curantia* 173  
*Epithymium* 74  
*Epithymi dosis* 425  
*ἑπιθυμία* 123  
*Epuloticum quod* 260  
*Epyssopum* 75  
*Eranus lapillus* 175  
*Erica* 75  
*Eruca* 87  
*Eruum* *ibid.*  
*Erysimi semen* 88  
*Eryngij radix* 32  
*Eryngij succus* 129  
*Escharoticum quod* 259  
*Esula* 32  
*Euchyma quæ* 262  
*Eufragia* 59  
*Eupatorios herba* 290  
*Eupatorium* 58. 289  
*Eupatorium etiam Pen-*  
*taphyllum dicitur Ga-*  
*leno* 59  
*Euphorbium, vel Euphor-*  
*bia* 137  
*Euphrosynon Græcis Bu-*  
*glossus dicitur* 55  
*Exasperantia quæ* 263

F

**F** *Aba Græca* 602  
*Facultas prima me-*  
*dicamēti est reliquarum*  
*veluti basis cōis.* 219  
*Facultatibus primis no-*  
*scēdis qd satis fuerit ibi.*  
*Facultas secunda quæ* 223  
*Facultates simplicium cor-*  
*rumpi in compositione*  
*quibusdā visum est* 419  
*Facultates particulares à*  
*partibus vocatæ* 264  
*Facultates particulares*  
*quatenus singulis partis*  
*affectibus cōueniāt* 266  
*Febres biliosas sanantia*  
*ex densitate cutis* 73  
*Febrium omnium vnicū*  
*remedium* *ibid.*  
*Febriles æstus cohibentia*  
 65  
*Fella animalium* 186  
*Ficus* 103  
*Ficum succus* 129  
*Filicis radix* 33  
*Fistulis ani quæ remedio*  
*sunt* 177  
*Flatui dissipātia* 32. 33.



41.48.67.83.86.87.	Furfures emendatitia	37	
Flos eris	162	G	
Flores quando legēdi	71.	Agate	174
72		Galacum lignum	
Fluxiones capitis siccantia	38	713.294	
Fluxiones biliosas cohibentia	65.108.180	Galanga	29.33
Fluxiones thoracis siccantia	38.104.177	Galbanum	138
Fluxiones intestinorum siccantia	38	Galenus simplicia quomodo explorabat	502
Fluxionum in inguina, pedes, articulos &c. & phlegmonarū incipientium remedium	177	Galeopsis	58
Fœcunditatē faciētia	67	Galla	103
Fœniculus	33	Gallitrichum	59
Fœnumgræcum	88	Gastrica	270
Poliatum vnguentum	61	Genista	75
Fomēta ventriculo quomodo imponenda	481	Gentiana	34
Frigida calidi obtū.	208	Nyagſſa	81
Frigus quas actiōes edat	237. & deinde	Gingiuus mollitie fluidus	
Fructus quid	93	qua tergent	183
Fructus plantarum quomodo diligendi	309	Glaucium	132
Fumaria	59	Glycyrrhiza	34.132
		Gramen	34
		Γράμμη	588
		Grana paradisi	86
		Gulielmus Pelisserius Episcopus Mōpessulanus	
		de simplicibus incognitis scripsit	108
		Gummi	145
		Gypsum	172

## H

<b>H</b> æmatites 175	lidam inuantia 56
<b>H</b> æmodiã ab acer- bis & acidis natam sa- nantiã 65.228.299	<b>H</b> epatis quæ tollunt in- temperiem à corruptis humoribus ibid.
<b>H</b> æmorrhagiam sistētia 64.70.250	<b>H</b> epati quæ foris impo- nantur 459
<b>H</b> æmorrhagiam à nari- bus quæ sistunt 133	<b>H</b> epati indurato quæ il- linuntur 94
<b>H</b> æmorrhoides curātia 95.173	<b>H</b> epatica 131.184.271. 289
<b>H</b> æmorrhoides quæ ape- riunt 130.186	<b>H</b> epaticis quæ ratione nascuntur valde refri- gerantia 334
<b>H</b> ammoniacum 137	<b>H</b> epaticis quæ prosunt 123.289
<b>H</b> armola 67	<b>H</b> epatoriũ, <b>H</b> epatitis 59
<b>H</b> astula regia 26	<b>H</b> erba 49
<b>H</b> ederæ lacryma 147	<b>H</b> erba quomodo siccan- da ibid. m.
<b>H</b> edychroi magmatis cõ- fectio 651	<b>H</b> erba quadam siccate calidiores ibid.
<b>H</b> emicrania frigida qui- bus curatur 485	<b>H</b> erbarũ quæ partes ad medicamenta accipien- da 311
<b>H</b> emicranica remedia qualia esse debent 342	<b>H</b> ermodactylus 34
<b>H</b> emina 605.608	<b>H</b> ermodactyli dosi 427
<b>H</b> epar expurgantia 26. 45.57.65.70.90.93. 99.142.312.	<b>H</b> ermodactylus neoteri- corum est veteribus in- dictus 35
<b>H</b> epar vulpis 184	
<b>H</b> epati intemperiem ca-	

<i>Hernias sanantia</i>	151	<i>Iecur lupi</i>	184
<i>Hippolapathum</i>	61	<i>Impetigines que tollunt</i>	
<i>Humiditas quas actio-</i>	146		
<i>nes edat</i>	251	<i>Incantationibus non est</i>	
<i>Hiiores oēs pueri &amp; p-</i>		<i>habenda fides</i>	299
<i>gnantibus ducentia</i>	102	<i>Infusione quomodo &amp;</i>	
<i>Humores crudos coquen-</i>		<i>que praparentur</i>	533
<i>tia</i>	54.62		534
<i>Hydragoga</i>	282	<i>Inſtrumenta precipua</i>	
<i>Hydromelitos facultas</i>		<i>pharmacopolarum</i>	581
	428	<i>Intemperiem frigidam co</i>	
<i>Hydropicos iuuātia</i>	24.	<i>quentia</i>	38.41.124
	41.75.95.184.289.293	<i>Intemperies calidas sa-</i>	
<i>Hypercathartica q̄</i>	262	<i>nantia</i>	131.136
<i>Hypersarcosin que tol-</i>		<i>Intemperies frigidas hu-</i>	
<i>lunt</i>	161.172	<i>midas sanantia</i>	93.126
<i>Hypocisthis</i>	132	<i>Intertriginem curantia</i>	
<i>Hyoſcyamus</i>	60		160
<i>Hyſſopum</i>	ibidem	<i>Inteſtina roborātia</i>	141
<i>Hysterica</i>	275	<i>Inteſtina puerorum pur</i>	
<i>I</i>		<i>gantia</i>	174
<i>Iaſpis</i>	174.289	<i>Intybum olus</i>	56
<i>Ichoras pruritū excitā</i>		<i>Iop</i>	75
<i>tes que digerūt</i>	170	<i>Iridis radix</i>	36
<i>Ictericis que proſunt</i>	26.	<i>Iris Illyrica eſt optima</i>	
	30.58.67.290.485	<i>ibidem.</i>	
<i>Iecur roborantia</i>	38.59.	<i>Iſatidis radice</i>	37
	111.114.141.142.312.	<i>Iſchiadicis que proſunt</i>	
	480.671		23.32.58.75.485

<i>Iua</i>	58	<i>dicamenta preparantur</i>	
<i>Iuba media</i>	112	552.553	
<i>Iuniperi fructus</i>	104	<i>Lauri folia et fructus</i>	61
<i>Iuniperi gummi</i>	148	<i>Lebes</i>	584.585
<i>Iuglans</i>	105	<i>Lenientia asperatas ca-</i>	
<i>Iuiube</i>	104	<i>uitates que</i>	263
<i>Iuris galli veteris facul-</i>		<i>Lendes interimetia</i>	147
<i>tas</i>	429	<i>Lens</i>	90
<b>K</b>		<i>Lentes expurgantia</i>	94
<i>Keiri</i>	76	<i>Lepram sanantia</i>	27.32
<b>L</b>		37.55.90.94	
<b>L</b> <i>Ac gignentia</i>	33	<i>Λιπτόκαρπον</i>	105
261		<i>Λιπτόν</i>	587
<i>Lachryma</i>	140.141	<i>Lepus marinus</i>	286
<i>Lapathum</i>	61	<i>Λουκοίον</i>	76.77
<i>Lapis calaminaris</i>	166	<i>Libra partes</i>	591
<i>Lapis Iudaicus</i>	174	<i>Lichenas sanantia</i>	32.
<i>Lapides</i>	ibidem	148.168	
<i>Larix</i>	144	<i>Lienem absumentia</i>	46
<i>Lassitudo motoria</i>	70.292		
<i>phlegmonode quomodo</i>		<i>Lienem expurgantia</i>	45
<i>curatur</i>	340	90.94.142	
<i>Lassitudo interne tuni-</i>		<i>Lienes induratos liquan-</i>	
<i>ce asperae arteriae ex vo-</i>		<i>tia</i>	27.41.46.94.138.
<i>ciferatione quomodo cu-</i>		484	
<i>randa</i>	341	<i>Ligna</i>	112
<i>Laterum dolores tollen-</i>		<i>Ligula</i>	608
<i>tia</i>	55	<i>Ligusticum</i>	88
<i>Lauatione quomodo me-</i>		<i>Lilij radix</i>	37

<i>Limitatio vnica saepe sufficit ad ordinationem medicamenti</i>	489	<i>Lumbricos rotundos quæ educunt</i>	289
<i>Limitationes generales et particulares nõ integræ non sufficiunt</i>	490	<i>Lupinus</i>	90
<i>Limitationes etiam necessariæ ad rectam remedium compositionem</i>	493	<i>Lutra</i>	186
<i>Limitationes necessariae ad rectum medicamentorum usum</i>	299	<i>Lycium</i>	132
<i>Limonæ</i>	100	<i>M</i>	
<i>Linanche</i>	75	<i>Macer</i>	119
<i>Λινωπεριον</i>	89	<i>Macis</i>	120
<i>Liquando fit preparatio</i>	530	<i>Magnes</i>	174
<i>Liquores</i>	134	<i>Maiorana</i>	62
<i>Lithargyros</i>	160	<i>Malabathrum</i>	61
<i>Lithargyros vt materia miscetur valentioribus</i>	377	<i>Malum granatum</i>	104
<i>Lithospermum</i>	90	<i>Mammæarum durities discutientia</i>	58
<i>Λιτγæ</i>	590	<i>Mādragoræ radicis succus</i>	129
<i>Λιτγερικæ</i>	113	<i>Mandragoræ maris radicis cortex</i>	37
<i>Lūbricos latos necāt</i>	33	<i>Māna Arabū</i>	127.128
<i>Lumbricos quæ necāt</i>	51. 86. 90. 183	<i>Mannathuris</i>	155
		<i>Manne dosis</i>	426.427
		<i>Maron</i>	62
		<i>Maron esse herbam mastice vulgò dictam suspicio est</i>	ibidem
		<i>Marrubium</i>	61
		<i>Mastice</i>	62.141
		<i>Matricariam esse maioranam suspicatur</i>	<i>Hiermel</i>



<i>molau</i>	63	<i>Medicamenti exhibendi</i>
<i>Μίαξα ὀπί</i>	189	<i>quantitas &amp; qualitas</i>
<i>Μηκόριον</i>	155	<i>ex iisdem sumantur sco</i>
<i>Medicamentum quid</i>	199	<i>pis</i> 421
<i>Medicamentū simplex ib.</i>		<i>Medicamentum eius sa-</i>
<i>Medicamentorum com-</i>		<i>porū propinandum, quo</i>
<i>positio</i>	201	<i>delectetur æger</i> 341
<i>Medicamentū vnū sim-</i>		342
<i>plex interdum quatuor</i>		<i>Medicamenta clemētio-</i>
<i>habet scopos</i>	302	<i>ra initio offerēda</i> 466
<i>Medicamentorum vten-</i>		<i>Medicamenta valentio-</i>
<i>di modus</i>	457	<i>ra quæ indicant sumē-</i>
<i>Medicamentorum vsus</i>		<i>da</i> 343
<i>finis</i>	431	<i>Medicamenti consuetam</i>
<i>Medicamēta vsum ex-</i>		<i>nobis formam facilius</i>
<i>pectatum non præstāt,</i>		<i>toleramus, quā non</i>
<i>nisi sint actu quod di-</i>		<i>consuetam</i> 464
<i>cuntur</i>	353	<i>Medicamenti præbendi</i>
<i>Medicamenta à quibus</i>		<i>tempus quando Galen.</i>
<i>sumantur</i>	14.15	<i>negligit</i> 419
<i>Medicamentis quibus &amp;</i>		<i>Medic. facultate quadā</i>
<i>quando utendum</i>	415	<i>natiua convenientē sibi</i>
<i>Medicamentū vsum ex-</i>		<i>succū trahunt</i> 283.284
<i>pectatum non præstans</i>		<i>Medicamēta sumpta &amp;</i>
<i>quomodo corrigitur</i>	354	<i>admota non habent vi-</i>
	355.356	<i>res easdem</i> 296
<i>Medicamenti sumēdi vel</i>		<i>Medicamenta quando</i>
<i>admouendi tempus &amp;</i>		<i>Deorum manus</i> 412
<i>occafio</i>	436	<i>Medicamēta quæ curiose</i>
		<i>terent</i>

<i>terenda</i>	379	<i>Medicamenti deligendi</i>	
<i>Medicamenta ad tempe</i>		<i>indicatio sumitur à par</i>	
<i>raturam mediã aptan-</i>		<i>tis natura &amp; vsu</i>	336.
<i>da</i>	205		341.422.423
<i>Medicamēta media seu</i>		<i>Medicamenta quæ gra-</i>	
<i>polychrēta</i>	341.467	<i>tiora reddunt.</i>	363
<i>Medicamenta polychre-</i>		<i>Medicamenti componen-</i>	
<i>sta neque multum ob-</i>		<i>di indicatio à quibus su-</i>	
<i>sunt, neq; profunt, si per</i>		<i>matur, &amp; quorum re-</i>	
<i>petuò ijs vtamur ibid.</i>		<i>spectu varietur</i>	322
<i>Medicamentis valētibus</i>			323. & deinde.
<i>cum magna præmedita</i>		<i>Medicamenti sumendi,</i>	
<i>tione vtendum</i>	422	<i>vel admouēdi vsus</i>	431
<i>Medicamen purgās vnū</i>		<i>Medicamētorū finis ibi.</i>	
<i>non perpetuò vsurpan-</i>		<i>Medicamenta composi-</i>	
<i>dum</i>	423	<i>turo quæ noscenda</i>	213.
<i>Medicamentorū purgā-</i>			216
<i>tiam delectus secundum</i>		<i>Medicamenta compo- si- ta quomodo fiant præ-</i>	
<i>Mesuen</i>	305	<i>stantissima</i>	303
<i>Medicamenta purgātia</i>		<i>Medicamēta optima ex</i>	
<i>quomodo reponēda</i>	307	<i>contrarijs maiores mi-</i>	
<i>Medicamenta per quæ</i>		<i>scuerunt</i>	205.317
<i>melius fiunt</i>	357	<i>Medicamentorū compo-</i>	
<i>Medicamenta probata</i>		<i>nendorū necessitas</i>	202
<i>ad cōpositionem à qui-</i>		<i>Medicamenta quadam</i>	
<i>bus deliguntur</i>	314	<i>componuntur, vt quod</i>	
<i>Medicamenta deligenda</i>		<i>secundum naturam est</i>	
<i>in suo vigore &amp; bene</i>		<i>seruemus</i>	336
<i>habita</i>	307		<i>Med</i>

# INDEX.

<i>Medicamenta quæ gra-</i>	<i>Melancholicum succum</i>
<i>tius faciunt, quomodo</i>	<i>purgantia</i> 41.42.172
<i>augenda vel minuenda</i>	173.323
399	<i>Melanthium</i> 90
<i>Medicamenti vehemen-</i>	<i>Melilotum</i> 77
<i>tiam quæ remittit, eius</i>	<i>Melissophyllon</i> 64
<i>actionem non aboleant.</i>	<i>Menses mouetia</i> 27.29
360	32.33.38.41.45.54.58.
<i>Medicamenti virtutem</i>	61.68.71.80.90.100.
<i>imbecillam quæ augment</i>	146.151.260
<i>aut excitant</i> ibi.	<i>Mensura Romanorum</i>
<i>Medicamenta non coau-</i>	<i>&amp; Græcorum</i> 603
<i>gmentanda, cum paucio-</i>	<i>Mensura Romana ari-</i>
<i>ribus fieri potest</i> 198.	<i>dorum</i> 607
385	<i>Mensura aridorum At-</i>
<i>Medicamentorum com-</i>	<i>tice</i> 613
<i>positio</i> 199	<i>Mensura liquidorum</i>
<i>Medicamenti significa-</i>	<i>Græcæ</i> 609
<i>tio</i> ibidem	<i>Mensurarum Romana</i>
<i>Medicatio in quibus con-</i>	<i>rum nota</i> 614
<i>sistit</i> 413	<i>Mensurarum Græcarum</i>
<i>Medicus prudens &amp; pe-</i>	<i>nota</i> 615
<i>ritus quæ nouisse debeat</i>	<i>Mentem turbantia</i> 86
220	<i>Metalla</i> 156
<i>Mēdipuv</i> 615	<i>Metallicorum facultates</i>
<i>Medulla</i> 181	<i>diu vigent</i> 310
<i>Mel</i> 125	<i>Methodus componendi</i> 300
<i>Mel quod valētissimum</i>	<i>Metaphis</i> 609
308	<i>Meum</i> 38
	<i>Mex</i>

<i>Mexereon</i>	46	<i>Mvā</i>	588
<i>Meconium</i>	91	<i>Mvā iālgivū</i>	590
<i>Misy</i>	164	<i>Mumia</i>	183
<i>Mistis &amp; cōpositis quan</i>		<i>Muliebri profluvio qua</i>	
<i>do vtendum</i>	618	<i>profunt</i>	44.114.132
<i>Mithridatios ad qua vi</i>		<i>Muccilagines</i>	536
<i>lis</i>	633	<i>Myrica fructus</i>	105
<i>Mithridates</i>	628	<i>Myriophyllum</i>	64
<i>Mithridaty descriptio</i>		<i>Myrobalanus</i>	94
<i>ab Andromache</i>	629	<i>Myrobalanorum quinq;</i>	
<i>Mithridaty descriptio à</i>		<i>genera</i>	95
<i>Damocrate</i>	630	<i>Mυροβαλάνων σινισμα</i>	
<i>Modius</i>	607	94	
<i>Molle</i>	253	<i>Myrrha</i>	148
<i>Molybdena</i>	167	<i>Myrrhastacte</i>	150
<i>Morbus quilibet qualia</i>		<i>Myrti germina</i>	105
<i>remedia postulat</i>	461	<i>Μύσγορ</i>	606.612
<i>In Morbi vigore à medi</i>		<i>Myxa</i>	104
<i>camentis purgantibus</i>			
<i>abstinendum</i>	438		
<i>Morbilis &amp; variolis fa</i>		<b>N</b>	
<i>lubria</i>	108	<i>N Arcotica quate</i>	
<i>Morsibus canū qua me</i>		<i>nus profunt</i>	331
<i>dentur</i>	293	<i>Narcotici qñ vtēlū ib.</i>	
<i>Morsibus canis rabidi</i>		<i>Narcoticorum cōpositio</i>	
<i>qua medentur</i>	295	<i>nis scopus quis est</i>	333
<i>Morus utraque</i>	105	<i>Nardus præstāssima</i>	38
<i>Moschus</i>	187	<i>Nardus Gallica</i>	38.39
<i>Μοσχάλευρ</i>	28	<i>Nardus Syriaca</i>	ibidem
		<i>Nardi electio</i>	ibidem
		<i>Nardi spica &amp; radix</i>	38

Natura partis cōprehen-	Obstructiones liberantia
dit naturam totius 348	68.87.103
Natura proprietates assu-	Obstructionibus renum
mentis medicamen est	quae subueniunt 26.41
inspicienda 34	64.93
Nauseam arcet 153	ΟΧΛΟΙ 582
Nephritica 274.292	Oculi dolentis affectus si-
Nephriticos curantia 193	gna unde sumantur
Nepitha 57	487
Nervorum vulnera glu-	Oculis pallor ex ictero
tinantia 293	quomodo amouetur 485
Nervorum affectibus si-	Oculis gratia additur
gidis quae p'sunt 41.94	171
Nigella 90	Oculis cruentatis conue-
Nutriendo fit prapara-	nientia 70
tio 531	Oculorum claritati con-
Nux vomica 98	ferentia 59.61.67.139.
Nymphaea 77	147
O	Oculorum remedia quo-
OBOLQ 588	modo applicantur 472
Obstructiones lie-	473
num soluentia 61.69.	Oculorum ulcera qui-
78.93	bus curanda 338
Obstructionibus hepatis	Oculorum fluxiones inhi-
quae subueniunt 26.33.	bentia 152.183.293
41.58.61.64.93.107.	Oculorum vulnera sanan-
290	tia 175
Obstructiones thoracis &	Oculorum obstructiones
pulmonis liberantia 102	liberantia 142
	Q



# INDEX.

Ocymum	91	randi	338
Odor medicamentū gra		Oculorum cicatrices pur	
tius reddens	366.367	gantia	139
Odora stomachicis mi-		Orobanche	75
scenda	367	Orthopnea que prosue	
Odyneron quod	258	78.90.92	
Oenantes radix	40	Orthopnea et asthma à	
Oesypus	186	crasso & lento humore	
Olea factitia	123	quali consistentia me-	
Oleum	122	dicamentū requirūt	374
Oleum succini vim hebe-		Os à corde cerui	183
rat	285	Os sepie	ibid.
Oleosus sapor	265	Ossa	182
Oliue halmades	106	Oxyacanthæ succus	128
Ολμ⊙	681	Oyacanthæ baccule	106
Omphacium	124	Οξύλαφ⊙ seu οξύλαφον	
Opium	91.135	606.611.615	
Opio quādo utimur	332	Οξύποινις	97
Opobasamum	101	Ούγγια	592
Opocalpason	150		
Opopanax	136	P	
Οπὲς Cyrenaicus: Medi-		P. Aconia radix	41
cus, & Syriacus	134	Papaueris gñā	91
Ophthalmie quō paran-		Parotidas curantia	92
da medicamenta	337	Pars vna organi inter-	
Origanum	64	dum subit usum duo-	
Oris halitum commen-		rum, triū, vel quatuor	
dantia	29.33.112	rationem	302
Oris affectus quibus cu-		Partem roborātia medi-	
		camētis miscentur	361
		Par	

<i>Partibus natura frigidis qualia admonemus</i>	<i>de petatur</i>	23.40
458	<i>Petroselinū Macedonicū est Hipposelinū</i>	24
<i>Partibus causis quomodo medicamur</i>	<i>Petroselinū Macedonicū &amp; Estreaticū</i>	40
459	<i>Peucedani radix</i>	41
<i>Partibus non abhibenda topica, nisi corpore prius toto vacuato</i>	<i>Pharmacopœi lucri heluones</i>	198
468	<i>Pharmacis lethalibus</i>	
<i>Partum mortuū eijciētia</i>	<i>resistentia</i>	115
33	<i>Phlegmone quæ remedia iuxta morbi tēpora postulat</i>	342
<i>Partum gravidis cōtinēntia</i>	<i>Phlegmōes curatio</i>	448
176	<i>Phlegmonas, oris, sedis, pudēdi, &amp; aliarū humidarum partium sanantia</i>	130.133.180
<i>Parturientibus conuenientia</i>	<i>Phlegmonas digerentia</i>	55.88
24.174.176	<i>Phlegmonæ conuenientia</i>	23.49.124.154.167.295
<i>Pauperibus remedia ex viliori materia danda</i>	<i>Phlegmonas gutturis sine venæ sectione quæ sanant</i>	288
346	<i>Phlegmonas gargareonis curātia</i>	135.171.187
<i>Pediculos occidunt</i>	<i>Phlegmonarum oris re-</i>	
92.147		
<i>Pentaphylli radix</i>		
42		
<i>Percolatio medicamentorum</i>		
572		
<i>Periclymenum</i>		
77.78		
<i>Pestis resistentia</i>		
43.178.183.190		
<i>Pestilentibus putribusq; affectibus resistentia</i>		
56.99.115		
<i>Petroselinum verū vn-</i>		

# INDEX.

media, & quo appli-	Pistacium	107
canda 674.675.678	Pituitaria	91
Phlegmonis oculorum &	Pituitam & aquas du-	
oris oleum non infundi-	centia	282
tur	481 Pituitam crassam duce	
Phlegmonas hepatis cu-	tia	36.47.100
rancia	147.339 Pituita crassam a iun-	
Phlegmone stomachi &	cturis ducentia	35
ventriculi quomodo	Pityinon	144
curatur	ibidem Pyxides medicamento-	
Phlegmonis artuum que	rum siccorum	585
imponuntur initio	480 Plantago	64
Phlegmagog. 22.32.47	Plantaginis succus	129
87.92.95.100.132.281	Plantae quid cum ani-	
phoivis	96 malibus habeant co-	
phoivis palmae fructus	97 mune	16
phoivines buxinoi	96 Planta omnes legende,	
phoivinos βάλαν & 96.97	quando summarum	
Phibiscis que profunt	sunt virium	19
74.185	Planta singula ex quo	
Phu	42 loco petende	ibid.
φυλλίτις	69 Plante diversi modo esse	
Phymata curantia	90.91 rantur, modo in ma-	
Pilos quomodo auferi-	sculino, modo se mini-	
mus	465 no, aut etiam neuro	
Piper	106.107 genere	20
Piperitis	30 Pleuretica	268
Pisces quomodo manu	Plumbum	167
capiantur	98 Pneumonica	248
		Pod

# INDEX.

<b>Podagra</b> que profunt	<b>Pseudocasia</b>	118	
24.36.107	<b>Pseudomelanthiū</b>	90	
<b>Polypodij radix</b>	42	<b>Pseudocinnamomū</b> 118	
<b>Polypodij dosis</b>	426	<b>Psora</b>	71
<b>Pomorum succus</b>	129	<b>Psoras detergentia</b>	32.
<b>Πῶμα</b>	96	37.90.94.168.	
<b>Pompholyx</b>	166	<b>Psyllium</b>	91
<b>Pondo</b>	391	<b>Pterygia oculorum le-</b>	
<b>Poderum notis vulgus</b>		<b>uantia</b>	34
<b>medicorū iniquius vti</b>		<b>Pueri &amp; senes medica-</b>	
<b>tur</b>	602	<b>menta valentia nō se-</b>	
<b>Pondera &amp; mēsuræ me-</b>		<b>runt</b>	343
<b>dicamentorū vſitatio-</b>		<b>Pulmo vulpis</b>	185
<b>res Galeno, &amp; noſtræ</b>		<b>Pulmones purgātia</b>	93
<b>atatis medicis</b>	587	<b>Pulmonum canernulis</b>	
<b>Ponderum Romanorū</b>		<b>vel arteriæ asperæ pū-</b>	
<b>notæ ex diuerſis auto-</b>		<b>impactum quali con-</b>	
<b>ribus</b>	601	<b>ſiſtentia medicamen-</b>	
<b>Ponderum Græcorū no-</b>		<b>tum requirit</b>	374
<b>tæ &amp; Atticorū</b>	ibi.	<b>Pumex</b>	172
<b>Populus duplex</b>	65	<b>Purgandum quādo ini-</b>	
<b>Populeum vnguētū</b>	67	<b>tio, quando ſub finem</b>	
<b>Portulaca</b>	65	<b>morberum</b>	440
<b>Poterium rubrum</b>	108	<b>Purgantia medicamen-</b>	
<b>Preparatio quorūdam</b>		<b>ta qua ſora danda</b>	
<b>medicamentorum quo</b>		<b>448.449.451</b>	
<b>modo fiat</b>	330	<b>Purgātia vomitu quā-</b>	
<b>Pruna</b>	107	<b>do danda</b>	445.446
<b>Pruni gummi</b>	148	<b>Purgatio ſeu mundatio</b>	

medicamentorum	578	modo secunda sequan-	
Purgatio	277	tur facultates	263
Purgationes fiunt inter		Qualitatum primarum	
dum ad præcautionem		facultatē quomodo de-	
morborum	447	prehendimus	252
Purgationis tēpus	436	Quantitas simplicium	
Purgationis idoneū tē-		(dosim vocant) in com-	
pus quæ ostendūt	437	posito	390
Purgantia quomodo da-		Quantitas simplicium in	
mus	477	cōposito à quibus indi-	
Purgatoriorū vis malefi-		cationib <sup>9</sup> sumatur	391
ca quomodo mitigetur		Quantitas remediorum	
	192	maior est, quando affe-	
Purgatoria medicamē-		ctus cum sua causa ea	
ta	ibidem	dem postulat	393
Purgatorio medicamen-		Quantitas remediorum	
to sumpto pristinæ cre-		est maior, si parvis af-	
mor sorbendus	444	fectæ temperatura &	
Pus mouentia	154	corporis totius est eadē	
Putredinem arcentia			394
80.125.133.142		Quātitas euacuationis	
Pyropus	175	à quibus sumatur	435
Pyrethrum	41	Quartanas curantia	
Pyrites	175	53.173	
Q		Quartarius	606
Qua anni parte		Quid pro quo	520
qui humores		R	
purgandi	453.454	R	
Qualitates primas quo		R	
		Adices quando	
		euellende	17
		Ra	



<i>Radices integræ euellē-</i>	<i>fluum est exotica quæ-</i>
<i>dæ, &amp; quales</i> <i>ibid.</i>	<i>rere</i> 345
<i>Radices quomodo repo-</i>	<i>Remediorū facultas in</i>
<i>nendæ &amp; ubi siccandæ</i>	<i>duris augetur corpori-</i>
<i>ibi. &amp; 18</i>	<i>bus</i> 398
<i>Radices sibi alimentum</i>	<i>Renes scincorum</i> 185
<i>peculiare trahunt, in</i>	<i>Renes expurgātia</i> 142
<i>solo, &amp; sub cælo con-</i>	<i>Repercutiens quod</i> 255
<i>ueniēti. <i>ibidem</i></i>	<i>Repercutientis vis</i> 256
<i>Rarefaciens quod</i> 255	<i>Resinæ</i> 141
<i>Raued Seni</i> 44	<i>Resinæ mitissimæ</i> 143
<i>Remedia efficacissima</i>	<i>Resinarum humidissi-</i>
<i>quæ sunt</i> 212	<i>ma</i> 144
<i>Remedia mitiora postu-</i>	<i>Rha, Rhaon, Rheon,</i>
<i>lat sensus acrior, valē</i>	<i>Rhion radix</i> 43
<i>tiora obtusior</i> 399	<i>Rha barbarum in hor-</i>
<i>Remedia varianda pro</i>	<i>tis vulgò satum quid</i>
<i>morborū tēporibus</i> 469	<i>sit</i> 44.45
<i>Remediorum quātitas</i>	<i>Rha barbari dosis</i> 426
<i>interdum à maioribus</i>	<i>Rheu Ponticum</i> 44
<i>scrupulosius ascripta</i>	<i>Rhus</i> 108
401.402	<i>Rhyptica quæ</i> 257
<i>Remediorū genera ipsi</i>	<i>Rhibes</i> 108
<i>affectus indicant</i> 395	<i>Rosa</i> 78
<i>Remedij mensuram, &amp;</i>	<i>Rosmarinus</i> 67
<i>simplicium differētiā</i>	<i>Rubiæ satiuæ radix</i> 45
<i>indicantia <i>ibid.</i></i>	<i>Rubus</i> 108.109
<i>Remedij paratu facili-</i>	<i>Ructibus acidis quæ</i>
<i>bus presentibus, super</i>	<i>profunt</i> 54

# INDEX.

Ruta	67	Sapor cuique iucundus	
	S	quis dicitur	372
Sacchar	126	Sapor cuique iucundus	
Saccharis rubrum		quoad fieri potest, seruatis medicamenti vi	
ibidem.		ribus apparetur	ibid.
Sagapenum	139	Sapor medicamentum	
Sal	170	gratius reddens	369
Sal. Armeniacus	171	Sapphyrus	174
Sal Hammoniacus	ibi.	Sarcocolla	151
Salsus sapor	265	Σαρκοῦλα 154.	166
Salvia	67	260.205	
Sampsycus	62	Σαρξίφάρον	49
Sandaracha	162	Scabiem & pruritum	
Sanguis hirci	178	sanantia	60.94
Sanguis draconis	179	Scabies Hispana	294
Sanguine purgātia	283	Scabiosa	70
Sanguinem in ventri-		Scammonia	139
culum coagulatum dis-		Scammonij dosis	425
soluentia	180	Scariola	57
Sanguinem reijciētibus		Schede Galeni pharma-	
que profunt.	28.43.113	corum purè & veterū	
	132.146.175.176.177	more scribuntur	188
Sanguinem & spiritū		Schistius lapis	175
purgantia	189	Σχοῖν &	79
Sanguinem per vrinas		Scilla	46
euocantia	88	Scille succus	129
Sanguinis fluorem cohi-		Scille alba segmēta sic-	
benia	130.172.295	cantur in ymbra	46
Santalum	113	Sal	

<i>Scilliticorum pastillorū</i>	<i>Sericum</i>	<i>ibidi.</i>
<i>confectio</i> 649	<i>Sereos species</i>	56
<i>Scirrhus hepatis quæ ad</i>	<i>Sericum crudum</i>	190
<i>mouenda</i> 340.341	<i>Sesels</i>	92
<i>Scirrhus emēdantia</i> 18	<i>Sextarius</i>	603.603
115.135.181.185	<i>Sextula</i>	693
<i>Scolopendrium</i> 68.69	<i>Siccitas quæ edat actio</i>	
<i>Scopus methodi compo-</i>	<i>nes.</i>	248
<i>nēdi medicamēta</i> 197	<i>Sicilius</i>	593
<i>Scopus medicamētorum</i>	<i>Sigillum Lemniū</i>	176
<i>quis sit</i> 414	<i>Simplex in suo genere</i>	
<i>Scopi componendorū me-</i>	<i>quod præstātissimum</i>	
<i>dicamentorum quò di-</i>	303.307	
<i>rigendi</i> 300	<i>Simplicia medicamenta</i>	
<i>Scordium</i> 68	<i>quæ</i>	201
<i>Scoria</i> 163	<i>Simplicia quæ in singu-</i>	
<i>Scorpionū iclibus quæ</i>	<i>lis regionibus inueniā</i>	
<i>profunt</i> 174	<i>tur præstātissima</i>	304
<i>Semen &amp; fructus disse-</i>	<i>Simplicia medicamenta</i>	
<i>rentia</i> 81	<i>nosceda</i>	215
<i>Semina quæ dolegēda</i> 82	<i>Simplicia natura et tēpo-</i>	
<i>Semina frigida</i> 85	<i>re cōpositis priora</i>	216
<i>Semen extinguetia</i> 261	<i>Simplicis vnius vitium</i>	
<i>Semē supprimentia</i> ibi.	<i>sæpe totum cōpositū</i>	
<i>Semen gignentia</i> ibid.	<i>corrumpit</i>	309
<i>Senna</i> 110	<i>Simplicis alicuius cur-</i>	
<i>Senne dosis</i> 427	<i>maior, aut minor quā</i>	
<i>Septica quæ</i> 259	<i>titas miscetur cōposi-</i>	
<i>Seres</i> 189	<i>to</i>	395

<i>Simplicis quātitas maior miscetur, cuius facultas magis aduersatur morbo</i>	396	<i>beti, quod praestātius in suo genere, aut quae eius pars valētior</i>	512
<i>Simplicium omniū, quod cunque sui generis odorem habet valentissimum, est probatissimum</i>	36	<i>Siliquastrum</i>	30
<i>Simplicium quorundā quātitas variatur pro temporis ratione</i>	400	<i>Sinapi</i>	92
<i>Simplicium quātitatē immutat rerū miscendarum natura</i>	401	<i>Singultus curantia</i>	96
<i>Simplicium quātitas quomodo limitanda</i>	398	<i>Sinus glutinantia</i>	130
<i>Simplicium numerus ad quantitatem refertur</i>	404	482.483	
<i>Simplicium quantitas ipsis autoribus interdum incerta</i>	403	<i>Σίγειον</i>	113
<i>Simplicium medicamentorum adulteria ordine alphabeti: ubi require singula</i>	503. & inde.	<i>Sitim sedātia</i>	100.109
<i>Simplicium medicamentorum electio ordine alpha</i>	28.46.69.78.146.184	<i>Smiris</i>	175
		<i>Smyrnum (id est vulgare Leuisticum)</i>	ὀλούσα τροφὴ Romae vocari Gal. scribit.
		<i>Somnū cōciliātia</i>	54.13
		<i>Sonchus</i>	17
		<i>Soporifera</i>	38.91.136.
		<i>Sordes gymnasiarum</i>	186
		<i>Sori</i>	164
		<i>Sparagus</i>	26
		<i>Σπάραξι</i>	185
		<i>Spica vulgaris est pseu-</i>	
		<i>donardus</i>	39
		<i>Spicula extrahētia</i>	106
		293.295	
		<i>Σπλάνιον</i>	69
		<i>Splenicis cōueniētia</i>	24
			<i>Spie</i>

<i>Splenica</i>	273.292	tur 124.135.154
<i>Spodium</i>	166	<i>Stomachicis</i> qua ratio-
<i>Spuma nitri</i>	169	ne miscentur valdere
<i>Squama aris</i>	162	frigerantia 334
<i>Staphis agria</i>	92	<i>Stomatica</i> medicamēta
<i>Stellio</i>	286	debent esse boni saporis
<i>Stenoticum quod</i>	255	pro cuiusq; palato 370
<i>Sternutamenta prouo-</i>		<i>Stomatica</i> cōpositiones
<i>cantia</i>	36	aliquot à 674.in fi-
<i>Stercus canis osibus nu-</i>		nem lib.
<i>triti</i>	287	<i>Stomaticis</i> quando mel
<i>Stercus pueri lupinis</i>		miscendum 380
<i>dulcibus nutriti</i>	288	<i>Stomaticis</i> quomodo vi
<i>Stercus lupi osibus nu-</i>		mur 475
<i>triti</i>	290	<i>Stomaticorū &amp; stoma-</i>
<i>Stercus canum &amp; lupo-</i>		chicorū cōsistentia 275
<i>rum</i>	18.71	<i>Stomaticorū</i> vtendi mo
<i>Stimmi</i>	171	di varij 677.678
<i>Stœchæherba</i>	70	<i>Strobilina</i> resina 144
<i>Στοιχὰς</i>	79	<i>Strumis</i> conferentia 52
<i>Stoachica</i>	108.270.289	<i>Stupefaciētia</i> 15.91.136
<i>Stomachū</i> roborātia 38.		<i>Stupefaciētia</i> quare re-
	155.174.270.99.107	medijs adduntur 331
	108.127.141.	<i>Styrax</i> rubra 150
<i>Stomacho</i> aduersa 35.		<i>Styrax</i> 151
	47.100.126.170.676	<i>Styracis</i> vi ibidem
<i>Stomachi</i> ardores curā-		<i>Succus</i> , lacryma, liquor
<i>tia</i>	96	sape confundūtur 134
<i>Stomachicis</i> quæ miscē-		<i>Succi</i> melle aut saccharo



condiuntur	121.670	Temperamenti proprie-	
Succi	121	tas obseruanda in me-	
Succorum repositio ibi.		dicamentis vt in ali-	
Succinum	152.153	mentis, & expēdendum	
Sudores mouentia	29	quomodo se habeant	
Suffusis quæ profunt		ad hæc aut illa	362
ibi. & 139.150.287		Tensio articularū quot	
Suggillata curātia	133	modis fiat, & quomo-	
Sulfur	168	dō laxetur	254
Sumenda manē quæ fa-		Tenuantia	253
ciunt ad distributionē		Tenuitas & crassities	
alimenti in corpus	456	essentie actionem suā	
Sumendorum varius su-		& aliorum interdum	
mendi modus	613	iuuant	378
Summa dicendorum in		Terebinthina	142.143
his libris	207	Terebinthina resina do-	
Suppurantia quæ	258	sis	419
Sycomoros	105	Tergentia	58.60.116.
Σύγγρηξις καὶ καὶ καὶ	119	133.136.26.166.257	
T		Terminus pugnantis ge-	
ΤΑΛΧΥΛΟΝ	589	nerosē contra morbum	
Tamar Indus	97	quis sit	481
Tamar Indorū dosis		Teruntur & tunduntur	
426		medicamenta quibus	
Tamarix	46	modis	571
Tapsus barbatus	71	Teruntur medicamenta	
Tela flammis iniecta ar-		propter quas causas	
dentes non consumun-		572.573	
tur	176	Τίταπτον	711
		Tha	

Thapsia	140	seruanda	18
Theriaca	634	Tripelium	47
Theriace cōpositio	652	Τριτάλαντον	589
Theriace decerpia ex		Turbith	47
Mitridatio	635	Turbith dosis	427
Theriace vires	661	Tunica interior vētricu	
Theriace vsus ibidem		li gallinarū	183.289
Theriace probatio	662	Tussim antiquam tollē	
Theriaci pastilli quomo		tia	146
do & in quo loco sic-		Tussim ex faucium aspe	
candi	648	ritate coquentia	55
Thlaspī	92	Tusses coquētia	151.478
Thoracem & pulmonē		V	
purgantia	54.61.70.	Valeriana	42
96.142		Vasa latioris oris	
Thoracica	268	in genere pharmacopo	
Thus	154	larum	584
Thuris cortex	154.155	Vena & arteria quō di	
Θύεια	581	cantur simplicia	200
Thymum	71	Venarū angustos mea-	
Thymelea	46	tus tergentia	142
Tophos articulorum dis		Venenis resistentia	99.
soluentia	138.180	100.119.150.183.	
Tormentilla	42	Venenosa	60
Tota per tota miscere. so		Venenosa fera morsibus	
lius Dei mun <sup>o</sup> est	201	à se factis, suis corpori-	
Tragacanthas	155	bus subueniunt	284
Tragoriganum	64	Venenalis morsibus con	
Tria in simplicibus ob-		ueniētia	30.31.32.43.

49.115.168.297.478	Verrucas tollentia	93
Venerem excitantia 33.	Vigilias quomodo perve-	
87.98.185.188.293	figerantia & hume-	
Venerem cohibentia 53.	clatia expugnamus 335	
67.167	Vim medicamēti corpo-	
Ventrem purgantia il-	ri noxiam quomodo	
litu 29	emendamus 361	
Ventrem subducentia.	Vinum 123.124	
59.131	Vinum protropum 123	
Ventrem roborātia 131	Vinum ne aceſcat, coſer-	
Vētriculo vacuato quæ	uantia 70	
extrinſecus admonēda	Viperarum caro 190	
446	Viperarū præparatio ad	
Ventriculi meatus ape-	paſtillos theriacos pa-	
rientia 115	randos 644.645	
Ventriculi os confortan-	Vires eaſilem nō habent	
tia 289	ſumpta et admota 130	
Vētriculo calidiore qui	Viſcera refrigerātia 96	
ſunt, à quibus ledun-	Vitalem virtutem robo-	
-tur 415	rantia 189	
Ventriculum roborātia	Vitiliginēs tergētia 31.	
59.95.112.120.141.	37.90.94	
174.480.671	Vlcerantia 58.93	
Venter mergi 289	Vlcera carne implen-	
Veratrum 286	tia 166	
Veratri doſis 426	Vlcera purgantia 162	
Verbascum 71	Vlcera ſiccantia 33.55.	
Verbenaca reſta ibi.	13.152	
Vernix 148	Vlcera glutinantia 28.	

32.55.64.99.130.152.	Vomitum provocantia	
126.	94.98	
Vlcerationes intestinas	Vomitum sistentia	49
emendantia	108.95	174
Vlcera sedis & vulvae	Vomitoriorum consisten-	
curantia	tia	186.478
Vlcera prae humida pudē-	Vretica quae	375
dorum curantia	260	54
Vlceribus putridis con-	Vrinas ducentia	25.29.
gruentia	32.38.41.58.59.67.	58.164.171.
Vlceribus oris uti medē-	68.71.79.83.85.87	
dū	90.103.126.478	177.475.476.679
Vlceribus gula quae ad-	Vrinas crassas & cruē-	
hibentur	tas ducentia	176
Vlceribus summē inue-	603	
teratis aut rebellibus	Vrtica fructus	92
quae profunt.	Vrtione quomodo medi-	68.136.
167.188.288	camenta preparantur	
Vlcera cacoëthe sanan-	548.549	
tia	Vsus rectus medicamen-	31.90
Vlcus cauum quomodo	torum	412.413
curamus	Vua	III
Vncie partes	Vulnera glutinantia	
Vniones	37.58.68.87	692
Vnguentorum linimē-	Vulpes	188
torum, ceratorum cōsi-	X	
stentia	☞ Erys	610.614
Vomitu quae purgantur	☞ Xylobalsamum	
446.153.445	101.114	
	Xylaloe	112
	X	

# INDEX.

Xylocinnamomum 112

Ευλοκάσια 119

Y

Υψιρη 582

Z

Zedoaria 48


Zingiber ibid.

Zizypha 104

Zuchara 127

Zurumbet 48

FINIS.





700  
1

LUGDVNI,  
EXCVDEBAT  
PHILIBERTVS  
ROLLETIVS.



THE  
LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
ART AND  
ARCHAEOLOGY  
OF THE  
UNIVERSITY OF  
CAMBRIDGE

EXOTIC LIBRARY

LIBRARY

LIBRARY



LIBRARY  
OF THE  
MUSEUM  
OF  
ART AND  
ARCHAEOLOGY  
OF THE  
UNIVERSITY OF  
CAMBRIDGE

GOTTSCHER  
RESTAURO

1876

